

تشخيصية التراساوند اطلس
Atlas of diagnostic Ultrasound

پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانی ځدراني
دراډيولوژي څانگې متخصص ډاکټر غازي محمد سلطانی ځدراني

۱۴۰۳ ل کال



ډالۍ

دا کتاب دافغان بې گناه عام ولس ارواحو ته ډالۍ کوم چې په هیواد کې د خلورلسیزې جگړې په ترڅ کې شهیدان شوي دي او خپل خوږ ژوند یې له لاسه ورکړی دی .

زه د افغان کړېدلي ولس سره په ګډه د پاک الله ج حضور ته دعا کوم چې زموږ په دې ژوبل شوي هیواد کې عادلانه سوله او دایمي ثبات رامنځ ته کړي .

آمین یارب العالمین

لړلیک

مخ	د مطالبو سرلیک	شمېره
۵	د لیکوالانو لومړنۍ خبرې :	۱
9	سریزه : (Introduction)	۲
14	لومړۍ برخه لومړۍ څپرکۍ د التراساوند اصطلاحونه : (Ultrasound Terminology)	۳
16	دویم څپرکۍ د التراساوند فزیکي اساسات (Fundamentals of Ultrasound Physics)	۴
60	دویمه برخه د ریم څپرکۍ اولترا سونوګرافي (Ultrasonography)	۵
80	دریمه برخه څلورم څپرکۍ د التراساوند طبي کړنلاره (Ultrasound medical procedure)	۶
93	څلورمه برخه پینځم څپرکۍ التراساوند اطلس (Ultrasound atlas)	۷
223	ماخذونه: (References)	۸

د کتاب ځانگړنې :

د کتاب نوم :	تشخيصیه التراساوندې
ليکوالان :	پوهنوال ډاکتر نظر محمد سلطانزی ځدراني دراډيولوژي څانگې متخصص ډاکتر غازي محمد سلطانزی ځدراني
خپرنډوی :	
ويب پاڼه :	www.nu.edu.af
چاپ شمېر :	۱۰۰۰
چاپ کال :	۱۴۰۳ ل کال
مسلسل نمبر :	
ډاونلوډ :	
چاپ ځای :	

د چاپ ټول حقوق له مؤلفينو سره خوندي دي .

د ليکوالانو لومړنۍ خبرې:

که څه هم د تشخيصيه التراساوند په هکله د پوهنتون دوو پياوړو او تکړه استادانو هريو پوهندوی دوکتور محمد نواب کمال او همدارنگه پوهندوی ډاکټر نجيب الله خليلي خورا علمي کتابونه ليکلي دي خو ليکوالانو لا زمه وگڼله چې هرڅومره ډېر کتابونه په پښتو مورنۍ ژبه وليکل شي په همغه اندازه نوموړې ژبه په علمي توگه بډای کيږي. څرنگه چې په نوموړو کتابونو کې د هر ډول ناروغيو په تړاو د التراساوند دومره زيات عکسونه يعنې Images نه ليدل کيږي، نو همدارلامل ووجي ليکوالانو پريکړه وکړه چې د تشخيصيه التراساوند اطلس تر عنوان لاندې يو کتاب وليکي. بلخوا ليکوالانو د بدن غړو د ناروغيو په هکله د هراړخيز تشرېح څخه لکه اناتومي، پتولوژي، فزيولوژي، اونورو څخه ډډه وکړه، داځکه چې دا ډول معلومات په نوموړو دواړو کتابونو کې په خورا تفصيل سره ليکل شوي دي.

کله چې زه لا تنکی ځوان وم او په کابل کې درحمن بابا ليسې په لسم ټولگي کې مې درس لوستلو، څو کله به چې بڼارته راغلم نو خامخابه د کابل بڼار عامې کتابخونې ته يوځل ورتللم. په دې ترڅ کې به ډير خوانښت شوم چې د پښتو ژبې کتابونه به زماتر سترگونه کيده. په داسې حال کې چې په نورو ژبو لکه دري، عربي، انگليسي او فرانسوي ژبو به پريمانه کتابونه موجود وو. ماته به تل د اپوښتنه پيدا کيده چې په پښتو ژبه ولې دومره لږ کتابونه چاپ شوي دي او حتی تر دې چې بيخي شتون نه لري!

په خپلو سترگو دغه ليدلای حال زه دومره وځورولم چې ماته همغه وخت کې د ځان سره پريکړه وکړه چې زما پرينه دنده به د تحصيل څخه وروسته دا وي چې په پښتو ژبه علمي کتابونه وليکم. اوس په دې ډير خوش او بختور يم چې زما يوه پخوانۍ هيله پوره کيږي. د لوی خدای (ج) ډير شکريه ځای کوم چې ما ته الله ج د دې توفيق راپه برخه کړ چې د لسو کالونو په ترڅ کې وکولای شم د طب په څانگه کې او همدارنگه د فزيک په څانگه کې پينځه ارزښتمن کتابونه وليکم او چاپ کړم.

اوس مهال يوځل بيا وياړم چې د گران هيواد افغانستان لپاره د مهاجرت په درشل کې اود هيواد څخه بهر د ساينس او تکنالوژۍ دودې او پرمختگ په لور د هڅو په لړ کې په دې بريالی شوم چې د تشخيصيه التراساوند اطلس په څانگه کې شپږم معتبر کتاب تاليف کړم.

په دې اړوند ماته سمدلاسه جوتنه شوه چې يو خوازماعر خواوس داتيا کالونو څخه پورته دی او بلخوا د کتاب ليکل دومره اسانه اوساده کار هم نه دی. داځکه چې د يوې رسالې، مضمون او يا کتاب ليکل ډېره حوصله، پريمانه وخت او په تيره بيا د پښتو ژبې کره ادبياتو ته اړتيا لري.

یولوستونکی هغه مهال د کتاب لوستلو څخه خوند او گټه اخیستلای شي چې دیوې خوا مغلقې علمي موضوع گانې په مورنۍ پښتو ژبه ساده بیان شوې وي او بلخوا پخپله لیکوال هم په موضوع باندې پوره علمي او ادبي حاکمیت ولري .

د ډیرو کلونورا هیسې په خپله مورنۍ ژبه پښتو، د کتابونو لیکل او له علمي پلوه د پښتون قام ددې ملي اوتاریخي لرغونې ژبې بډای کول، زما یو ډیر پخوانی ارمان او هیله وه، چې د کوچنیوالي څخه راپدېخوا تل راسره ملگرې وه. نن ورځ چې د کمپیوټر پوهنه، طبیعي علوم اود ساینس هر اړخیزه ټکنالوژي، دومره پرمخ تللې ده، چې د کتابونو لیکل د پخوا په پرتله ډیر آسان شوي دي، نو زما هغه پخوانی ارمان هم ورسره سم سرته رسیږي. د دې لپاره چې د پوهنتون په کچه دافغان ځوان نسل وکولای شي، زما د لکچر نوټونو څخه چې په لاندې ډول لیکل شوي دي گټه واخلي .

لومړۍ - سرطان اود چاپیریال راډیواکتیویټي (Cancer and environmental radioactivity)

دویم - دسرطاني ناروغیو راډیوتراپی (Radiation Therapy of Cancer Diseases)

درېیم - د سینې سرطان (Breast cancer)

څلورم - د طبیعي علومو انګلیسي - پښتو قاموس

(Natural Sciences English- Pashto Dictionary)

پینځم - د وینې سرطان - (Leukemia)

څخه په افغانستان اوتوله نړۍ کې هروخت گټه ترلاسته کړای شي، نودنوموړې موخې لپاره مې، د انټرنېټي اسانتیا له گټې اخیستلو سره (Internet) یوه ځانگړې کورپاڼه جوړه کړې ده، چې د لینک پته یې په لاندې ډول ده.

www.sultansei.de

دا يو څرگند حقيقت دی چې دانسان په ټول تاريخ کې درمل پوهنه ترهرڅه ډيراهميت درلود اوهم يې لري. داځکه چې پوهه او روغتيا ديو بل سره سم سيخ تړاولري. لکه چې يو رومي عالم او شاعر لاندې پخه خبره کړې ده چې وايي : Mens sana in corpore sano

(ژباړه - سالم عقل په سالم بدن کې وي .)

نن ورځ چې ساينس او تکنالوژي، د پخوا په پرتله ډير پرمختگ کړی دی، نو دهغې سره سم د طب په څانگه کې هم دناروغيو په پيژندنه اودرملنه کې نوې کړنلارې اوتخنيکي آلې منځ ته راغلې دي.

څرنگه چې په هيواد کې په پښتو ژبه د تشخيصیه التراساوند اطللس په څانگه کې، په لوړه پوهنتوني کچه لا تر اوسه ډير لږ کتابونه ليکل شوي دي، ددې کتاب ليکوالانو، خپله ملي او اسلامي دنده وگڼله، چې نوموړې نيمگړتيا په پام کې ونيسي او تر خپله وسه يې پوره کړي. نوموړی کتاب د طب ډاکترانو او هغو زده کوونکو لپاره چې په لوړو سيمپسترونو کې په زده کړه بوخت دي، او يا د تشخيصيه راډيولوژي په څانگه کې تخصص کوي، خورا گټور دی. دگرانولوستونکو څخه هيله کوم چې دغه کوچنی کتاب ديوه لکچرنوټ په ډول ومني. زه باور لرم چې دغه لار بنود لا تراوسه بشپړ نه دی، او ډيرې نيمگړتياوې لري. بلخوا څرنگه چې دالومړۍ چاپ دی چې دگرانوهيوادوالو خدمت ته وړاندې کېږي. نو کيدای شي چې گرامرې، املا يي او چاپي غلطۍ پکې رامنځ ته شوې وي چې له دې ډول نيمگړتياوې دشتون څخه بښنه غواړم.

هيله ده چې لوستونکي به دپراخ نظر څخه کارواخلي، اودسمون په موخه د ليکوالا نوسره اړيکې ونيسي. ليکوالان دښه نيت هر مثبت نظر او وړاندیز ته په درنه سترگه گوري او هرکلی ورته وايي، اوودې شي چې په راتلونکو چاپونو کې ورته پاملرنه وشي.

گرانولوستونکو!

د کتاب ليکل خورا ستونځمن کاردی خوله دې څخه بل غټ ستونځمن کارد کتاب چاپ کول دي. په دې اړوند زه خپل ځان دمنډې پوروړی گڼم چې ديوه فرهنگي شخصيت کارنامې تاسوته په گوته کړم چې پرته دهغه، مادي اومعنوي مرستې څخه ددې کتاب چاپ کيدل ناممکن وو. دا قدرمن ملي فرهنگي شخصيت ډاکتر محمديحيی وردک نومېږي چې په ملي اونړيواله کچه يو پيژندل شوی افغان طبي ډاکتر دی.

اوسمهال ډيروياريم چې يوخواډ ډاکټر محمديحيی وردک ترمديريت لاندې اوبلخواډنړيوالوخيږيه مرستندويوتولنو په مالي مرسته يوه پياوړې پروژه په دومره جدیت او فعالیت سره کارکوي چې په ډيره لنډه موده کې يې ددووسووخه زيات شمېرکتابونه دهيوادپه رسمي ژبوچاپ کړي دي. ډاکټر محمديحيی وردک هغه لومړی وينس فرهنگي شخصيت دی چې دديپلوماسي، ځيرکتيا اوخپل ذکاوت له لارې نړيوال خيږيه ټولنوته دباوروړدليلونه اولاسوندونه وړاندې کړل ترڅوهغوی دکتا ب چاپ کولومالي لگښت په غاړه واخيست.

زه باورلرم چې ډيرزربه دډاکټر صاحب دنوموړي بې ساري خدمت په بدل کې دهغه نوم دتاريخ په پاڼوکې په زرین رنگه حروفو وليکل شي.

له دې کبله زه عاجزبنده دالله ج په دربارکې دعاکوم چې ډاکټر صاحب محمديحيی وردک ته دنوموړي نوبت، ابتکاراو خدمت په بدل کې ډيراجرونه اوثوابونه په نصيب کړي. داځکه چې دنوموړې پروژې په برکت سره دپوهنتون ډيراستادان دميدان ډگرته راودانگل اوپه پښتواودرې ژبه يې دکتابونو دليکلو فرهنگ راژوندی اوښست کېښود.

(په خورا درنښت)

پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانی ځدراني
دکابل پوهنتون دساينس پوهنځی پخوانی استاد
دتشخيصیه راديو لوژي خانگي متخصص ډاکټر غازي محمد سلطانی ځدراني
دجرمني هیواد، دمی میاشت، ۲۰۲۴ م کال


سریزه :

التراساوند Ultrasound په طبابت کې یوه نوې تشخیصیه کړنلاره ده چې دهغې په مرسته دناروغیو په پېژندنه کې د طبابت په بېلابېلو څانگو کې په زیاته اندازه کاراخیستل کېږي .

التراساوند Ultrasound هغه ډول غږ یا التراساوند ته ویل کېږي چې له شل کیلو هرڅ 20 kHz څخه لوړ فریکونسی ولري. دا فریکونسی په سالم اوبالغو انسانانو کې د اوریدلو لوړ اوریدونکی سرحد تشکیلوي. بلخوا التراسونیک څپې ultrasonic waves د غږ هغه څپې دي چې د انسان لپاره د اوریدو وړ غږ له سرحد څخه پورته وي .

د طب په څانګه کې د لوړ فریکونسی التراساوند څپو (التراسونیک (ultrasonic waves)) څخه د انسان د بدن دننه غږو د کتنې ، پېژندنې ، دناروغیو تشخیص او د اناتومي جوړښتونو التراساوند عکس د ترلاسه کولو په موخه ګټه پورته کېږي . نوموړې کړنلارې ته د التراساوند معاینه او یا په بله معنی التراسونوګرافي ultrasonography ویل کېږي او تولید شوي عکسونه د التراساوند عکسونو Ultrasound images په نوم یادېږي .

التراساوند د ګېډې ، حوصلې ، نسایي ولادي اوداسې نورو زیاتوناروغیو په تشخیص کې له ډیرې مودې راهیسې په بریالیتوب سره کارول کېږي . د التراساوند تشخیصیه ارزښت په ډېرو پېښو کې دراکړیولوژي له نورو تخنیکونو سره دناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي ، تردې چې ځینې مهال دراکړیولوژي د قیمتي او پرمختللو معایناتو لکه CT scan همدارنګه لکه د MRI له کارېدنې څخه مخنیوی کوي . د بېلابېلو ناروغیو په تشخیص او پېژندنه کې د التراساوند بېلګه داده چې نوموړې معاینه له یوې خوا پرته له دې چې بدن ته مداخله وشي په ارزانه بیه او پوره اسانۍ ترسره کېږي اوله بلې خوا سونوګرافر ډاکټر او ناروغ ته هیڅ ډول زیان نه رسوي .



۱- شکل : د التراساوند څپو د فریکونسی توپیر لرونکې ساحې اود کارولو څانګې ښوول شوې دي

په طبابت کې د التراساوند کارول په دې موخه چې د بدن د غړو څخه د لیدلو وړ عکسونه تولید شي د تشخیصیه طبي التراسونوګرافي یا ساده سونوګرافي په نوم یادېږي . په طبي التراساوند کې د بدن د غړو تشخیصیه عکس اخیستنې تخنیکونه او همدارنګه د التراساوند درملنې کړنلارې شاملې دي . د تشخیصیه طبي التراسونوګرافي انځورونه کولی شي د مختلفو ناروغیو او

شرایطو لپاره د درملنې تشخیص او لارښوونې لپاره ارزښتناکه معلومات چمتو کړي

بلخوا د تشخیصیه التراساوند ترتیلولو اړینه وړتیا داده چې د بدن د غړواناتومي اوميخانیکي جوړښت څرگند کړي ، د غړو خوځیدونکي حرکت په ژوندی بڼه وښيي ، او همدارنگه په رگونو کې د وینې جریان د لیدلو وړ کړي.

تشخیصیه التراساوند یو خوندي او بې خطرې پروسیجر دی چې د انرژي په تراوتیت قدرته صوتي څپې کاروي. هیڅ پیژندل شوي خطرونه ثبوت شوي نه دي. که څه هم التراساوند د ناروغیو په تشخیص او د بدن غړواناتومي جوړښتونو په ارزونه ، پېژندنه کې یو ارزښتناکه طبي کړنلاره ده ، مگر نوموړې کړنلاره محدودیتونه هم لري. د بېلګې په توګه د غږ څپې د هوا او یا هډوکي څخه په اغیزمن صورت نه تیریږي . نو له دې کبله التراساوند د بدن د هغو برخو انځورولو کې اغیزمن ندي چې په دوی کې ګاز شتون ولري یا د هډوکي په واسطه پټ شوي وي ، لکه سږي یا سر.

د تشخیصیه التراساوند کړنلارې په مټ نه شو کولای چې د هغو غړو جوړښتونه وګورو کوم چې د انسان په بدن کې خورا ژور موقعیت لري. د نوموړو غړو او جوړښتونو د لیدلو لپاره یو بل ډول طبي ازموینې شتون لري چې د کمپیوتر توموګرافي او مګنیتیک ریزونانس ایمجینګ او اکس وړانګې په نوم یادېږي .

د نوموړو طبي کړنلارو لنډیز په خپل وارسره په CT ، MRI او X-rays سره ښوول کېږي .

په تشخیصیه التراساوند کې د التراساوند اړونده څپې د بدن داخلي ارګانونو د جوړښت تشخیص لپاره کارول کېږي لکه تینډونونه **tendons** ، عضلات ، بندونه ، د وینې رګونه ، او همدارنگه داخلي ارګانونو د ځینې ځانګړتیاوو اندازه کولو لپاره (د بیلګې په توګه فاصله او سرعت) او یا د اورېدلو وړ معلوماتي غږ د رامینځته کولو لپاره کارول کېږي . د نوموړې کړنلارې هدف معمولاً د ناروغۍ سرچینه موندل یا د ناروغۍ نه شتون تثبیت کول دي .

د 1939 م کال څخه راپدې خوا د التراساوند څپو څخه نه یوازې د ناروغیو په تشخیص کې بلکې د درملنې په موخه هم ګټه پورته کېږي. کله چې د التراساوند څپې بدن ته ننوځي ، نو هلته په بیالوژیکي نسجونو کې جذب کېږي او د تودوخې په انرژي اوږي. دغه ډول تولید شوې انرژي ددې لامل ګرځي چې په رگونو کې د وینې جریان پیاوړی کړي ، د درد کمښت منځ ته راولي او د التهاب مخه ونیسي ، او یا یې دبیرته جوړیدلو پروسه ګړندی کړي.

په درملنه کې د التراساوند یوه بله ډیره اړینه کارونه دا ده ، چې د التراساوند لوړمیکخانیکي فشار څپو په مرسته سره ، سړی کولای شي چې په پوښتورګي او د صفر په کڅوړه کې ډبرې ماتې کړي . د التراسونیک تخنیکي وسایلو د کار کولو فریکونس د 20 kHz څخه تر څو ګیګا هرتز پورې رسیږي .

په صنعت کې هم د التراساؤنډ څخه ګټه پورته کېږي . په صنعتي توګه، التراساؤنډ د کيمياوي پروسو د پاکولو، مخلوط کولو او ګرندې کولو لپاره کارول کېږي. حيوانات لکه ماهيان او مرغان د ښکار او خنډونو د موندلو لپاره التراساؤنډ کاروي .

ډيری التراساؤنډ معاینات د بدن څخه بهر د التراساؤنډ ماشین ultrasound device په کارولو سره ترسره کېږي ،

د التراساؤنډ سکین scanning کول یا په ساده ډول التراساؤنډ معاینه کول ، یو غیر بریدکوونکې non-invasive او بې درده تشخيصیه تخنیک دی چې د انسان د بدن دننه غړو اناتومي جوړښت عکس پکې لیدل کېږي. نوموړی تخنیک دناروغیوپه پیژندنه اودرملنه کې خورا اغیزمن او په پراخه کچه کارول شوي تکنالوژي ده چې ډاکتران او طبي ماهرين یې د دې معلومولو لپاره کاروي چې د انسان په بدن کې څه پېښېږي پرته له دې چې واقعاً عملیات وکړي.

تشخيصیه طبي التراساؤنډ دلاډې موخې لپاره کارول کېږي .

- د امیدواری په جریان کې رحم او تخمدان وګورئ او د وده کونکي ماشوم روغتیا څارنه وکړئ

- د معدې ناروغۍ تشخیص کول

- د وینې جریان ارزونه کول

- د بایپسي یا تومور درملنې لپاره ستنې ته لارښوونه کول

- د سینې توخۍ معاینه کول

- د تایرایډ غدې معاینه کول

- د تناسلي او پروستات ستونزې موندل

- د ګډ سوزش (سینووايټس) ارزونه

- د میتابولیک هډوکي ناروغۍ ارزونه .

دیادولورده چې ډيری التراساؤنډ معاینات د بدن څخه بهر د التراساؤنډ ماشین په کارولو سره ترسره کېږي ، خوبیاځینې معاینات لکه د پروستات اودرحم معاینات په بدن کې دننه د کوچني التراساؤنډ الکترونیکي آلي په مټ ترسره کېږي

خطر ونه: Risks

تشخيصیه التيراساوند يو خوندي پروسيجر دی چې د ټيټ قدرت غږ څپې کاروي. هيڅ پيژندل شوي خطرونه شتون نلري. که څه هم التيراساوند يو ارزښتناکه کړنلاره ده، مگر دا محدوديتونه هم لري. د غږ څپې د هوا يا هډوکي له لارې بڼه نه خپرېږي، نو التيراساوند د بدن د هغو برخو په انځور جوړولو کې اغيزمن ندي چې په دوی کې گاز شتون ولري يا د هډوکي پواسطه پټ شوي وي، لکه سږي يا سر. التيراساوند هم نشي کولی هغه شيان وگوري چې د انسان په بدن کې خورا ژور موقعيت ولري.

ناروغ د معاینې لپاره څنگه خپل ځان چمتو کوي

ډیری التيراساوند ازموينې هيڅ تياری ته اړتيا نلري. په هر صورت، يو څو استثنایي تياری شتون لري:

- د ځينو ازموينو لپاره، لکه د کیسه صفرا التيراساوند gallbladder، ستاسو ډاکټر ممکن وغواړي چې د ازموينې دمخه د يوې ټاکلې مودې لپاره خواړه يا څښاک مه کوئ.
- نور، لکه د pelvic التيراساوند ازموينه، ممکن د متيازويوې ډکې مثاني گڅوړې ته اړتيا ولري. ستاسو ډاکټر به تاسو ته خبر درکړي چې تاسو د ازموينې دمخه څومره اوبه څښلو ته اړتيا لرئ. ادرار مه کوئ تر هغه چې معاینه ترسره شي.
- کوچني ماشومان ممکن اضافي تياری ته اړتيا ولري. کله چې د خپل ځان يا ستاسو ماشوم لپاره التيراساوند مهالویش کړئ، له خپل ډاکټر څخه وپوښئ که چيرې کوم ځانگړي لارښوونې شتون ولري چې تاسو يې تعقيب ته اړتيا لرئ.

د درملنې په موخه د التيراساوند کارول :

التيراسونوگرافي د ناروغیود درملنې په موخه هم کارول کېږي، که څه هم د درملنې لپاره کارول شوي فريکونسي معمولاً د تشخيصیه التيراساوند په پرتله د مختلف فريکونسي ساحې څخه جوړشوی وي.

۱- فزیوتراپی :

د بدن په غړو کې د التراساوند خپې یوځواتودوڅې او بلخوا د غبرانعکاسونه echoes تولیدوي. د التراساوند لخوا په ټیټه کچه تولید شوی تودوڅی داسې ښکاري چې د زخم درملنه کړندی کوي، په لومړي گام کې د هستامین histamine د تولید اسانتیا منځ ته راوړی ، او ورسره سم دویني سپین کرویات ټپي نسج ته جذبوي. په دوهم گام کې التراساوند فایبروبلاست fibroblasts هڅوي ترڅو کوليجن collagen افزاز کړي، یو فایبر fibrous پروټین چې په ښلولونکي نسج کې موندل کیږي چې د شفاهي نسج ځواک زیاتوي. التراساوند هم د زخم شاوخوا ساحه کې کارول کیدی شي ترڅو په سیمه کې د وینې جریان هڅولو لپاره معتدل تودوڅه چمتو کړي. د 3 MHz فریکونسی د ډیری پوستکي زخمونو لپاره کارول کیږي، 1 MHz د ژورو ټپونو یا د زخم شاوخوا ساحې لپاره کارول کیږي.

۲- د تومور پېژندنه او درملنه

د التراساوند کړنلاره جراحي او بایپسي Biopsy ته اړتیا نه لري اود مینوپازال وروسته میرومنو post-menopausal کې د اندومیتریل سرطان endometrial سکین کولو لپاره کارول کیدی شي. التراساوند د رحم د استر جزیاتو عکس اخلي، کوم چې د بایپسي په پرتله خورا دقیق دی. فوکس شوی لوړ شدت التراساوند په بدن کې د سرطان تومورونو له مینځه وړلو لپاره دنوې تکنالوژۍ په توگه ازمول کیږي. د لوړ قدرت شدت بیم beam چې د عادي التراساوند بیمونو په پرتله شاوخوا 10,000 ځله ځواکمن دی ، داسې ښکاري چې سرطاني حجرو په څو ثانیو کې دمنځه وړي. نوموړې کړنلاره دریسرچ په درشل کې ده .

دلورفریکونس اولورقدرته فوکس کوونکی التراساوند څپوپه مرسته د سرطان په ناروغۍ اخته غړي یوې ځانگړې برخې ته قوي beam بیم ورکوي . په پایله کې کولی شي د یو واحد تومور یا د لوی تومور یوه برخه درملنه وکړي. دبیلگې په توگه لکه .

د مقعد سرطان ، د رحم سرطان ، د نرم نسج سرکوما ، د پانقراس سرطان اود سینی سرطان



لومړۍ برخه

لومړۍ خپرکي

Physical foundation of Diagnostic Ultrasound

د تشخيصيه التراساوند فزيکي اساسات

لکه څرنگه چې فزيک د طبابت په نورو برخو کې لکه راډيولوژي ، راډيوتيراپي اوداسې نور درواخله خورازيات اهميت لري همدارنگه د تشخيصيه التراساوند په برخه کې فزيک هم د عکس اخيستلو په موخه مهم رول لوبوي . د بيلگې په توگه د التراساوند خپوه مټ د بدن غړو عکس توليد کړنلاره چې د التراسونیک تخنيک په نوم ياديږي Ultrasonic imaging technique ټول د فزيکي قوانينو په مټ ترسره کيږي .

لکه څرنگه چې الکترومقناطيسي خپې دانسان بدن څخه تيريږي ، په همدې ډول د التراساوند خپې هم کولای شي بدن ته ننوځي ، او هلته د غړو سره غبرگون وکړي . د نوموړې فزيکي کړنلارې په بنسټ نن ورځ د التراساوند خپو څخه د ناروغيو په پيژندنه اود رملنه کې په پراخه کچه گټه پورته کيږي . **د التراساوند خپې د الکترومقناطيسي خپو په برخلاف د پراختيا لپاره يوې مادې ته اړتيا لري .** کله چې د التراساوند خپې په يوه ماده ولگيږي نومالیکولونه يې په رپيدلو پيل کوي او په ځينو ځايونو کې مالیکولونه سره غونډيږي ، او په بل ځای کې د يوه اوبل نه ليري کيږي . په پايله کې د مادې يوه ميخانيکي څپه منځ ته راځي چې دلارې په مسير کې مخ په وړاندې خوځيږي . داپه دې معنی، چې د التراساوند خپې اوږدې خپې (طولاني امواج) دي .

التراسونیک عکسونه چې د سونوگرام په نوم هم ياديږي ، هغه مهال توليد کيږي کله چې د يوې سرچينې څخه چې د پروب Probe په نوم ياديږي د التراساوند پلزونو pulses خپور شي اود بدن په نسجونو باندې ولگيږي ، د التراساوند لپرونکي صوتي پلزونو د بدن د نسجونو توپير لرونکي

جوړښتونو او کثافت سره سم په توپیر سره انعکاس کیږي او د دیکتوریا probe په مټ اندازه کیږي چې د تلویزیون په پرده باندې لیدل کیږي. په بله معنی د التراساوند انعکاس څخه وروسته د التراساوند پلزونه عکس تولید کوي.

طبي التراساوند : Medical ultrasound

طبي التراساوند په دوه برخو ویشل کیږي. تشخیصیه التراساوند او د درملنې التراساوند.

۱- تشخیصیه التراساوند :

د تشخیصیه التراساوند په څانګه کې د تشخیص تخنیکونه (په عمده ډول د عکس اخیستنې تخنیکونه) شامل دي، تشخیصیه التراساوند بدن د داخلي جوړښتونو انځور جوړولو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، عضلات، بندونه، د وینې رګونو، او داخلي ارګانونو، د ځینې ځانګړتیاوو اندازه کولو لپاره (د بیلګې په توګه فاصله او سرعت) یا د معلوماتي اوریدونکي غږ رامینځته کولو لپاره کارول کیږي.

۲- د درملنې التراساوند :


د التراساوند هغه څانګه ده چې د درملنې په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي. د درملنې التراساوند عموماً هر ډول التراسونیک پروسیجر ته ویل کیږي چې د درملنې ګټې لپاره التراساوند کاروي. په ۱۹۵۰ کال کې فزیوتراپیوتیک التراساوند کلینیکي معاینه ترسره شوه، په ۱۹۸۰ کال کې د لیتوتریپسي lithotripsy کړنلاره معرفي شوه چې د التراساوند په کارولو سره په بدن کې پرته له جراحي څخه ډبرې stone ماتېږي.



دالٲراساوند اصطلاحونه (Ultrasound Terminology)

صوت يا غږ : Sound

صوت هغوميځانيکي اهتزازونو ته ويل کيږي چې داوريډلووړوي اوپه يوه ماده کې دڅپوپه بڼه خپريږي. داوريډلووړ صوت فريکونس دښپاړسو هرڅ څخه آن ترشل زره (16 Hz - 20 000Hz) هرڅ پورې رسيږي .



۲- شکل: د صوت څپې په هوا کې داتموسفير فشارميځانيکې څپې منع ته راولي. نوموړې څپې ددې لامل گرځي، چې د هوا په ځينو برخو کې ماليکولونه راغونډ شي (Compression) يانې د کثافت کچه يې ډيره اوپه بل ځاي کې لږشي. په پايله کې دهواماليکولونه په اهتزاز راځي.


◀ دالٲراساوند څپې دلورفشاراوٲيٲ فشارزيگنالونه دي چې په يوه ماده کې خپريږي.

ماورأ صوت : Ultrasound

ماورأ صوت يالٲراساوند هغواهتزازونو ته ويل کيږي چې فريکونس يې د شل کيلوهرڅ څخه 20 KH ان ترلس گيگا هرڅ پورې رسيږي اودانسان په غوږونه اوريډل کيږي. په طبابت کې دماورأ صوت څپې د بدن غړو، نسجونواودمورپه نس کې داوولاد تشخيص په موخه کارول کيږي.

فريکونسي : Frequency

فريکونسي هغه شمير اهتزاونه دي، چې په يوه پرلپسې بيرته راگرځيدونکي (Periodic) فزيکي کړنلاره او يوه ثانيه کې ترسره کېږي. د فريکونسي واحد ته هرڅ ($\text{Hz} = \text{Hz}$) ويل کېږي. که چيرته په يوه ثانيه کې يواځه يوه ورسپړي نو د يوه هرڅ سره سمون خوري اوداسې ليکل کېږي. ($1\text{Hz} = 1/\text{s} = \text{s}^{-1}$)



فريکونسي :- د يوې پريودیک پېښې د اهتزازونو شمير ته ويل کېږي چې په واحد وخت کې ترسره کېږي. په پريودیک ډوله پېښو کې لکه الکترومقناطيسي څپې، څرخيدونکي حرکت اويا اوسيليشن oscillations کې فريکونسي په واحد وخت کې د پېرو شمير ته ويل کېږي. د فريکونسي واحد په هرڅ بنوول کېږي چې د يو جرمني فزيک پوه Heinrich Hertz په وياړ نومول شوی دی. يوه هرڅ 1 Hz داسې تعريف شوی دی چې يوه پېښه په يوه ثانيه کې بيرته تکرار کېږي.

يوهرڅ مساوی دی له : يواځه يوه ثانيه کې يانې : $1\text{ Hz} = \frac{1}{\text{s}}$ که چيرته هغه وخت چې د يوې پېرې لپاره په کار دی په T ونيونو همدا پريودیک وخت T د فريکونس f سره معکوساً متناسب دی.

$T = \frac{1}{f}$ ، د بيلگې په توگه که چيرته 71 پېښې په پينځلس ثانيو کې ترسره شي نو فريکونس يې مساوی دی له : $f = \frac{71}{15\text{ sec}} = 4.7\text{ hertz}$ ، په لاندې جدول کې د فريکونسي f او پريودیک وخت T ترمنځ اړيکې محاسبه شوې دي.

Frequency فريکونسي	1 mHz (10^{-3})	1 Hz (10^0)	1 kHz (10^3)	1 MHz (10^6)	1 GHz (10^9)
Period (time) پريودیک وخت	1 ks (10^3)	1 s (10^0)	1 ms (10^{-3})	1 μ s (10^{-6})	1 ns (10^{-9})


۱- جدول : د فريکونسي او پريود وخت ترمنځ اړيکې او واحدونه کښل شوي دي

د څپې اوږدوالی: Wavelength

په یوه اهتزازي حرکت کې دڅپې طول عبارت له هغه واټن څخه دی چې یوه څپه یې په یوه ځایز spatial پریود کې طی کوي. همدارنګه ولاړې څپې او حرکت کوونکې څپې شته دي. که چیرته یوه ساین ډوله څپه چې دڅپې طول یې λ دی، اوفریکونس یې f دي په یوه ثابت خپريدلو سرعت V حرکت کوي نو دڅپې طول یې مساوي دی له

$$\lambda = \frac{v}{f},$$

د التراساوند څپې داسې څپې دي چې د یوې مادې مالیکونه د التراساوند خپريدولو سمت په اوږدو کې اهتزاز کوي. د التراساوند څپې اوږدوالی λ د دوه ګاونډیو څپو تر ټولو جګولمنوترمنځ واټن ته ویل کیږي. دغه واټن دلامبدا په λ حرف بنودل کیږي.



۳- شکل: په دغه شکل کې ددری میګا هرڅ (3 MHz) اوشپرمیګا هرڅ (6 MHz) څپوترمنځ توپیر بنودل شوی چې د التراساوند یوې کوپړۍ یا پروب څخه خپریږي. د شکل په پورتنۍ برخه کې د التراساوند څپې اوږدوالی $(\lambda = 0,5 \text{ mm})$ او لاندنۍ برخه کې د التراساوند څپو اوږدوالی $(\lambda = 0,25 \text{ mm})$ قیمت لري.

امپلیتود: Amplitude


د اهتزاز دامنه (امپلیتود): - د اهتزازاتوپه بحث کې اعظمي بعد ته د اهتزاز دامنه ویل کیږي. دوخت په تراودیوه بدلیدونکي اورپیدونکي فزیکي کمیت تر ټولو اعظمي قیمت ته وایي. په ۴- شکل کې دیوه متناوب ولتییج U اهتزاز دوخت t په تابع سره بنوول شوی دی.

۱- $(\hat{u})$ د امپلیتود څوکه

۲- $(2\hat{u})$ دیوې څوکې څخه تربلې څوکې پورې امپلیتود برخه



۳- $\hat{u}/\sqrt{2}$ دامپلیتودو سطحي مربع جذر

۴- دڅپې یوه پېره (سایکل)



۴- شکل : دالتراساوند خپې امپلیتود بڼه کښل شوې ده

➤ امپلیتود د یوه اهتزاز هغه اعظمي بعد ته وایي چې دخپل سکون حالت او یا تم ځای څخه تر سره کیږي.



۵- شکل: په عمودي محور کې د التراساوند فشار خپې امپلیتود (Amplitude) او په افقي محور کې د خپریدلو واټن ښودل شوی دی.

د التراساوند سرعت c ، د التراساوند خپې λ او د التراساوند فریکونسي f تر منځ لاندې اړیکې شته دی.

$$\lambda \times f = c$$

د صوت شدت : Sound intensity

د صوت شدت دهغې میخانیکي انرژۍ څخه عبارت دی چې په واحد دوخت او په واحد سطحې په یوه ماده لګیږي. واحد یې واټ په متر مربع دی (Watt/m^2)

د صوت شدت لیول : Sound intensity level

د صوت شدت لیول یوداسي فزیکي کمیت دی چې دیوه اندازه شوي صوت شدت کچه $I_{\text{intensity}} = I$ دیوه بل ستاندارد ټاکل شوي صوت شدت سره ، چې قیمت یې $(I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2)$ دې، پرتله کوي. دتعریف سره سم لیکو:

$$\text{Sound Intensity level} = 10 \times \log \frac{I}{I_0} \quad [\text{Decibel} = \text{dB}]$$

د صوت شدت واحد په دیسیبل (Decibel = dB) بنودل کیږي.

د صوت فشار لیول : Sound pressure level

د صوت شدت فشار لیول یوداسي فزیکي کمیت دی چې دیوه اندازه شوي صوت فشار کچه $P_{\text{pressure}} = P$ دیوه بل ستاندارد ټاکل شوي صوت فشار سره ، چې قیمت یې $(P_0 = 10^{-5} \text{ Pascal})$ دې، پرتله کوي. دتعریف سره سم لیکو:

$$\text{Sound pressure level} = 20 \times \log \frac{P}{P_0} \quad [\text{dB}]$$

د صوت فشار واحد په دیسیبل (Decibel = dB) بنودل کیږي.

ماتحت صوت : Infrasound


د صوت هغوڅپوته ویل کیږي چې فریکونسي یې د شپاړس حرخ څخه ښکته وي ($<16 \text{ Hz}$). نوموړې څپې دالاستیکي اهتزازونو په پایله کې په ځمکه ، اوبو، هوا، موټرو اوباد په واسطه منځ ته راځي.

ماتحت صوت د صوت هغوموجونوته ویل کیږي چې د اهتزازونو شمیرې د شپاړس هرخ 16 Hz څخه ټیټ وي اودانسان په غوږو نه اوریدل کیږي . نوموړې څپې په اوبوکې تردیرلیږي واته په پورې رسېږي . ځینې حیوانات لکه پیل، زرافه او نهنگ آبی ددې وړتیا لري چې د ماتحت صوت یوه برخه واورې او په دې توګه دیوه بل سره د مالوماتو راکړه ورکړه وکړي .

تشخيصيه التهراساوند : (Diagnostic Ultrasound)

نوموړې هغه څپې دي چې فریکونسي یې د شل کیلوهرخ 20 kHz څخه پورته دی اودناروغیو د پیژندنې په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي. د بېلې خوا د دو بلر التهراساوند

(Doppler Ultrasound) اله، چې د وينې سرعت اندازه کوي، د زيگنالونو فريکونسي يې د دوه کيلوهرخ (2 kHz) په ساحه کې دي، نو له دې کبله په غوږ واوريډل کيږي.



۶- شکل: په نوموړې شکل کې د صوت څپې بنودل شوې دي، چې فريکونسي يې د شل کيلو هرخ څخه تر دیرش ميگا هرخ پورې رسيږي (Siemens) ماخذ.


د صوت سرعت:

د صوت زيگنال په هره ماده کې په يوه ټاکلي سرعت سره خپريږي. دا ځکه چې د صوت سرعت په مايع، غاز او جامده ماده کې په توپير سره مخ په وړاندې ځي. څرنگه چې د صوت زيگنال د مادې يوه ماليکول څخه بل ماليکول ته انتقال کيږي، نو په يوه ماده کې چې کثافت يې لوړ وي لکه هډوکي، د نرم نسج او د شلې غوښې په پرتله لږ څه دوه ځله ډیر سرعت لري. د تخنيکي اسانتيا په موخه اودا چې د صوت سرعت د بدن په غړو کې لږ څه يوشان دی، نو د التراساوند په ټولو آلاتو کې د صوت منځنی سرعت 1540 m/s څخه کار اخيستل کيږي.

د صوت فريکونسي اود څپو اوږدوالي ترمنځ اړيکې:

صوت د يوې اوږدې بدلیدونکې فشار څپو اويا په بل عبارت د يوې ميخانيکې څپې په ډول په يوه ماده کې خپريږي. څرنگه چې د صوت سرعت (c) د يوې مادې په خواصو پورې اړه لري نو له دې کبله په هره ماده کې توپير لري. د بيلگې په ډول د صوت سرعت په هوا کې 300 m/s او په اوبو کې 1500 m/s . د انسان په پستونو سږونو کې د صوت سرعت د اوبو سره برابری اود 1450 m/s څخه تر 1570 m/s پورې رسيږي. د صوت ټولې نړيوالې تخنيکې الې د يوه ستاندارد منځني سرعت $c = 1540 \text{ m/s}$ څخه کار اخلي. که چيرته موږ د صوت سرعت وپيژنو، نو په


بدن کې دیوه انعکاس شوي صوت زیگنال دتگ او راتگ وخت داندازه کولوله لارې، کولای شو چې دیوه غږي اناتومي بڼه اوداچې په بدن کې خومره ژورپروت دی، معلوم کړو.



۷- شکل: یوپیرویود یا یوسایکل دخپې اوږدوالۍ ته ویل کیږي، چې دامپلیتود ددوه اعظمي څوکوترمنځ واټن سره برابر دی. د صوت سرعت مساوي دی له فریکونسي ضرب خپې اوږدوالۍ.

څوړندجسم لکه رقاصه (pendulum)


کله چې یوڅوړند جسم دمرکزثقل څخه د ۷- شکل سره سم د یوه (1) په عد د بنودل شوي ځای ته راوړغول شي، اوبیا پریښودل شي، نو لومړی ښي اړخ ته اوبیا بیرته کین اړخ ته یوراگرځیدونکې حرکت ترسره کوي. نوموړې کړنلاره داهتزاز یا ریډل (Frequency) په نوم سره یادېږي. که په یوه ثانیه کې دغه جسم دیوه ټاکلي ځای څخه یوځل ښي خواته وزغیږي اوبیا بیرته راوگرځي نوپه دغه کچه اهتزازد یوه هرڅ (Hz = Herz) په نامه یادېږي. په یوه ثانیه کې یوه دوره یا یوه پېره له یوه هرڅ سره مساوي ده



۸- شکل : داهتز از واحد تعريف درقاصي په مرسته بنودل شوی دی چې مساوي ديوهرخ سره دی $\text{Herz} = \text{Hz} = 1/\text{s}$

داوږدوڅپو منځ ته راوستل: (Waves)

په پورتنی 2a شکل کې ګڼ شمیر فلزي ګرد جسمونه په دوه لرګیو څوړند او د سکون په حالت کې لیدل کېږي. کله چې د څنډې یو جسم ته ضربه ورکړل شي، نو حرکي انرژي ترلاسه کوي، او په خپل وارسره یې ګاونډیو فلزي جسمونو ته انتقال کوي. په پایله کې یوه اوږده څپه منځ ته راځي.



۹- شکل : داوږدوڅپو Longitudinal waves منځ ته راوستلو کړنلاره بنوول شوی دی

د صوت سرعت c ، د صوت څپې λ او د صوت فریکونسي f تر منځ لاندې اړیکې شته دی.

$$\lambda = c/f \quad (1)$$


د پورتنی فرمول څخه مالومېږي چې که فریکونس پورته ځي نو د صوت څپې لنډېږي. د بلې خوا د نسجونو تر منځ د توپیر کولو فزیکي کمیت یا ځای تحلیل (Resolution) د صوت فریکونسي سره سم سیخ متناسب دی. همدا لامل دی چې د صوت فریکونسي د بدن یوه غړي التراساوند په عکس باندې ډیر اغیزه لري.

Frequency and Wavelength فريكونسي اود ٲيپي اورڊوالي		
Frequency range	$f = 2 \text{ MHz to } f = 30 \text{ MHz}$	د صوت اوريدلو فريكونسي ساحه
Velocity of sound	$c = 1540 \text{ m/s (Tissue)}$	په نسجونو كې د صوت سرعت
Wavelength	$\lambda = c/f$	د صوت ٲيپي اورډوالي
Range of wavelengths	$\lambda = 0.77\text{mm to } 0.05\text{mm}$	د صوت ٲيږود اورډوالي ساحه

د نسجونو سره د الٲراساوند غبرگون (Interaction of ultrasound waves with tissues)

كله ٲي د الٲراساوند ٲيپي بدن ته ننوځي، نودنسجونو سره لاندني فزيكي غبرگونونه تر سره كوي، ٲي په ۱۰- شكل كي بنودل شوي دي.

- ✖ انكسار (refraction)
- ✖ انعكاس (reflection)
- ✖ په نسجونو كې جذب (Absorption)
- او كمزورتيا (Attenuation)
- ✖ شيندل (scattering)
- ✖ د ٲيل سمت نه كريدل (diffraction)
- ✖ تيريدل (transmission)




۱۰- شکل: دمدادی سره دالتراساوند هراړخیزفزیکی غیرگونونه

التراساوند ماشین : Ultrasound Machine

په ۱۰ الف شکل کې دالتراساوند ماشین بنوول شوی دی د التراساوند ماشین یوه طبي دستگاه ده چې دالتراسونیک انعکاس شوو التراساوند خپو په مرسته د بدن د نسجونو او غړو عکسونو images تولید لپاره کارول کیږي. د التراساوند ماشین په مرسته دناروغ معاینه کول اود تشخیصیه عکس اخیستلو تخنیک د التراسونوگرافي ultrasonography په نوم یادېږي. د التراساوند عکسونه عموماً د 1.6 څخه تر 10 میگاهرخ

(MHz) تر مینځ د غږ څپو په کارولو سره تولید کیږي. څرنگه چې د بدن نسجونه یو دبل څخه توپیر لرونکی کثافت لري نو له دې کبله د بدن نسجونه د التراساوند څپوته په مختلف ډول انعکاس ورکوي. نوموړی کړنلاره سونوگراف ته اجازه ورکوي چې داناتومي جوړښتونو ترمنځ توپیر وکړي

- A Begin with a new patient
- B Enter name (ID)
- C Menu selection, e.g., abdomen, thyroid gland
- D Change of transducer
- E Freeze
- F Gain
- G Depth gain compensation (DGC)
- H Image depth/field of view
- I Trackball for positioning the dot or range markers
- J Measurements
- K Annotation
- L Body marker
- M Image recording



۱۰ الف شکل : التراساوند ماشین بنوول شوی دی

د التراساوند ماشین د دریو عمده برخو څخه جوړ شوی دی

◀ التراساوند کوپړی یا **Transducer (probe)**

◀ کمپیوتر **Computer**

◀ **TV Screen Monitor**

لومړی : التراساوند پړوب یا ترانسډیوسر (Transducer (probe)

دالتراساوند کوپړی دیوه اویا ډیرو پیڅو بریښنایز کریستالونو (Piezoelectric cristal elements) څخه جوړه ده، چی دیوې خوا دالتراساوند سرچینې په ډول کارورکوي، او د التراساوند څپې استوي (Emitter)، اود بلې خوا د التراساوند انعکاس شوو څپو درانیوونکي (Receiver) په ډول کارکوي.


د التراساوند دغه ډول سرچینه چې دیوه جامد کریستال څخه جوړه وي، د ترانسډیوسر **Transducer** په نامه سره یادېږي. داڅنگه، چې نوموړی کریستال د التراساوند څپو میخانیکي انرژي په بریښنایز انرژي، او برعکس بریښنایز انرژي په میخانیکي انرژي اړوي. دبیلگې په ډول د کوارڅ کریستال (Quarz cristal) داسې خواص لري چې که د التراساوند څپو تر میخانیکي فشار لاندې راشي، نو په منځ کې یې یو بریښنایز ګڼال (Signal) پیدا کېږي او پڼدوالی یې په یوه ټاکلې کچه Δs کوچنی کېږي. دغه زیګنال د سترولو څخه (amplifying) وروسته دیوه مونیتور یانې تلویزیون په پرده (screen) لیدلای شو. د بلې خوا که چیرته په نوموړی کریستال باندې یو متناوب ولتيج کینودل شي، نو پڼدوالی یې د Δs په کچه غټیږي او کوچنی کېږي او په پایله کې په ریډلویانې اهتزاز (Oscillation) پیل کوي.

هغه کریستالونه چې بریښنایز انرژي په میخانیکي انرژي او برعکس میخانیکي انرژي په بریښنایز انرژي بدلوي، د التراساوند ترانسډیوسر (Ultrasound transducer) په نامه سره یادېږي. ټول هغه مواد او کریستالونه چې نوموړي خواص ولري، د پیڅو کریستال په نامه سره یادېږي. د التراساوند په ترانسډیوسر کې د څپو تولید په موخه لږ څه څلور سوه کوچني پیڅو کریستالونه کارول کېږي.


په ۱۱- شکل کې د التراساوند ترانسډیوسر فزیکي کړنلاره ښودل شوې ده، چې یوځل د التراساوند څپې یانې زیګنالونه استوي، اویا انعکاس شوي زیګنالونه، چې د څوملي ثانې څخه وروسته ورته بیرته رارسېږي، رانیسي.

هډوکي	تريخی	ینه	غوړ	وینه	اوبه	فريکونسي
92%	9%	16%	17%	4,5%	0,005 %	1.0 MHz
98%	28%	43 %	48%	15%	0,6%	3,5 MHz
100%	48%	68%	72%	27%	2,2%	7,0 MHz

۲- جدول: په یوه سانتي متر پنډ اوتوپير لرونکو موادو کې دفریکونس په تابع سره د التراساوند جذب کیدل ښودل شوی دی. د جذب کیدلو واحد سلیزه برخه ټاکل شوی ده. دبیلګې په ډول په یوسانتي متر هډوکو کې او داوومیګا هرڅ لپاره دالتراساوند د جذب کچه سل په سل ده (100%).



۱۱- شکل: دکین اړخ په یوه پیڅوکریستال باندې بریښنايزمتناوب ولتيچ کيښودل شوی، چې په منځ کې يې اهتزازونه پيدا کيږي اود التراساوند څپې خپروي Transmitter. کله چې د التراساوند څپې د بدن په نسجونو ولگيږي او هلته انعکاس وکړي او دکریستال خواته بیرته راوگرځي، نو په همدغه کریستال کې بریښنايز ولتيچ منځ ته راځي. دغه وروستی کړنلاره په ښي اړخ کریستال کې ښودل شوې ده چې د (Receiver) په نوم ياديږي.



۱۲ شکل: د فزیکي کړنلارې پيڅورينښنايز اغيزه دکوارڅ کريستال ($\text{Quarz} = \text{SiO}_2$) لپاره بنودل شوي ده چې ماليکول يې يواتوم سيليسيم (Si) اود دوواکسيجن اتومونو څخه جوړ دی (SiO_2). د شکل په کيڼ اړخ کې دکوارڅ ماليکولونه د يوه اوبل سره په داسي يومنظم ډول نښتي دي، چې مثبت اومنفي چارجونه يې يوبل سره دفع کوي، نوله دې کبله د بهر خواته په برينښنايز تراو خنډ پاتې کيږي. په ښي اړخ کې دکوارڅ کريستال په بهرنۍ سطحه يوميخانيکي فشار Press اغيزه کړې ده.

په پايله کې دکوارڅ ماليکولونه په يوه بل کې ننوځي اود کريستال حجم لږ څه کوچنی اوپلن کيږي. د بلې خوا برينښنايز چارجونه هم دخپل ځای څخه لږ څه بهرنۍ سطحې ته ښوريدلي دي. دکوارڅ په لاندنۍ سطحه کې مثبت اومخامخ پورتنۍ سطحه کې منفي چارجونه راټوليږي. داپه دې مانا چې دميخانيکي فشار په مرسته دکوارڅ په باندنۍ سطحه کې يوبرينښنايز ولتيج لاس ته راځي، دغه ولتيج ددوه فلزي لوحو په مرسته د يوه الکترونيکي سرکټ سره تړل کيږي اود يوې سرچينې په توگه ورڅخه گټه پورته کيږي.




د تشخيصيه راډيولوژي څانگې متخصص ډاکټر غازي محمد سلطاني ځدراني د التراساوند آلې په مرسته د يوه ناروغ معاینه کولوپه حالت کې ليدل کيږي . په نوموړي شکل کې د التراساوند آلې ، درې ډولونه التراساوند ترانسډيوسر او يومونيتور يا د تلویزيوني پرده هم ليدل کيږي .

د التراساوند د عکس اخيستلو سرکيټ (Ultrasound imaging circuit)

په ۱۳- شکل کې د بدن يوې برخې التراساوند د عکس اخيستلو سرکيټ شودل شوی دی. کله چې د التراساوند ترانسډيوسر څخه د التراساوند څپې خپري شي نو په بدن کې د توپير لرونکو غړو په پوله کې په توپير سره انعکاس کوي او د التراساوند کوپري يعنې

ترانسديوسر ته بيرته راگرځي. د التراساوند په کوپړۍ کې دغه صوتي څپې د يوه پيڅوکريستال په مرسته سره په برېښنايزيگنال اړول کېږي. نوموړی زيگنال د يولېکټرونیکي کړنلارولکه ستروونکی gain، ديمودولاتور Demodulator او نور وڅخه وروسته د يوه التراساوند طبي عکس په بڼه د يوه مونيتور په پرده ليدل کېږي.



۱۳- شکل : دالتراساوند آلې د عکس اخيستلو برېښنايز سرکيټ او د برېښنايزيگنال اړوونکو الکترونیکي برخې ښودل شوې دي.

د الٲراساوند اندازه کولوپرنسپ

په ۱۴- شکل کې د الٲراساوند آلې دکارکولو فزیکي کړنلاره ښودل شوې ده. په لومړۍ پړاو کې د الٲراساوند کوپړۍ څخه صوتي زیگنالونه خپریږي چې موده یې لږڅه یومایکروثانیه ($1 \mu s$) ده. دنوموړي وخت څخه وروسته، د الٲراساوند کوپړۍ سمدلاسه د لیږونکي Transmitter څخه وځي اود رانیوونکي Receiver په توگه په کارپیل کوي. په دې ترڅ کې هغه وخت اندازه کیږي چې دصوتي زیگنال دخپریدلوڅخه پیل کیږي او دانعکاس څخه وروسته بیرته د الٲراساوند کوپړۍ ته رارسیري. دغه وخت په t_E سره ښودل شوی دی. څرنگه چې دیوې خواپه نسجونو کې د الٲراساوند خپریدلوسرعت c پیژنواودبلي خوا د الٲراساوند زیگنال دتگ اوراتگ وخت t_E اندازه کولای شو، نودلاندې معادلې په مرسته د الٲراساوند آلې په یوه کمپیوترکې د الٲراساوند ترانسډیوسر transducer اود یوه غړی ترمنځ واټن d ترلاسه کیږي.

$$2 d = c \times t_E \quad (2)$$

دنوموړې معادلې له مخې ، دلږڅه دوه سوه مایکروثانیوڅخه وروسته، دهغوغړوعکسونه اخیستل کیدای شي، چې تر پینځه لس سانتي متره پورې په بدن کې ژورپراته وي. دنوموړې مودې څخه وروسته یو بل صوتي زیگنال خپریږي اوورپسې، سمدلاسه، د الٲراساوند ترانسډیوسر transducer سرچینه، دلیږونکې حالت څخه اوړي، اود رانیونکي آلې په صفت کار پیل کوي.

❖ دصوتي زیگنالونودغه لیږونکې اورانیونکې کړنلاره په یوه ثانیه کې ددریوزروڅخه تربینځه زروڅلوپورې تکرارکیږي.


گیل (Gel)

د بدن پوستکي اود الٲراساوند کوپړۍ ترمنځ تل هوا شتون لري. کله چې د الٲراساوند کوپړۍ څخه د الٲراساوند څپې خپری شي اوپه هواولگیږي، نوپه بشپړډول بیرته انعکاس کوی. داپه دې مانا چې د الٲراساوند څپې گردسره دناروغ بدن ته نه رسیږي اوله دې کبله عکس هم منځ ته نه شي راتلای. دنوموړې تخنیکي ستونځې دحل په موخه دیوډول ټینګ مایع ډوله موادوڅخه کاراخیستل کیږي، چې دگیل په نامه یادیري. دغه مواد د بدن پوستکي اود الٲراساوند کوپړۍ تر transducer منځ اچول کیږي اوپه دې ډول د هوا ورننوتلومخنیوی کوي.

د نوموړو موادو څخه د التراساوند خپې پرته له کوم مقاومت او انعکاس په اسانۍ سره تیرېږي. د گیل ځینو موادو نومونه دادي: کاربوپول Carbolpol ، ای دي تی ای EDTA، ترولامین Trolamin

د التراساوند استوونکی زیگنال

د التراساوند انعکاس شوی او رانیونکی زیگنال




۱۴- شکل: دیوه فریکونس جنراتور څخه بریښنا یز زیگنالونه خپریږي اود التراساوند په کوپړۍ کې په صوتي زیگنالونو اوږي. دغه صوتي خپې د بدن نسجونو سره غبرگون کوي اود التراساوند transducer ته بیرته انعکاس کوي. په کین اړخ کې یو غټ صوتي زیگنال لیدل کیږي، چې د التراساوند کوپړۍ transducer څخه خپریږي او لږ څه یوه میکروثانیه وخت نیسي ($T_s = 1 \mu s$). په ښي اړخ کې یو کوچنی صوتي زیگنال لیدل کیږي چې د انعکاس څخه وروسته د التراساوند کوپړۍ transducer ته رارسېږي اودوه سوه میکروثانیو وخت نیسي ($T_E = 200 \mu s$).

دپلس انعكاس تخنيك (Pulse-Echo Technique)

دالتراساوند طبي اله د التراساوند يوې سرچينې (transducer) او يولې نوروتخنيکي برخوڅخه جوړه ده. ترانسديوسر د التراساوند ميخانيکي څپې استوي اوبيايې بيرته رانيسي. په لومړي پړاو کې، يوځانگړی برېښنايزيگنال د ترانسديوسر اتومونه په اهتزازولي، چې په پايله کې د التراساوند فشار څپې ورڅخه خپريږي او په لاره کې دنسجونوسره غبرگون کوي. کله چې د التراساوند فشار څپې دنسجونوسره ولگيږي، نويوه برخه يې بيرته دسرچينې وخوا ته انعکاس کوي او په ترانسديوسر کې برېښنايزيگنال منځ ته راولي، چې د ستریدلوڅخه وروسته ديوه مونيتور (Monitor) په پرده دليدلو ورگړي. که چيرته د التراساوند سرچينې اودنسجونوترمنځ واټن په x اودانعکاس شوي زيگنال دتگ اوراتگ وخت په t ونيو اوومنو، چې د التراساوند سرعت $c = 1540 \text{ m/s}$ دی، نولاندنی معادله لاس ته راځي:

$$x = \frac{1}{2} c t$$




۱۵ - شکل: د التراساوند سرچینې څخه څپې خپرېږي اوديوه شي اویا د بدن نسجونوسره انعکاس کوي اوبیرته دسرچینې وخوا ته خوځېږي (Siemens).

د التراساوند انعکاس (Acoustic Reflection)

کله چې د التراساوند څپې دیوډول نسجونوڅخه یو بل ډول نسجونوته ننوځي، نودلویدونکوڅپویوه برخه دهغوی دتماس په سرحدي برخه کې انعکاس کوي. داځکه چې دتوپیرلرونکو نسجونو صوتي مقاومت ($\text{Impedance} = Z$) سره یوشان نه وي. د التراساوند مقاومت (Z) دیوه ټاکلي نسج د کثافت (ρ) او په دغه نسج کې د التراساوند سرعت (c) د حاصل ضرب څخه ترلاسه کیږي. دیوه نسج دمقاومت لپاره لیکلای شو:

$$Z = c \times \rho$$



۱۶ - شکل: دشي اړخ توپیرلرونکو نسجونوپه پوله کې دلویدونکي التراساوند زیځنال ډیره برخه دکین اړخ توپیرلرونکو نسجونوپه پرتله بیرته انعکاس کوي. داځکه چې د کین اړخ نسجونوترمنځ لږمقاومت اودشي اړخ نسجونوترمنځ ډیرمقاومت شته دی (Siemens).

کله چې دالتراساوند خپې بدن ته ننوځي ، نودالتراساوند انرژي په دریوبرخویشل کیږي. د انرژي یوه برخه په نسجونو کې جذب کیږي، د انرژي بله برخه یې بیرته انعکاس کوي اودریمه برخه انرژي دنسجونوڅخه تیریري. هرڅومره چې ددوه نسجونوترمنځ د التراساوند مقاومت توپیر زیات وي، په همغه کچه ډیره انرژي بیرته د التراساوند سرکوپړی (Transducer) وخوا ته انعکاس کوي اوله دې کبله درانیوونکي زیگنال دامنه یانې امپلیتود (Amplitude) هم لوړه کیږي.


د بدن په نسجونو کې دالتراساوند مهم فزیکي کمیتونه				
د بدن نسجونه	د التراساوند سرعت c [m/s]	د بدن په نسجونو کې د التراساوند مقاومت Z [kg/cm ² .S]	کثافت P [g/cm ³]	داوبوپه پرتله دانعکاس ضریب Ref.factor
اوبه Water	1490 m/s	152 (Kg/cm ² .S)	0,997 (g/cm ³)	0
هوا Air	330 m/s	0,04 (Kg/cm ² .S)	0,0012 (g/cm ³)	0,999
دینې نسجونه Liver	1560 m/s	164 (Kg/cm ² .S)	1,055 (g/cm ³)	0,054
وازده Fat	1400 m/s	138 (Kg/cm ² .S)	0,928 (g/cm ³)	0,042
د غظلاتونسجونه Muscle	1568 m/s	158 (Kg/cm ² .S)	1,058 (g/cm ³)	0,054
دهډوکونسجونه Bone	3360 m/s	722 (Kg/cm ² .S)	1,58 (g/cm ³)	0,614

۲- جدول: په هوا کې د التراساوند سرعت ترټولو لږ (330 m/s) او په هډوکو کې ترټولو لوړ (3360 m/s) قیمت لري. د بلې خوا د التراساوند انعکاس په اوبو کې صفراو په هوا کې ترټولو لږ قیمت لري اولږڅه دیوه سره مساوي دی.

دپورتني جدول څخه څرگنديږي چې دهډوکواو نورو نسجونو تر منځ د صوتي مقاومت توپير ډير لوړ دی. همدا لامل دی چې په هډوکوکې د التراساوند خپودانرژي لږ څه ټوله برخه انعکاس کوي او پاتې برخه يې په هډوکوکې جذب کيږي. دا په دې مانا چې د التراساوند څپې دهډوکو څخه نه شي تيريدلای اوله دې کبله د التراساوند په عکس کې ټول هغه غړي اونسجونه چې د هډوکو تر شا پراته وي نه ليدل کيږي. دهډوکو تر لاندې اناتومي برخه د التراساوند په عکس کې تکه توره مالومیږي.

په ۱۷- شکل کې د التراساوند يوه څپه بنودل شوې ده چې دامنه يانې امپليټود (Amplitude) په A_0 بڼيو او د يو ډول نسجونو څخه بل ډول نسجونو ته ننوځي. د دواړو نسجونو په سرحدي برخه کې درالويدونکې څپې A_0 يوه برخه انعکاس کوي A_R او يوه برخه A_T يې تيریږي. که چيرته د پورتنی برخې نسجونو کثافت په ρ_1 اود التراساوند سرعت په c_1 او دلاندې برخو نسجونو کثافت په ρ_2 اود التراساوند سرعت په c_2 سره وښيو، نو دامپليټود انعکاس A_R لپاره لاندنی معادله ترلاسه کيږي:

$$\frac{A_R}{A_0} = \frac{\rho_1 c_1 - \rho_2 c_2}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2}$$



دالتراساوند لويدونکې امپليټود مساوي دی له A_0
 دالتراساوند انعکاس شوی امپليټود مساوي دی له A_R
 په دویم ډول نسجونو کې تير شوی التراساوند
 امپليټود مساوي دی له A_T

دالتراساوند لويدونکې
 اودانعکاس شوي امپليټو
 تناسب مساوي دی له:

$$\frac{A_R}{A_0} = \frac{\rho_1 c_1 - \rho_2 c_2}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2}$$

که په يوه سطحه
 دالتراساوند لويدونکې
 شدت په I_0 اوانعکاس شوی
 شدت په I_R وښيو، نو د
 التراساوند شدت قدرت
 تناسب مساوي دی له:

۱۳- شکل: د التراساوند خپې ددوه ډوله نسجونوڅخه تیریرې، چې د التراساوند مقاومت (Z) یې توپیرلري اوله دې کبله یوه برخه یې په سرحد ی برخه کې انعکاس کوي.

$$\frac{I_R}{I_0} = \left(\frac{A_R}{A} \right)^2 = \left[\frac{\rho_1 c_1 - \rho_2 c_2}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2} \right]^2$$

دکثافت ρ اود التراساوند سرعت c حاصل ضرب ته د التراساوند مقاومت (Z) یا امپیدانس (Impedance) ویل کیږی

$$Z_1 = \rho_1 \times c_1 ; Z_2 = \rho_2 \times c_2$$

په ۲- جدول کې د بدن ځینونسجونولکه هوا (Air)، وازده (Fat)، هډوکو (Bone)، اوبو (Water)، ماغزو (Brain)، اوشلې غوښې لکه ینه (Liver) صوتي مقاومت په واحد کیلوگرام تقسیم په سانتي متر مربع اوټانیه ($\text{Kg/cm}^2 \cdot \text{s}$) ښودل شوی دی.

کله چې دالتراساوند خپې بدن ته ننوځي، نو دیوه عمومي قانون په ډول ویلای شو، چې په هریوه سانتي مترژورونسجونواود هریوه میگا هرڅ فریکونسي په زیاتوالي سره دالتراساوند انرژي د یو دیسیبل ($\text{Decible} = 1 \text{ dB}$) په کچه کمښت مومي.

❖ **بیلگه:** دالتراساوند خپې لومړی دپستو نسجونو (Soft tissues) نه تیریرې چې د التراساوند مقاومت اويا په بل عبارت امپیدانس یې مساوي دی له: $Z_1 = 158 \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{s}$ په پاتې لاره کې د هډوکوسره لگیږي چې د التراساوند مقاومت یې د ۲- جدول له مخې $Z_2 = 722 \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{s}$ قیمت لري. دالتراساوند انعکاس شوي قدرت I_R برخه مالومه کړی؟

❖ **حل:** دالتراساوند انعکاس شوي قدرت دلاندې فرمول څخه ترلاسه کوو.

$$\frac{I_R}{I_0} = \left(\frac{Z_{\text{muscle}} - Z_{\text{air}}}{Z_{\text{muscle}} + Z_1} \right)^2 = \left(\frac{158 - 722}{722 + 158} \right)^2 = 41\%$$

✧ **ځواب:** د پستونسجونو څخه په هډکوباندې درالويدونکي التراساوند I_0 يوڅلويښت په سلوکې 41% بيرته انعکاس کوي.

✧ **بيلگه:** د التراساوند څپې په بدن کې لومړی د عضلاتونه تيریږي چې مقاومت يې $Z_{\text{muscle}} = 158 \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{s}$ ټاکل شوی اوبيا وروسته د بدن په منځ کې په هوا لگيږي چې مقاومت يې $Z_{\text{air}} = 0,04 \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{s}$ قيمت لري.

✧ **حل:**

$$\frac{I_R}{I_0} = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} \right)^2 = \left(\frac{158 - 0,04}{158 + 0,04} \right)^2 \approx 1,0$$

✧ **ځواب:** څرنګه چې د هوا لپاره د التراساوند مقاومت د عضلاتوپه پرتله ډير کوچنی قيمت لري نو له دې کبله يې په پام کې نه نيسو. دا په دې مانا چې د التراساوند لويدونکې وړانګې د انعکاس شوو وړانګوسره يوشان اومساوي ديوسره ده. پايله يې داده چې په هوا کې بشپړ انعکاس منځ ته راځي. په بل عبارت سره هوا د التراساوند وړانګولپاره لکه يوه هنداره مثال لري چې ټولې وړانګې بيرته انعکاس کوي او هيڅ برخه وړانګې نه تيریږي. همدا لامل دی چې د هوا تر شا پراته نسجونه او غړي په التراساوند عکس کې نه مالوميږي. د بېلګې په ډول د بدن هغه غړي چې د هوا نه ډک وي لکه سږي، خيټه اونور هم نه شو ليدلای.

د التراساوند انعکاس، انکسار او شيندنه (Reflection, Refraction and Scattering)


کله چې د التراساوند څپې تريوې ټاکلې زاويې لاندې د يوه جسم يانې يوشي په سطحه ولگيږي، نو د انکسار، انعکاس اود التراساوند څپود شيندنې فزيکي کړنلاره منځ ته راځي. د ۱۴- شکل سره سم لاندني پارامتر په پام کې نيسو:

- ✑ د التراساوند څپولويدنکې زويه α_1 د انکسار زاويې α_3 سره يوشان ده
- ✑ د انکسار زاويه په α_2 بنسټ، نولوچي: $\sin \alpha_2 = \sin \alpha_1 \times c_2/c_1$
- ✑ د عمودي لويدونکو څپو لپاره د انکسار ضريب r په لاندې ډول ترلاسه کيږي:

$$r = \frac{p_r}{p_e} = \frac{(Z_1 - Z_2)}{(Z_1 + Z_2)}$$

په پورتنی معادله کې P_e او P_r په خپل وار سره د لويدونکو څپو صوتي فشار اود انعکاس شوو څپو صوتي فشار مانا لري. که د ټوپير لرونکو نسجونو په پوله کې همواره سطحه شتون ولري، اورالويدونکې څپې په عمودي توگه ورباندې ولگيږي، نوانعکاس شوې څپې د الٲراساوند کوپړۍ transducer ته بيرته ورگرځي او هلته اندازه کيدای شي. که د نسجونو سرحدې برخه همواره نه وي، نو د شيندل شوو څپو يوازې يوه برخه تر ټاکلې زاويې لاندې د الٲراساوند کوپړۍ ته رسيدلای شي.

☑ د الٲراساوند انعکاس، انکسار او شيندنه د الٲراساوند عکس ترلاسه کولوپه موخه، يوه بنسټيزه فزيکي کړنلاره تشکيلوي، چې په پايله کې د يوه غړې اناتومي او مورفولوژي بدلون پيژندلای شو



۱۴- شکل: د ټوپير لرونکو موادو په سرحدې برخه کې، په يوه همواره او يوه نه همواره سطحه کې د الٲراساوند انعکاس، انکسار او شيندنه (پراگندگي) ښودل شوې ده (Siemens).

په نسجونو کې د الٲراساوند جذب کيد لوقانون (Absorption Law)

د الٲراساوند د جذب کيد لوقانون په ډاگه کوي چې د الٲراساوند څپې د نسجونو څخه د تيريدلو په ترڅ کې يوفزيکي غبرگون ترسره کوي او په پايله کې د الٲراساوند ميخانيکي انرژي په حرارتي انرژي اوږي. کله چې د الٲراساوند څپې بدن ته ننوځي، نو هلته د نسجونو سره فزيکي غبرگون

کوي. د بېلکې په ډول لکه انکسار، انعکاس، شيندنه او په نسجونو کې جذب کيدل اونور. په پايله کې د التراساؤنډ خپوانرژي د لاندني فرمول په بنسټ کمښت مومي:
په يوه ماده او يا په نسجونو کې د التراساؤنډ د جذب کيدلو قانون په لاندې ډول ليکلای شو:

$$P(x) = p_0 \times e^{-\alpha \cdot f \cdot x} \quad (\text{Exponential Function})$$

- ✓ $P(x)$ = د بدن په x ژوره برخه کې د التراساؤنډ فشار اندازه
- ✓ P_0 = د بدن په سطحه کې د التراساؤنډ فشار
- ✓ α = د جذب ثابت
- ✓ F = فریکونسي (رپیدل يا اهتزاز). کله چې په يوه ثانيه کې يواهنزاتر سره شي،
نوده رخ په نامه يادېږي. د فریکونسي واحد هرڅ دی اومساوي دی له: (Herz = s⁻¹ = 1Hz)

د التراساؤنډ د جذب کولومعادله د يوې اکسپونينشل تابع (Exponential Function) بڼه لري، اود ژوروالي، فریکونسي اود جذب ثابتې په اړوند د التراساؤنډ جذب کيدنه په همغه کچه زیاتيږي:

- ☞ خومره چې د جذب ثابت غټه وي
- ☞ خومره چې د التراساؤنډ فریکونسي لوړوي
- ☞ خومره چې د التراساؤنډ خپې په نسجونو کې ژورې ننوځي

د التراساؤنډ جذب کيدل (Absorption) د نسجونو د ژوروالي
(Depth = 2x) اود التراساؤنډ خپو فریکونسي سره معکوساً متناسب
ده. که په نسجونو کې ژوروالي په سانتي متر اود فریکونسي واحد په
ميگا هرڅ (MHz) سره وښيو، نو د التراساؤنډ جذب کيدلو لپاره
يو منځنی قیمت د لاندې فرمول څخه ترلاسه کوو:

$$\text{Absorption} \approx \frac{0,6}{\text{cm} \cdot \text{MHz}} \text{ dB}$$

د پام وړ:


د التراساوند انكسار او انعكاس كړنلاره په هغو نسجونو كې منځ ته راځي چې جوړښت يې د التراساوند خپواوږدوالي λ څخه ډير غټ وي. ($\text{Structure} \gg \lambda$)

د التراساوند جذب كيدل اوشيندل، په هغو نسجونو كې منځ ته راځي چې جوړښت يې د التراساوند خپواوږدوالي λ څخه كوچنی وي. ($\text{Structure} < \lambda$). نوموړې فزيكي كړنلاره د نسجونو په ارتجاعي خواصو، كثافت او د التراساوند په فريكونسي پورې هم اړه لري. كله چې د التراساوند خپې په نسجونو كې جذب شي نو هلته تودوخي منځ ته راځي. په نسجونو كې د التراساوند جذب كيدل د التراساوند په فريكونسي، د نسجونو په ژوروالي، او د نسجونو په ډول پورې اړه لري.

څرنگه چې د التراساوند خپې د نسجونو د ژورتيا سره سم كمزورې كيږي، نو د دې اړتيا ليدل كيږي، چې د تخنيكي كړنلارو په مرسته سره انعكاس شوي زيگنالونه بيرته غټ شي، ترڅو د مونيتور په مخ د ليدلو وړ وگرځي. نوموړې كړنلارې ته د ژورتيا زورور كولو جبران ($\text{Depth Gain Compensation}$) ويل كيږي.

شيندل: (scattering)


كله چې د التراساوند خپې په بدن كې د داسو نسجونو سره غبرگون وکړي، چې صوتي هموارې سطحې وه نه لري او يا په دومره كچه غټې وي، چې د التراساوند خپواوږدوالي سره برابرې وي، نو په دغو نسجونو كې د التراساوند خپې هرې خوا ته شيندل كيږي.



۱۴ الف شکل : په یوه جسم باندې دالتراساوند څپې عموداً لگېږي اود غبرگون څخه وروسته هرې خواته شیندل کیږي.

دامپلیتود کموزرتیا: (Amplitude attenuation)

کله چې دالتراساوند څپې بدن ته ننوځي، نو په خپله لاره کې دنسجونو مالیکولونه سره هراړخیز فزیکي غبرگون کوي، او په پایله کې د التراساوند لویدونکې لومړنۍ څپې لمن یا دامنه ($Amplitude = A_0$) د ژوروالي وا تن (d) اود جذب ضریب الفا α په اړوند لکه یوه اکسپونینشل تابع کمښت مومي. هرڅومره چې د التراساوند کوپړی transducer فزیکونسي لږوي په همغه کچه د التراساوند څپې په بدن کې ژورې ننوځي.




۱۴ ب شکل : په عمودي محور کې دالتراساوند څپې امپلیتود A_0 او په افقي محور کې دیوه جسم پنډولی کښل شوی دي. دالتراساوند فزیکونس درې نیم 3,5 MHz پینځه میگاهرخ 5 MHz او اوه نیم میگاهرخ 7,5 MHz قیمت لري. دامپلیتود کمښت دجسم ژورتیا d په تابع سره کښل شوی دی. هغه غړي چې د بدن پوستکي ته نږدې موقعیت ولري دلور فزیکونس په مرسته خورانبه پیژندل کیږي.

انعكاس: (Reflection)


كله چې په بدن کې دالٲراساوند څپې د صوتي مقاومت ($Z_1; Z_2$) په تړاو د توپير لرونکونسجونيڅخه تيریږي، نويوه برخه يې بيرته د الٲراساوند کوپړی خواته سم سيخ انعكاس کوي (Reflected pulse) او بله برخه يې مخامخ تيریږي (Transmitted pulse). که چيرته دالٲراساوند څپې په لاره کې لومړی د پستونسجونو (Soft tissues) او بيا د هواڅخه (Air) څخه تيریږي، نولويدونکې څپې په بشپړه توگه انعكاس کوي (Total reflection). همدا لامل دی چې په بدن کې دهواصوتي عكس ټک توربنکاري، داځکه چې دهواصوتي مقاومت دپستونسجونو صوتي مقاومت سره ډيرتوپيرلري او په هغه ځای کې چې هوا وي، نوهلته د الٲراساوند څپې گرد سره نه رسيږي.

Ultrasound REFLECTION

Occurs with Large Differences
in IMPEDANCE between Two Tissues



په پورتنی گراف کې دالٲراساوند څپې دیوې سرچینې څخه راوځي او په توپيرلرونکومادوباندې لگيږي چې دهغوی مقاومت يعنې امپدانس impedance دیوه بل څخه توپيرلري . د بېلگې په توگه لکه نرم نسجونه ، هوا او هډوکي .



۱۴ ت شکل : دالتراساوند خپې دیوه جسم په سطحه باندې عموداً لگېږي . یوه برخه التراساوند Z_1 بیرته انعکاس کوي او بله برخه یې Z_2 سم سیخ په جسم کې ننوځي .

دانعکاس ضریب مساوي دی له :

$$IRC = \frac{\text{reflected int ensity}(W / cm^2)}{\text{incident int ensity}(W / cm^2)} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$$


جذب : (Absorption)

کله چې دالتراساوند خپې بدن ته ننوځي، نویوه برخه یې په نسجونو کې جذب کیږي او په تودوځي اوږي. دالتراساوند خپې په پستونسجونو کې لکه ینه او پښتورگي کې د فريکونسي په اړوند سم سیخ او په هډوکو کې د فريکونسي په مربع سره جذب کیږي.

په ۱۴-شکل کې د التراساوند خپو دکمزورتیا اوجذب کړنلاره د دری نیم میگاخرخ، پینځه میگا خرخ او اوه نیم میگاخرخ فريکونسي لپاره پرلیکه شوی ده. همدالامل دی چې دهډوکو ترلاندی برخه نسجون پیژندنه دالتراساوند په عکس کې کیدای نه شي او تکه توره مالومیږي، داځکه چې هلته د التراساوند خپې نه رسیږي.

Ultrasound REFLECTION

Occurs with Large Differences in IMPEDANCE between Two Tissues



Ultrasound Physics – Reflection





Ultrasound Reflection with "Bright"

Pleural Line and A-lines

په پورتنی گراف کې دالتراساوند څپې په Pleura باندې لگېږي او دانعکاس په نتیجه کې سپین رنګ ځانته غوره کوي


Ultrasound Refraction

Occurs with Slight Differences in IMPEDANCE between Two Tissues



Refraction causes Edge Artifact in Carotid Artery

په پورتنی گراف کې دالتراساوند څپې په carotoid artery باندې لگېږي او دانعکاس په نتیجه کې د څنډې ارتیفاکت Edge artifact منځ ته راځي. دا ځکه چې د شریان اودشاوخوانسجونوترمنځ دتوپیرلرونکی مقاومت امپیدانس شتون لري




Ultrasound Physics – Attenuation and Absorption



Attenuation causing Gallstone Shadowing Artifact

په پورتنی گراف کې ښوول شوی ده چې دالتهراساوند څپې دصفرپه کڅوړه کې په ډبره gallstone باندې لگېږي اوشاخوا ته سیوره منځ ته راځي . نوموړې کرڼلارې ته دسیوري ارتیفاکت په نوم یادېږي .




په پورتنی شکل کې دالتهراساوند سرچینې څخه څپې راوځي اوپه یوه ماده باندې لگېږي . دمدادې سره لاندې غبرگونونه منځ ته راځي. جذب ،انعکاس ، انکسار، شیندنه ،دیورگینڅ اوداسې نور درواخله .

انكسار Refraction

كله چې دالتراساوندو څپې په لاره کې ددوه ډوله نسجونو سره ولگيږي چې دهغوی فزيکي اوبیالوژیکي جوړښت لکه کثافت، مقاومت او نور د یوه بل سره توپیر ولري نو د سرحد په برخه کې خپل سمت ته تغیر ورکوي .

په التراساوندو کې د "Anechoic" اصطلاح پدې معنی ده چې داړونده نسجونو په داخل کې هیڅ داخلي صوت نه خپریږي او په بشپړ ډول تور ه ښه لري.

دلته د هغو جوړښتونو لیست دی چې په التراساوندو کې "Anechoic" یا تور ښکاري: لکه وینه، مثاني کڅوړه، ترانسډیټیو gallbladder، cysts، ascites، pleural effusions.



Anechoic Bladder

دالتراساوندو په عکس کې مثانه توره ښکاري . نوموړې غبرگون ته anechoic ویل کیږي

Hyperechoic (روښانه / سپین)

په التراساوندو کې د "Hyperechoic" اصطلاح پدې معنی ده چې یو ځانګړی جوړښت د شاوخوا جوړښتونو په پرتله ډیر انعکاس ورکوي gives off MORE echoes چې پایله یې روښانه / سپین ښکاري. لاندې د pleural

کرنبي يوه بيلگه ده چې د شاوخوا نرم نسج په پرتله "Hyperechoic" (روښانه/سپينه) ده.




Hyperechoic (Bright/White) Pleural Line

په پورتنی شکل کې دالتراساوندخپې په pleural Line باندې لگېږي اودانعکاس څخه وروسته سپين رنگ ځانته غوره کوي

HYPOechoic (تور / خپ)

په التراساوند کې د "Hypoechoic" اصطلاح پدې معنی ده چې یو ځانګړی جوړښت د شاوخوا جوړښتونو په پرتله لږ انعکاس ورکوي gives off fewer echoes چې په پایله کې تور یا ډیر خړ ښکاري. په لاندې انځور کې دناروغ د ښي پښتورګي په پرتله د هایپوکویک (تور) ځګر سره هیپاتیت لري:



Hypoechoic Liver with Acute Hepatitis resulting in Darker/Grey Appearance

په پورټني الٲراساوند تصويرکې څرگنديږي چې دسږي نسجونه دښي پښتورگې په پرتله دالٲراساوند څپوته لږانعکاس ورکوي اوپه پايله کې تورښکاري يعني hypoechoic

ISOechoic (ورته)

په الٲراساوند کې د "Isoechoic" اصطلاح پدې معنې ده چې يو ځانگړی جوړښت د الٲراساوند سکرين پرده screen کې د بل جوړښت سره دصوت ورته انعکاس similar echoes ورکوي. د مثال په توگه، تاسو کولی شئ ووايئ چې دالٲراساوند په عکس کې د Left kidney cortex دطحال په څير د Spleen Parenchyma يوشان يعني ورسره مشابه انعکاس isoechoic لري.



Spleen is Isoechoic compared to Cortex of Left Kidney Cortex

په پورتنی شکل کې د یوشان ته انعکاس کړنلاره ښوول شوې ده . د بېلګې په توګه د التراساوند په عکس کې د Left kidney cortex دطحال په څیر د Spleen Parenchyma یوشان یعنې ورسره مشابه انعکاس isoechoic لري

فريکونسي او په نسجونو کې د التراساوند نوتنی کچه (Frequency and Penetration Depth)


د التراساوند فريکونسي په نسجونو کې د التراساوند نوتلوپه ژورتيا باندې سم سيخ اغيزه لري. دنوتنې ژورتيا هغه واټن ته ويل کيږي، چې د التراساوند کوپړۍ څخه پيل کيږي او په بدن کې ترټولو ژور غړې پورې رسيږي، چې د التراساوند عکس يې بې له نیمګړتيا او بشپړدمونیتورپه پرده د لیدلو وړ وي. په نسجونو کې د التراساوند دنوتلو ژوروالی نه یوازې په فريکونسي پورې اړه لري، بلکه دنسجونو په ډول پورې هم اړه لري.

د التراساوند دنوتلو ژوروالی د فريکونسي په تابع سره برعکس متناسب دی

هغه غړې اونسجونه چې د بدن سطحې ته نږدې پراته دي، د التراساوند کوپړۍ (ټرانسدیوسر) په لوړ فريکونسي ښه لیدل او پیژندل کيږي او هغه چې په بدن کې ژور پراته وي، په ټیټ فريکونسي التراساوند کوپړۍ ښه لیدل او پیژندل کيږي.

ځايزحل (Spatial Resolution)

ځايزحل ترټولو هغه کوچنۍ واټن دی چې د دوو شيانو اويا د دوو ټکو ترمنځ د توپير او تشخيص وړ وي. موږ د دوه ډوله ځايزحل ترمنځ توپير کوو. لومړی محوري ځايزحل (*Axial Resolution*) چې د التراساوند د خپريدلو په سمت کې پروت دی او دويم هغه ځايزحل دی، چې د التراساوند د خپريدلو په ساره برخه کې پروت دی او افقي حل (*lateral resolution*) ورته ويل کيږي.



۱۵- شکل : بني اړخ ته افقي ځايزحل اوکينې اړخ ته محوري ځايز حل بنودل شوی دی (Siemens).

✍ه ځایزحل دفریکونسي تابع ده اوهرڅومره چې فریکونسي زیاتیري په همغه کچه ځایزحل کمیږي دا په دې مانا چې لوړفریکونسي دنسجونو صوتي عکس بڼه سموي. د ځایزحل واحد ملي متر دی. دبیلگه په ډول د ددری نیم میگا هرڅ لپاره ځایزحل لږڅه نیم ملی متر قیمت لري.
(3,5 MHz = 0,44 mm)

✍ه افقي حل دیوې خوا د فریکونسي تابع ده اودبلې خوا په دې پورې اړه لري چې څومره شمیرکوچني کریستالونه (Array elements) د التراساوند په پروب probe کې ځای پر ځای شوي دي. برسیره په دې افقي حل په دې پورې هم اړه لري، چې د التراساوند څپودفوکس کولوکړنلاره په میخانیکي ډول اوکه په الکترونیکي ډول ترسره کیږي.

✍ه په ۱۵- شکل کې محوري وافقي دواړه ځایزحلونه اوهمدارنگه د التراساوند پروب probe دگن شمیرکوچنیوکریستالونوسره بنودل شوی دی.


دالتراساوند سرچینې نږدې اولیرې ساحې (Ultrasonic nearfield and farfield)

کله چې د التراساوند سرچینې څخه څپې راووځي نوپه لاره کې د التراساوند یوه ټاکلې ساحه جوړوي. په 16 شکل کې د التراساوند کوپړی (Transducer) په لاندې ژوره برخه کې دالتراساوند نږدې اولیرې ساحې اوهمدارنگه دفوکس کولودری ډوله سیمې بنودل شوې دي.

لومړۍ: پخپله د التراساوند کوپړی یانې ترانسديوسر(اړوونکۍ): دغه برخه د التراساوند سرچینه تشکیلوي اودلږڅه دوه سوؤکوچنیویخوېریشنايزتوتوڅخه جوړه ده.

دویم: دالتراساوند نږدې ساحه:

په نوموړې ساحه کې د التراساوند فشارزیگنال په ساره اړخیزپرې شوي برخه کې دالکترونیکي اومیخانیکي کړنلاروپه مرسته سره اولتراساوند درې ځایه فوکس شوی دی.



۱۶- شکل: په عمودي محور کې دالتراساوند نږدې ساحه (Nearfield)، د فوکس سیمه (Focal range) اولیرې ساحه (Farfield) ښودل شوېده. په نوموړو ساحو کې په افقي محور کې د التراساوند زیگنال منحنی بڼه پر لیکه شوې ده (Siemens).

دالتراساوند کوپړی Probe ډولونه

دالتراساوند کوپړی transducer په نوم یادېږي. ترانسډوسر transducer یوه الکترونيکي آله ده، چې د پروب probe په نوم هم یادېږي اود ناروغ معاینه کولوپه ترڅ کې په لاس کې نیول کېږي. دالتراساوند کوپړی transducer داسې ځانگړتیاوې لري چې یوخوا د التراساوند خپې تولیدوي اوبلخوا هغه انعکاس شوې خپې ځان ته رانیسي چې د بدن غړوسره دغبرگون په نتیجه کې بیرته انعکاس کوي. دواړه د غږ خپې تولیدوي او د غږونو ترلاسه کولو لپاره کارول کېږي. لیږدونکی عموماً د جنراتور په توگه د 10% وخت په اړه کار کوي او د رسیدونکي په توگه نور 90%. په ترانسډیوسر کې یو عنصر شامل

دی، د لیږدونکي او رسیدونکي سره د الکترو د ارتباط، د ملاتړ مواد، یو مطابقت لرونکی پټ، او یو محافظتي مخ شامل دی. نن ورځ د التراساوند پروب ډیر ډولونه شته چې ځینې یې په لاندې شکلونو کې بنودل شوي دي. د کارولو په موخه دهغوی ټاکل په دې پورې اړه لري، چې د بدن په کومه برخه کې او کوم یو غړی تر پلټنې لاندې نیول کیږي. د بیلګه په ډول یو غړی لکه زړه چې په بدن کې ژور پروت دی، دیوه منحنی شکله پروب (Sector scanner) په مرسته چې فریکونسي یې ډیر لوړ نه وي (2 MHz) تر پلټنې لاندې نیسو. د تیت فریکونسي پروب ګټه په دې کې ده چې په بدن کې ژورنځي، خونیمګرتیا یې داده، چې ځایزحل یې لږ دی. که چیرته وغواړو چې د بدن پوستکي ته نږدې غږو او یا نسجونو اناتومي او مورفولوژي ښه وپلټو، نو بیا د التراساوند یوه داسې پروب ته اړتیا شته، چې لوړ فریکونسي ولري لکه (20-40 MHz). دا ځکه چې د لوړ فریکونسي التراساوند پروب ځایزحل زیات دی، خو څپې یې په بدن کې دومره ژورې ننوتلای نه شي.


فریکونسي	ژوروالی	د تشخیص کوونکي غړی نوم	په بدن کې دالتراساوند دژورنوتلوواتن او فریکونسي ترمنځ اړیکې																																				
Frequency and Penetration <table><thead><tr><th>Frequency</th><th>Penetration</th><th>Applications</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.5MHz</td><td>25cm</td><td>Heart, Brain (TCS)</td></tr><tr><td>3.5MHz</td><td>18cm</td><td>Liver, Spleen</td></tr><tr><td>5.0MHz</td><td>13cm</td><td>Kidney, Pancreas</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Muscle, Skeleton</td></tr><tr><td>7.5MHz</td><td>8cm</td><td>Thyroids, Vessels</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Endo-sonography</td></tr><tr><td>10MHz</td><td>5cm</td><td>Eye, Breast</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Testis, Finger</td></tr><tr><td>15MHz</td><td>3cm</td><td>Subcutaneous structures</td></tr><tr><td>>20MHz</td><td><2cm</td><td>Intravascular US</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Skin</td></tr></tbody></table> Com Fort 99				Frequency	Penetration	Applications	2.5MHz	25cm	Heart, Brain (TCS)	3.5MHz	18cm	Liver, Spleen	5.0MHz	13cm	Kidney, Pancreas			Muscle, Skeleton	7.5MHz	8cm	Thyroids, Vessels			Endo-sonography	10MHz	5cm	Eye, Breast			Testis, Finger	15MHz	3cm	Subcutaneous structures	>20MHz	<2cm	Intravascular US			Skin
Frequency	Penetration	Applications																																					
2.5MHz	25cm	Heart, Brain (TCS)																																					
3.5MHz	18cm	Liver, Spleen																																					
5.0MHz	13cm	Kidney, Pancreas																																					
		Muscle, Skeleton																																					
7.5MHz	8cm	Thyroids, Vessels																																					
		Endo-sonography																																					
10MHz	5cm	Eye, Breast																																					
		Testis, Finger																																					
15MHz	3cm	Subcutaneous structures																																					
>20MHz	<2cm	Intravascular US																																					
		Skin																																					
زړه او ماغزو: دوه نیم میگا هرڅ																																							
ینه او توری: دری نیم میگا هرڅ																																							
پوښتورگی او تریخی: پینځه میگا هرڅ																																							
تایراید: اوه نیم میگا هرڅ																																							
سترگی اوسینه: اوه نیم میگا هرڅ																																							
د پوستکي لاندې نسجونه: پینځه لس میگا هرڅ																																							
پوستکی: د شلونه پورته میگا هرڅ																																							

۱۷- شکل: په کین اړخ کې د التراساوند فریکونسي په واحد میگا هرڅ، په منځ کې د التراساوند دننوتلو ژورتیا په واحد سانتي متر او په ښي اړخ کې د پلټونو کوغرونومونه لیکل شوي دي. د بیلگه په ډول دسترگو، سینې او ګوتو د پلټنولپاره لس میگا هرڅ کوپړی کارول کیږي.

دالتراساوند پروب Probe ډولونه په لاندې ډول دي:


په لیکه برابره شوې کوپړی (Linear array transducer) Probe: ✍

نوموړي سرکوپړی څلورکونجه بڼه لري، او په یوه همواره سطحه، دالتراساوند لږڅه څلور سوه کریستالونه دیوه بل سره موازي څنګ په څنګ نښتي وي. دغه کریستالونه چې په یوه سمه سیخه لیکه پراته دي، دهغوی څخه یوه ډله دیوه څرمه او پرلپسې فعال کیږي. دالتراساوند انعکاس شوو څپو عکس څلورکونجه بڼه لري، دا ځکه چې د بدن برخې په موازي ډول رڼا کیږي. دپروب کریستالونه په ډله ایزه توګه د بریښنا یزمتناوب زیګنال په مرسته او په الکترونیکي ډول تحریک کیږي.



منحني ډوله کوپړی یا پروب (Curved array transducer) :


په نوموړي کوپړی یا پروب کې، دیوې نیم دایرې د څنډې په کچه برخه کې کریستالونه څنګ په څنګ او موازي ځای په ځای شوي دي. دالتراساوند عکس یې دیوه سیکټور (Sector scanner) بڼه لري. ددغه ډول کوپړی یا پروب بڼه والی په دې کې دی، چې لیرې اوپه څنګ کې پراته نسجونه هم پیژندلای شي. داځکه چې وړانګې یې دیوه بل څخه لیرې کیږي (متباعد Divergence) اوله دې کبله دالتراساوند وړانګولپاره یوه غټ کړکی لري.



خرخیدونکي کوپړی یا پروب (Mechanical sector scanner) :


دالتراساوند کوپړی یا پروب درې کریستالونه لري، چې په یو سلوشل درجه زاویه دیوه بل څخه لیرې په یوه دایره پراته. هریو کریستال په خپل وار سره د التراساوند څپې استوي او هم انعکاس شوې څپې بیرته رانیسي. دغه درې واړه کریستالونه په یوه ګرده دتخته کې داسې راڅرخي، چې په خپل وار سره یو صوتي زیګنال په یوه کوچنۍ صوتي کړکۍ کې خپروي. ددغه ډول کوپړی یا پروب بڼه والی په دې کې دی، چې لیرې او هم نږدې غړي لکه دمثانې کڅوړه په بشپړه توګه



پيژندلای شي. نوموړی کوپړی یا پروب کولای شی، چې په یوه ثانيه کې د دیرشو څخه هم زیات الترسوند عکسونوواخلي.



رپیدونکې کوپړی یا پروب (wobble scanner):

نوموړی کوپړی یا پروب دیوه کریستال څخه جوړه ده، چې په خپل محورد دیرشو^{30°}، شپیتو^{60°} اونوی^{90°} درجوزاو یو په کچه اهتزاز کولای شي. دالتراساوند عکس یو سیکتور ښه لري اونن ورځ پراخ گټور استعمال لري.





دويمه برخه

د ريم څپرکی

اولتراسونوگرافي (Ultrasonography)

التراساوند يا سونوگرافي (Sonography) د ناروغيو پيژندنو په موخه، د عکس اخيستلو يوه وتلې فزيکي کړنلاره ده، چې د ماورای التراساوند څپو (Ultrasound waves) په مرسته، د بدن غړو مورفولوژي بدلون څرگندوي. ماورای التراساوند څپې هغه اهتزازونه دي چې فريکونسي يې د انسان د اوریدلو قوې څخه لوړوي. د نوموړو څپو فريکونسي د شل کیلو هرڅ څخه تر سل مېگا هرڅ پورې رسيږي (20 kHz-100MHz)، او له دې کبله په غوږونه اوریدل کېږي.

التراساوند په کړنلاره کې د یوه یا ډیرو کریستالونو (Cristal) څخه د التراساوند څپې خپريږي او د ناروغ بدن ته ورننوځي. نوموړې څپې په لاره کې د کثافت په تړاو توپیر لرونکو نسجونو سره غبرگون کوي، چې په پایله کې د التراساوند څپو یوه برخه انعکاس کوي، یوه برخه په نسجونو کې جذب کېږي او پاتې برخه یې د نسجونو څخه تیريږي. د التراساوند انعکاس د نسجونو په هغه برخه کې ترسره کېږي چې دوه توپیر لرونکي نسجونه یو په بل نښتي وي او شریکه پوله ولري. په دغه فزيکي کړنلاره کې د التراساوند څپې د کثافت په تړاو توپیر لرونکو نسجونو په سرحدي برخه کې په توپیر سره انعکاس کوي. د التراساوند څپو هغه برخه چې د نسجونو د کثافت (Density) او ژوروالي (Depth) سره سم په توپیر سره انعکاس کېږي، بیرته د کریستال سرچینې وخوا ته راغځي او دغه کمزوری او دوخت په تړاو وروستی زیگنال په کریستال کې اندازه کېږي. دا په دې مانا چې پخپله کریستال د یوې خوا د التراساوند سرچینې او د بلې خوا د التراساوند انعکاس شوي برخې رانیوونکي په ډول کارورکوي. په ۱۸- شکل کې ښودل شوي ده چې د التراساوند څپې د یوې سرچینې څخه خپريږي او د یوې مادې ته لکه د انسان بدن ورننوځي. په دې ترڅ کې د التراساوند څپې د مادې مالیکولونه داسې په ریډو (اهتزاز) راولي چې ځایز کثافت یې په میخانیکي ډول لږ او ډیريږي. هغه څپې چې په دې کړنلاره کې

انعكاس ڪيڙي ديوه رانيوونڪي په مرسته اندازہ ڪيڙي. دانعكاس شووزيگنالونه خخه دهمغه خای اناٽومي اومورفولوژي جوښت ديوه عكس په بڼه ترلاسه ڪيڙي. دبلې خوا په نسجونو کې د التراساؤنڊ سرعت يوشان نه دی. داځکه چې په هريوه نسج کې د التراساؤنڊ دهدايت قابليت ځانگړی قيمت لري

دماورای التراساؤنڊ خپو اندازہ کوونکې آله د يو منځني سرعت خخه ، چې قيمت يې يوزروپينځه سوه څلوېښت ($Velocity = 1540 \text{ m/s}$) دی ، کاراخلي. په نسجونو کې د التراساؤنڊ سرعت اود التراساؤنڊ سرچينې ته د زيگنالونو د تگ او راتگ وخت پيژندل ځکه مهم دي ، چې دتيرشوي وخت په مرسته کمپيوتر ديوه غړي ژوروالي محاسبه کوي. دبيلگي په ډول کله چې د التراساؤنڊ سرچينې خخه يوزيگنال(Signal) بدن ته واستول شي اوبيا بيرته انعكاس وکړي ، نودزيگنال دتگ اوراتگ وخت خخه دژوروالي واټن مالوملای شي.

په ۱۸- شکل کې دنسجونودوه ډوله بلاکونه (Tissue blocks) بنودل بنوي دي چې هريو بلاک يې د دريوتوپيرلرونکو پټونه (Tissue layer) خخه جوړشوی دی. دهریوه بلاک پټونه ديو بل سره شريکه پوله لري اوپه (A;B;C) سره بنودل شوي دي. دښي اړخ نسجونوبلاک په سرحدي برخو کې د التراساؤنڊ څپې دکين اړخ نسجونو بلاک په پرتله ډيرانعكاس کوي، داځکه چې هلته ددواړونسجونو کثافت اومقاومت (Impedance) ديوه بل خخه ډيرتوپيرلري. په سرحدی برخه کې دانعكاس شووزيگنالونو شدت اوسمت په ويکتورونو(Vectors) سره بنودل شوی دی. پندوبکتورد امانا لري چې د انعكاس شوی زيگنال برخه ډيره اونری ويکتور يانې لږ ده.

خه پيښيږي، که چيرته د التراساؤنډ څپې دناروغ په خيټه ولگيږي چې هلته هواده اويا په يوه پيښتی ولگيږي چې دهډوکوخخه جوړه ده؟ ددې پوښتنې ځواب دادې چې هلته د التراساؤنډ څپې بشپړ انعكاس کوي(Total reflection). پايله يې داده چې دخيټې اوپيښتی تر لاندې نسجونونه ليد ڪيږي اود التراساؤنډ عكس تګ تورمالوميږي.

د التراساؤنډ په مرسته سره نه شوکولای چې د بدن هغه برخې ووينوچې دهډوکواويادهواتر شا پرتې وي. نوله دې کبله بايد ترخپله وسه هڅه وشي، چې د بدن دننه هواپه يوه چل دلارې خخه ليري او يا کمه شي. دبيلگي په ډول ديوې خوا د التراساؤنډ کوپړی او د بدن پوستکي تر منځ تماس دومره ډيروي چې هلته هواورننه نه وځي او دبلې خوا د التراساؤنډ کوپړی په مرسته په پوستکي پرمخ دفشار راوستلوپه کړنلاره سره د بدن دننه هوا بل خای ته وليږدول شي.

داځکه چې دلاندنيوبرخوخخه انعكاس شوی څپې د التراساؤنډ اندازہ کونکي کوپړی ته نه رسيږي. سرچينې خخه خپرې شوې څپې دښي اړخ نسجونوبلاک منځنې برخه هغه وخت چې يوزيگنال يې د التراساؤنډ سرچينې خخه تريوه سرحدي برخې پورې پلي کوي، په


خپل وارسره په $t_{A/2}$ ، $t_{B/2}$ او $t_{C/2}$ سره شودل شوی دی. څرنگه چې دنسجونو پورتنی پټ (A) د التراساوند سرچینې ته ورنږدې پروت دی ، نو له دې کبله دنوموړي پټ او د (B) پټ په پوله کې د انعکاس شوو زیگنالونو وخت (t_A) دنورولاندنیو پټونو وخت ($t_B; t_C$) په پرتله لنډ دی. په پایله کې د پورتنی پټ انعکاس شوي زیگنالونه دنورو ژورو پټونو په پرتله د التراساوند سرچینې ته زړه رسېږي:

که چیرته د پوستکي څخه ، د نسجونو پورتنی ، منځني اولاندني پنډوالي سرحدې سطحې پورې ژوروالی په خپل وار په d_A ، d_B او d_C سره وېشو، نو د یوه زیگنال د تګ اوراتګ وخت t_A ، t_B او t_C لپاره لیکلای شو چې

$$2 d_A = c \times t_A$$

$$2 d_B = c \times t_B$$

$$2 d_C = c \times t_C$$



په ۱۸- شکل کې دنسجونو دوه ډوله بلاکونه (Tissue blocks) بنودل شوي دي چې هر یو بلاک یې د دریو تویپرلرونکو پټونه (Tissue layer) څخه جوړ شوی دی. د هر یوه بلاک پټونه د یو بل سره شریکه پوله لري او په (A;B;C) سره بنودل شوي دي

د التراساوند سرچينې څخه خپور شوي څپې هرڅومره چې په نسجونو کې ژور ننوځي، په همغه کچه يې د اهتزاز لمن يا امپليټود (Amplitude) شدت د يوې اکسپونينشل تابع (Exponential function) په شکل کميږي.

❖ **دپام وړ:** د التراساوند کړنلارې عکس اواکسريز (X-Rays) د عکس اخيستلو ترمنځ توپير د دې، چې په التراساوند کې د التراساوند څپو څخه کار اخيستل کيږي او انرژي يې دومره لوړه نه ده چې د نسجونو اتومونو څخه الکترونونه راوباسي. نوموړې فزيکي کړنلارې ته ايونايژيشن ويل کيږي. په داسې حال کې چې د اکسريزو وړانګې د ايونايژ کونکو (Ionization) وړانګوپه ډله کې راځي او د اتومونو څخه الکترونونه راوباسي. همداسبب دی چې التراساوند د اکسريز په پرتله د ناروغ لپاره هيڅ زیان نه لري.

❖ **دپام وړ:** د هوايي ماليکول د ايونايژيشن لپاره لږ څه څلورديرش الکترون ولټ (34 eV). او د هايډروجن اتوم څخه د يوه الکترون د رايستلو لپاره لږ څه ديارلس الکترون ولټ (13,6 eV) انرژي په کار ده انرژي:

❖ **دپام وړ:** کله چې يوا هتزاز په يوه ثانيه کې تر سره شي، نو د هرڅ په نامه يا د يږي ($1/s = 1 \text{ Hz}$) د واحدونو په نړوال سيستم کې د فريکونسي واحد يو هرڅ ټاکل شوی دی. رومي کلمه (prefix) لکه کيلومساوي ده له: يوزر ($10^3 = 1000$) او مېگامساوي ده له: يومليون ($10^6 = 1000\ 000$)

❖ **دپام وړ:** ماورای التراساوند څپې د مادې ماليکولونو پريودیک اهتزازونه دي، چې دارتجاعي څپوپه ډول په فضا کې خپريږي.

☑ د التراساوند څپې ميخانيکي څپې دي

☑ د التراساوند څپې په جامد، مايع او غاز ډوله ماده کې د فشار بدلون او يا کثافت بدلون په پايله کې منځ ته راځي

☑ د التراساوند اوريدلو ساحه د $20\ \text{Hz} - 20\ 000\ \text{Hz}$ پورې ده

☑ که د التراساوند فريکونسي د شپاړس هرڅ څخه ټيټ وي ($< 16\ \text{Hz}$) نو ورته د التراساوند لاندنی برخه (Infra sound) او که د شل کيلو هرڅ ($> 20\ 000\ \text{Hz}$) څخه پورته وي د التراساوند پورتنی برخه ويل کيږي.

په درملنه کې د ناروغيو د پيژندلو لپاره د يوميگا هرڅ څخه تر پينځه لس ميگا هرڅ پورې ګټه پورته کيږي.


دماورای التراساوند خپې (Ultra sound waves)	
20 kHz – 100 MHz	Physical range فزيکي ساحه
1 MHz – 15 MHz	Medical diagnostic په درملنه کې دکارولو ساحه

دپام وړ: د التراساوند خپې څرنگه منع ته راځي؟

ځينې داسې کريستالونه اوچيني مواد پيژندل شوي دي، چې پيڅورينېنايز خواص لري. کله چې نوموړي مواد په يوه متناوب ولتيج کې کيښودل شي، نوخپله ميخانيکي بڼه بدلوی اود التراساوند خپې خپروي. دبلې خوا همدغه موادکولای شي چې د التراساوند انعکاس شوې خپې دلږڅه يوې مايکروثانيووروسته بيرته اندازه کړي. داپه دې مانا چې پيڅورينېنايزکريستالونه د التراساوند خپواستوونکي اوه د التراساوند خپورانيوونکي په ډول کارکوي. په فزيک کې نوموړی اغيزی ته دپيڅورينېنايزاغيزه ويل کېږي.

د موقعيت معياري اناتومي شرايط د انسانانو په گډون د څارويو اناتومي په واضح ډول تشریح کولو لپاره کارول کېږي. اصطلاحات، په عمومي ډول د لاتين يا يوناني ريښو څخه اخيستل شوي، يو څه په خپل معياري اناتومي حالت کې بيانوي. دا موقف د هغه څه تعريف وړاندې کوي چې په مخ کې ("مخکې")، شاته ("پوستير") او داسې نور. د اصطلاحاتو تعريف او تشریح کولو برخې په توگه، بدن د اناتومي سطحو او اناتومي محورو په کارولو سره تشریح شوی.

د بدن درې ډوله اناتومي پرې شوې اړخونه ديوې سطحې په توگه ښودل شوي دي		
د بدن په اوردو، دمخ نه شاخواته موازي پرې شوی سطحه (زاگيتال پلېن) (c) Sagittal plane	د بدن په اوږدود مخ سره موازي پرې شوی سطحه (فرونټال پلېن) (b) Frontal plane	د بدن په ساره پرې شوې سطحه (ترانسورز پلېن) (a) Transverse plane




مصنوعي ارتيفاكټونه (Artifacts)

ارتيفاكټونه ټولو هغو هراړخيزو مصنوعي ټکواو يا ليکوته ويل کيږي، چې د التراساوند په عکسونو کې ليدل کيږي او د ناروغيو په تشخيص کې ستونځې رامنځ ته کوي. د بلې خوا د يوه غړي د ژورتيا واټن د ټاکلو په موخه، په کمپيوټري سيستم کې دا فرضيه ورکړ شوی ده، چې ګڼه د التراساوند انعکاس شوې څپې سم سيخ د التراساوند کوپړۍ ته راستنېږي. په داسې حال کې چې نوموړی فرضيه تل رښتوني نه وي. دا ځکه چې د التراساوند کوپړۍ ته نه سم سيخ انعکاس شوې وړانګې هم رسېږي. کله داسې هم پېښېږي، چې ارتيفاکټونه د يوې ناروغۍ پېژندل بيخي ناشوني کړي. که چيرته نوموړي مصنوعي توليد شوې نيمګړتياوي، د اصلي ناروغيو په پرتله، په توپير او په رښتوني توګه وه نه پېژندل شي، نو بيا يله يې داده، چې په التراساوند عکسونو کې د ناروغيو غلط تشخيص وشي. ارتيفاکټونه په لاندې ډول ويشل شوي دي.


تکراري ارتيفاکټ (Reverberation)

په ۱۸ شکل کې تکراري ارتيفاکټ ښودل شوی دی. په نوموړي ډول ارتيفاکټ کې د التراساوند انعکاس شوې څپې په خپله لاره کې د داسو نسجونو ګډې پولې څخه تيريږي، چې د هغوی صوتي مقاومت د يوه بل څخه توپير لري. نوددې په ځای چې د التراساوند څپې د التراساوند کوپړۍ خواته ځان ورسوي، بيرته ژور وپرتونو نسجونو خواته انعکاس کوي. هلته بيا د نورو نسجونو په شريکه


ٲوله باندي مخامخ لگيري اوبيا انعكاس كوي. نوموري كرلاره خوځله تكراريري اوديوي څه مودي وروسته په ځنډسره دغه انعكاس شوې څپې د الٲراساوند كوپري يعني ٲروب ته رارسيري. همداامل دي چې دكمٲيوٲرسيسټم دانعكاس شووڅٲووخت ډيرنيسي اوددي سره سم دهمغه غري موقعيت هم درنٲتوني واټن په ٲرتله ډير محاسبه كوي. د بېلكې په ډول په ١٩- شكل كې يو تكراري ارتيفاكٲ د كيسه مثانه (Urinary bladder) او دٲربي (Gall bladder) لٲاره بنودل شوي دي. نوموري ارتيفاكٲ دگن شمير موازي كرنبو څخه جوړدي چې دڅٲې ٲوستكي ته ورنږدي دالٲاسوند په عكس كې ليدل كيږي. داځكه چې دالٲراساوند څپې دڅٲې مخ اړخ ٲنډٲوستكي او لانديو برخوٲرنځ څو ځله بنكته اوٲورته ځي اوراځي اوپه هرځل كې يې يوه برخه انعكاس كوي



١٨- الف شكل كې دالٲراساوندٲروب څخه څيري شوې صوتي څپې نږدي ساحې اوليري ساحې سرحدونه بنوول شوې دي. دالٲراساوندڅپې ديودول ځانگړي كريستل په مرسته دسرچيني په ډول توليد كيږي چې د **Piezoelectric element** په نوم سره ياديري




۱۹- شکل: د کيشه مټانې په التراساوند عکس کې تکراري ارتيفاکتونه ليدل کېږي چې په اناتومي ډول د بدن هيڅ يوه غړي اويا جوړښت سره تړاونه لري. دنوموړي شکل په کيڼ اړخ کې د التراساوند خپې د داسې نسجونو څخه تيرېږي چې صوتي مقاومت (acoustic impedance) يې د يو بل څخه ډير توپير لري. د بېلکې په ډول کله چې دخيتې هغه برخه چې د غاڅ څخه ډکه وي اود التراساوند خپې د غاڅ اود پيښتو ترمنځ انعکاس کوي اويا د بدن پوستکي اود کيشه مټانې په پوله کې د التراساوند خپې انعکاس کوي، نو په پايله کې تکراري ارتيفاکتونه منځ ته راځي.



۱۹- شکل: تکراري ارتيفاکت

دانعکاس شوي التراساوند زوروركيدل (Echo Enhancement)


د التراساوند کوپړی یعنی ترانسډیوسر څخه که د بدن خواته وگورو، نودغټو - رگونو او دهغو تېنو جوړښتونو، چې په متجانس ډول په مایع ډک وي، ترشاپراته نسجونو کې د التراساوند شدت غټوالی لیدل کېږي. دبیلگه په ډول په ۲۰- شکل کې دمثاني کڅوړې ترشا ژورنسجونه ټول تک سپین مالومېږي او پیژندل یې ډیرگران تمامېږي. په ۲۰- شکل کې دنوموړي ارتيفاکت اغیزه ښودل شوې ده.



۲۰- شکل: د التراساوند شدت زوروركيدلو ارتيفاکت

ديادولووړده چې دصوت ارتيفاکتونه په کلينيکي تړاو کيدی شي گټورې پايلې ولري. دبيلگې په توگه هغه غړي چې دارتيفاکت لاندې موقعيت ولري دهغوی اناتومي جوړښت او مورفولوژي جوړښت په هکله گټور معلومات ترلاسه شي. د راديولوژیست ډاکټرلپاره ډيره اړين ده چې د

التراساوند بنسټيز فزيک باندې خپل ځان پوه کړي ترڅو کولای شي د التراساوند هراړخيز ارتيفاکتونه وپيژني او د ناروغيو په تشخيص کې د غلطيو مخنيوی وشي



۲۰- الف شکل: د التراساوند شدت تقويه کيدلو ارتيفاکت

کله چې د التراساوند څپې، په يوه متجانس مايع کې، تريوه اوږده واټن پورې هم خپرې شي، نو شدت او انرژي يې کمښت نه مومي. داځکه چې په يوه متجانس مايع کې لکه اوبه د التراساوند څپې شاخواته برخه کې سپين رنگ لري (70) او د التراساوند پړوب ته بيرته انعکاس نه کوي او په بشپړه امپليټود سره مخ په وړاندې ځي. په بله وينا د يوې متجانس مايع تر شا برخه کې سپين رنگه بڼه چې هيڅ ډول کليني تشخيص نه لري يو مصنوعي ارتيفاکت تشکيلوي. په پايله کې د گاونډيونسجونو په پرتله د التراساوند ډيره انرژي د مايع په ژوره برخه کې باقي پاتې کېږي. په داسې حال کې چې د مايع په شاوخوا نسجونو کې د التراساوند انرژي د پلې شوې لارې د واحد سره سم کمښت مومي. همدا لامل دی چې د صفره کڅوړې، خوستې (Cyst) او د مثانه کڅوړې تر شا برخو کې د انعکاس شوو څپو شدت او ډيرښت ليدل کېږي. د بلې خوا نوموړی ارتيفاکت د ناروغيو په پيژندلو او د خوستې (Cyst) په توپير کولو کې يو گټور رول هم لوبولای شي. د بېلګې په ډول ټولې هغه خوستې چې نسبتاً غټې وي، تر شا برخه نسجونو کې د انعکاس شوو التراساوند څپو ډيرښت منع ته راځي او له دې کبله سپين رنگ ځان ته غوره کوي. په داسې حال کې چې په کوچنيو خوستو (Cyst) کې، لکه په يڼه کې، نوموړې ارتيفاکت دومره زورور نه ليدل کېږي.


دپام وړ: دپورتنی ارتيفاکت اصلي لامل دادی چې دالتراساوند کارکونکې ډاکټر دهرډول نسجونولپاره دکمښت ضريب، يانې که د التراساوند څپې په ډيره کچه اوکه په لږکچه کمزورې کوي، دژورتيا سره سم ستروونکي کنټرول سيستم (depth-dependent gain control) دالتراساوند په اله کې يوشان ټاکلی دی. پايله يې داده چې بدن په هغوبرخوکې چې هلته دالتراساوند لږجذب کېږي، لکه اوبه، دهغوبرخوپه پرتله چې هلته ډيرجذب کېږي لکه نورمال نسجونه، يوبرابر نه تقويه کړي بلکه په لوړه کچه زورورکيږي. داځکه چې په ټيټه کچه کمزوری کوونکو (Attenuation) اناتومي جوړښتونو کې د ستروونکي قيمت (Amplifier) ډير لوړټاکل شوی دی.

د التراساوند ديستال سيوره (Acoustic distal shadow)

کله چې د التراساوند څپې بدن ته ننوځي اوپه لاره کې دهډوکو، پښتو، دځيټي غاز، ډبرو، ليگامېنټ (Ligaments)، کالسيفيکېشن (Calcification) اونورو کلکوجوړښتونوسره ولگيږي، نو دو مـره زورور انعکاس ترسره کيږي، چې د التراساوند څپو لږڅه ټوله برخه بيرته دالتراساوند کوپړۍ ته راگرځي. پايله يې داده، چې دنوموړونسجونوترشا پراته غړي او سيمه ټک تورمالوميږي. داځکه چې هلته د التراساوند څپې گرد سره نه رسيږي. دغه ډول ارتيفاکت، چې تر شا يې توره تياره سيوره منځ ته راځي، په ليرې واټن کې اچونکې سيورې (distal shadowing) ارتيفاکت په نامه سره ياديږي.

دپام وړ: د التراساوند څپې څه ته وايي؟

د التراساوند څپې ميخانيکي اهتزازونوته ويل کيږي چې دخپريدلوسمت په اوږدو، په يوه ماده کې حرکت کوي. نوموړې څپې نه شي کولای چې بې له يوې مادې څخه مخ په وړاندې ولاړې شي. همدا لامل دی چې دالتراسونوگرافي په کړنلاره کې د عکس اخيستلوپه ترڅ کې په کافي اندازه گيل (Gel) دالتراسوند پروب اود بدن پوستکي ترمنځ شتون ولري.



۲۱- شکل: په 15.1 a شکل کې درې ډبرې دمثاني په کڅوړه کې پرتې دي او له دې کبله يې ترشا تکه توره سیوره دارتيفاکت يوه بيلگه ده.

په 15.2a شکل کې دمثاني کڅوړې په څنګ ديوال کې سیوره ليدل کيږي چې د التراساوند څپو څخه عموداً نه دی لګيدلي بلکه په اوږدولګيدلي دی اوله دې کبله يوبل ډول ارتيفاکت منځ ته راځي.


تانګنسيال يا څنګن ارتيفاکت (Tangential Artifact)


که چيرته ددوه ډوله نسجونو سرحدي برخه يوبيضوي او يا دايروي شکل ولري، نو هلته د التراساوند لويدونکې څپې دهغوی په څنډو کې انکسارکوي اوهم شيندل کيږي. په پايله کې دنوموړو جوړښتونو د څنډو برخو ترشا نسجونو کې توره سیوره منځ ته راځي.

داځکه چې دځنډوبرخوڅخه د التراساوند کوپړی ته څپې نه رسیږي. دغه ډول ارتیفاکت د تانگنسیال یا څنگځن ارتیفاکت په نامه سره یادېږي.

دهندارې ارتیفاکت (Mirroring artifact)

کله چې د التراساوند څپې دیوه ډیرزورورانعکاس کوونکي نسج په سرحدي برخه ولگيږي، د بېلکې په ډول لکه حجاب حاجز، نوکیدای شي چې د التراساوند څپې داسې انکساروکړي، چې دحجاب حاجزپه بل اړخ کې دهندارې یومجازي متناظر ارتیفاکت منځ ته راولي. په نوموړی کړنلاره کې لومړی د التراساوند څپې په حجاب حاجزلگيږي اودڅنگ خواته کږيږي. هلته په یوه بل جوړښت (Structure) باندې لگيږي اوبیرته د حجاب حاجزخواته انعکاس کوي. په پایله کې د حجاب حاجزڅخه وروسته بیرته د التراساوند کوپړی ته انعکاس کوي. څرنګه چې دالتراساوند کمپیوټري سیستم یوازی د وخت دمحاسبې په اساس دیوه غړي ژورتوب ټاکی، اودبلي خوا مني چې دیوه ژورځای څخه سم سیخ دغه زیګنال ورته انعکاس کړی دی، نو له دې کبله دغه جوړښت په ژورځای کې ناسم اود جوړښت په بل اړخ کې ارتسام کوي






۲۲- شکل: د هندارې ارتیفاکت

[With permission :


Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]





۲۳- شکل: دپښتورگي ډبرې، کلسي فيکيشن (Calcification) او دپښتورگي انفارکشن (Infarction) ښوول شوی دی

[With permission :


Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]





[With permission :


Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]



په پورتنی شکل کې د الٹراساوند دینې تصویر بنسټول شوی دی چې د هیباررگونه هم ښکاري

[With permission :



Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]



[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

د التراساوند انعکاس شوې څپې، کوم چې د التراساوند کوپري په مرسته رانيول کيږي (receiver)، ددې اړتيا لري، چې دامنه يي غټه يانې زوروره شي. داځکه چې، هغه انعکاس شوي زېگنالونه، کوم چې د بدن د زور وېرځونه کوپري ته راځي، ډير کمزوري، او هغه چې د بدن سطحې ته نږدې څرخونه کوپري ته رارسيږي، امپليټود يي غټه وي. داپه دې مانا چې دالتراساوند الې په مرسته د بدن ژور وېرځو څخه انعکاس شوي التراساوند زېگنالونه، د بدن سطحې ته نږدې زېگنالونو په پرتله، بايد ډير غټ شي، ترڅو د ناروغيو په اړوند يوسم پيژندونکې عکس منع ته راشي.




[With permission :
Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

دنوموړې موخې لپاره بايد هيرنه كړو، چې دالٲراسونوگرافي په كړنلاره كې دالٲراساوند الې پارامټر: لكه حساسيت (Sensitivity)، سټروالې Amplification، فوكس كول (Focussing)، دانكاس خپوځگ ليميت ټاكل (Reject threshold)، دانالوگ زيگنال په ديگيتال زيگنال اړول، په عكس كې توپير (contrast)، د عكس روښنوالې (Brightness) بدلون او نور داسې اعيار شي، چې هم د ژورونسجونواوهم د برسيرن نسجونوانعكاس شوى خپې په يو برابر غټي شي.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]



په پورټني شكل كې دالٲراساوند الې سمه اوناښمه كارونه دينې عكس اخيستلو لپاره ښودل شوېده. د بېلكې په ډول په كين اړخ عكس كې د ژوروپرتونسجونولپاره، دستروونكي كچه (Amplification) لوړه نه ده ټاكل شوې، اوله دې كبله په ينه كې ژورپراته جوړښتونه ټول تورمالوميرې، او په طبي ټراونه پيژندل كيږي. په ښي اړخ شكل كې دالٲراساوند الې حساسيت، بريښنايز فوكس او دستروونكي كچه د ژوروپرتواناتومي جوړښتونولپاره سمه ټاكل شوې ده، او له دې كبله دينې جوړښتونوپيژندل په صحيح توگه تر سره كيدلاى شي.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

دریمه برخه

خلورم خپرکی

دالتراساوند عملي کرنلاره

Ultrasound practical procedure

دالتراساوند په عملي کرنلاره کې متخصص ډاکټر سونوگرافر sonographer دالتراساوندیوې آلې په مرسته چې ترانسډیوسر Transducer یا پروب Probe نومېږي د ناروغ معاینه ترسره کوي . دنوموړي موخې لپاره دالتراساوندپروب Transducer دناروغ د بدن په اوږدواو یا عرضي سمت کې بنورول کیږي . دالتراساوندپروب Transducer څخه دالتراساوندخپې راوځي او په لاره کې دناروغ دننه غړوسره غبرگون کوي . دالتراساوندانعکاس شوې خپې بیرته دالتراساوندپروب Transducer ته راگرځي . په پایله کې دمعاینه کوونکو غړو عکسونه منځ ته راځي او دیوې تلویزیوني پردې پرمخ د لیدلو وړ دي .

ناروغ باید د بدن هغه ځای څخه جامې لرې کړي چې معاینه کیږي او دیوه میز په مخ به پریوزي . سونوگرافر به دناروغ د بدن پوستکې په هغه ځای باندې چې معاینه کیږي یو ځانگړی ټینګ سرینجن محلول خپور کوي چې د جیل gel په نوم یادېږي . په پوستکې باندې دمعاینه کولو په ترڅ کې د جیل gel اچول خورا اړین دي ، داځکه چې دترانسډیوسر یا پروب څخه خپرې شوې التراساوندخپې پرته له خنداوځنډ او پرته له مقاومت دناروغ بدن دننه خواته خپرېږي . په دې اساس دپوستکې او دالتراساوندپروب Transducer ترمنځ د هوامخنیو کیږي . کله چې دالتراساوندانعکاس شوې خپې پروب ته راورسیږي نو هلته په برقي جریان باندې اړول کیږي . په پایله کې دیوه کمپوټر په مرسته برقي زیگنالونه په التراساوند عکس باندې اړول کیږي .

هغه څپې چې منعكس كېږي د الٲراساوند پړوب Transducer په مرسته سره اندازه كېږي او ورپسې په برقي جريان باندې اړول كېږي . داځكه چې په پړوب كې يو كريستال شتون لري چې د piezoelectric په نوم باندې يادېږي . نوموړي كريستل د پيزو اليكټريك اغيز پراساس كار كوي . منعكس شوې څپې piezoelectric كريستالونه په خوځيدو او اهتزازوالي يعنې وايبريټ vibrate كوي، په پايله كې piezoelectric كريستالونه د الٲراساوند منعكس شوي څپو په واسطه په ميخانيكې ډول په اهتزاز اخي او دوى داسې ځانگړتياوې لري چې برقي جريان توليدوي او بيا د كمپيوټر لخوا پروسس كېږي.

د الٲراساوند عكس كې د ساحو ډولونه

- hyperechoic - د الٲراساوند عكس كې سپينې سيمې (د انعكاس لوړ شدت سره سيمې)
- hypoechoic - د الٲراساوند عكس كې خړې ساحې (د انعكاس ټيټ شدت)
- anechoic - د الٲراساوند عكس كې تورې سيمې (انعكاس نشته)



Abb. 106.2 a




Abb. 106.2 b



Abb. 106.3 a




Abb. 106.3 b

۲۴- شکل: دالٲراساوند دکارولوپه موخه دکوپړی سمت او سم چلن خورامهم دی. په پورټني شکل کې دالٲراساوند کوپړی Transducer په اوږدواوپه ساره سمتونه بنودل شوي دي.

صوتي سيوره (Sound shadow)

دهلوكونسجونه، ډبره او په يوه نسج کې دکلسيمي مالګې رسوب اوهمدارنگه کالسيفيکاسيون (Calcification) صوتي سيوره ترشا پريږدي. له دې کبله دنوموړونسجونولاندې غړي دالٲراسوند په عکس کې نه ليدل کيږي اوبايده دي چې تريوې بلې زاويې لاندې پروپ probe وکارول شي.

غاز (Gas)

په بدن کې غاز دالٲراسوند خپې په بشپړه توګه انعکاس کوی اوترخت پراته نسجونه اوغړی نه ليدل کيږي. په داسې يوه حالت کې هڅه وشي چې ناروغ په کيناسته اویا ولاړه کې ترپلټنې ونيول شي.

سيست (Cyst)

سيست دالٲراساوند خپې نه انعکاس کوي اوله دې کبله ټوله انرژي ترشا نوروجوړېښنوته رسيږي. په پايله کې دسيست خت خواته نسجونه خوراډيرسپين اومنعکس ليدل کيږي. داځکه چې هلته د الٲراساوند انعکاس شوې خپې دشاوخوانسجونوپه پرتله په لوړه کچه تقويه کيږي.

دالٲراساوند عکسونوپه اړخونه کې، ضرورده، چې دبدن جوړېښتونو په هکله لاندني ټکي په پام کې ونيول شي.

لږانعکاس کونکي جوړېښتونه:

❌ د بيلګې په ډولکه: : عادي ينه، سرطانې نسجونه، تومور، ميتاستاز، ميلانوم، محلول

ډيرانعکاس کونکي جوړېښتونه:

❌ د بيلګې په ډول لکه: هډوکي، ډبرې، کالسيفيکيشن، په خيته کې غاز، پيښتی، غوړجنه ينه، تايرايډ، دينې هيم انګيوم Haemangiom

غيرانعكاس كيونكي جورښتونه:



❌ د بيلگې په ډول لکه: میتيازى، د صفراکڅوړه، سيست

Upper Retroperitoneum, Normal Findings

د پورته خواپریتوان طبقې شاته retroperitoneum د التراساوند معاینه کولوموخه نه یوازې دنوموړې اناتومي برخې درگونوارزونه ده بلکې برسیره پردې داخترلاتونوپيژندل هم دي . د بيلگې په توگه لکه aortic aneurysm اويا ترومبوز ورید اجوف تحتانی inferior vena cava هم په پام کې نیول کېږي .

دنوموړې سیمې سونوگرافي یو بل هدف د پریټوان طبقې شاته د رگونو اناتومي جوړښت سره آشنا کیدل دي ځکه چې هغه رگونه چې په مایل ډول یې عکس اخیستل شوی دی په اسانۍ سره د بیضوي ډوله لمفاوي غوټو oval lymph nodes سره ورته غلط تعبیر کیدی شي چې په ورته ډول hypoechoic خواص لري

کله چې تاسو ترانسډیوسر transducer د ناروغ ښي اړخ ته کوډکړئ (انځور 21.2a)، تاسو به د ځیگر (9) شاته د aorta شریان (15)، د سیلیاک تنه celiac trunk (32)، اود mesenteric artery شریان (17، SMA) ومومئ. چې د vertebra مخکینۍ برخه کې موقعیت لري.

د پورتنۍ پریټوان طبقې شاته retroperitoneum د لیدلو وړ غړي اورگونه (Vessels) په لاندې ډول دي

☑ ینه (Liver 9) ، معده (stomach 26)، تریخی (Pancreas 33)، مری (Ösophagus 34)، شریان ابهر (Aorta 15)، د سینې اونس ترمنځ پرده (diaphragm 13) ، (Arteria mesenterica superior 17، Truncus coeliacus)، (Vena portae 11) ; renal vein (25) 32), (Vena mesenterica superior 23), (Vena hepatis 10), (Confluens V. portae 12); (Cutis ☑ (Subcutis 2) , 1)

په معده کې هوا (26) کولی شي د ځيگر په ټيټه حاشيه کې صوتي سيوري توليد کړي.

اوس ترانسډيوسر transducer د ناروغ کيڼ اړخ ته (انځور a21.3) ته مایل کړئ ترڅو په بني پارورټيبرل right paravertebral موقعيت کې (inferior vena cava (IVC, 16) وليدل شي او همدارنگه د 16 right atrium) سره د هغه يوځای نښلون وليدل شي د ځيگر رگونه (10)، اودکيڼ (1 1) portal venous branch) څانگې (او د هغې مخکې، د ځيگر شريان (18) د ځيگر دننه پيژندل کيدی شي (9) caudate lobe (9a)، hepatic parenchyma د caudate lobe اعظمي قطر بايد د 5.0 سانتی مترو څخه کم وي او دمخ څخه شاخواته قطر له 2.5 سانتی مترو څخه کم وي.




Fig. 21.2 a



Fig. 21.2 b




Fig. 21.2 c




Fig. 21.3 a



Fig. 21.3 b




Fig. 21.3 c

۲۶: - شکل: پورتنی پريتوان طبقې شاته retroperitoneum د التراساوند نارمل معاینه ښوول شوې ده .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




Abb. 26.3 a



Abb. 26.3 b




Abb. 26.3 c

۲۷- شکل: دخيتې په عرضي سطحه کې د ليدلو وړ غړي په لاندې ډول دي:

- ☑ (Vena portae 11), (Liver 9), (Lig. falciforme hepatis 8); (M. rectus abdominis 3), (Cutis 1)(Arteria mesenterica superior 17); (V. lienalis 20); (Confluens V. portae 12); (pancreas 33)(A. renalis dextra 24a), (A. renalis sinistra 24b), (Aorta 15), (V. cava inferior 16) Corpus Vertebralis 35; (V. renalis sinistra 25b), (Diaphragma thoracis 13), (Ren 29),

Lower Retroperitoneum, Normal Findings

وروسته له دې چې تاسو د پورتنۍ پريتوان طبقې شاته retroperitoneum سيمه معاینه کړه ، نوورپسې ترانسډيوسر transducer د شريان ابهر په اوږدو کې ښکته خواته inferior vena cava حرکت ورکړئ چې په شکل (Fig. 22.1 a) کې ښوول شوی دی .

د دې لویو رگونو د داخلي کانال د لیدو سربیره ، معاینه کونکی باید دنوموړو رگونو په دواړو اړخونو کې transducer ته مایل حرکت ورکړي ترڅو perivascular lymph nodes غټوالي وازمويل شي (انځور 21.1) . غټي شوې لمفوي غوټې لیمف په دوامداره توګه د هایپوکویک hypoechoic بیضوي جوړښتونو په توګه څرګند یږي

د شريان ابهر د پورتنۍ دیوال او د فقرې د مخکینۍ حاشیې تر مینځ فاصله باید له 5 ملي میتر څخه زیاته نه وي.

دلاندنی پريتوان طبقې شاته retroperitoneum د ليدلو وړ غړي اورگونه (Vessels) په لاندې ډول دي

external iliac vein (22a) ; internal iliac vein (22b); iliac artery (21) ; small bowel (46);



Fig. 22.2 a




Fig. 22.2 b




Fig. 22.2 c



Fig. 22.3 a



Fig. 22.3 b




Fig. 22.3 c

۲۸- شکل : دلائدنی پريتوان طبقي شاته retroperitoneum دليدلوورغري اورگونو (Vessels) التراساوند سکن بنوول شوي دي

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]


Aortic Ectasia and Aneurysms

دابهري شربان پراخوالی او انیوریزمونه

درگونود داخلې کانال محدود اتساع معمولاً د شریانونو د arteriosclerotic زخمونو او د شریان د دیوال ځایی ضعیف کیدو په پایله کې رامینځته کیږي ، اکتاسیا Ectasia د 25 ملي متر څخه ډیر او د 30 ملي متر څخه کم د aortic lumen د اتساع په توګه تعریف شوی. اکتاسیا Ectasia د انیوریزم (23.1 شکل) سره په تړاو کې هم رامینځته کیږي شي . د اکتاسیا Ectasia تعریف داسې ټاکل شوی دی چې د 30

ملي متر څخه ډير قطر په aorta abdominal suprarenal و لري او يا 40 mm په aortic arch قطر و لري نو په دې شرط اکتاسيا Ectasia تعريف شوی. دابهرې شريان پراخوالی کيدی شي تاوشوی شکل و لري او يا دا چې د کڅوړې په شان وي. په اختلاطاتو کې کيدای شي دابهر شريان وچوي لکه د انيوريزم ټوټه کيدل او يا مورال ترومبوسيس (52 mural thrombosis), منع ته راشي، کوم چې کېدی شي د معدې امبولي emboli لامل وگرځي.

Aneurysm بايد د ectasia څخه توپير شي، کوم چې د شريان د نورمال قطر 50% څخه کم د شريان پراخوالی څرگندوي.



Aortic Aneurysm د آورتا په رگ کې د بالون په څير برآمدگي ته وايي. بلخوا (لوی شريان هغه رگ دی چې د زړه څخه وينه د سينې قفس او تنې torso له لارې ليږدوي)

Checklist for Aortic Aneurysm

Suprarenal aorta < 25 mm (normal)

Aortic ectasia: 25–30 mm

Aneurysm: > 30 mm

Signs of increased rupture risk:

- Progressive dilation
- Diameter > 60 mm
- Saccular not fusiform
- Evidence of dissection
- Eccentric lumen



Fig. 23.1 a




Fig. 23.1 b




Fig. 23.2 a



Fig. 23.2 b




Fig. 23.2 c

۲۹- شکل : دشریان ابهر (15) aorta پراخوالی انیوریزم Aneurysms په اوږدوالې بڼه ښوول شوی دی

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Retroperitoneal Lymph Nodes

دگیدې دپړیتوانی طبقې شاته لمفاوي غوټې

لمفاوي غوټې (55) معمولا د hypoechoic جوړښتونو په توګه څرګندېږي . دامهمه ده چې لمفاوي غوټې درګونو جوړښتونو څخه توپیر وکړ شي . داځکه چې رګونه هم کټ مټ دلمفاوي غوټې په شان په التراساوند کې ښکاره کېږي . دلمفاوي غوټو د موقعیت سره په تړاو کې په خپته کې د عادي لمفاوي غوټو اندازه د اوږد محور په اوږدو کې لږ څه 7-10 mm پورې رسېږي .

د فزیولوژیکي له پلوه لوی لمفاوي غوټې چې اندازه یې تر 20 ملي متره (24.3 شکل) پورې رسیږي د iliac شریانونو په اوږدو کې او د inguinal په سیمه کې شتون لري. عادي لمفاوي غوټې او همدارنګه التهابي لمفاوي غوټې بیضوي شکل لري او اوږد محور نسبت د لنډ محور سره د 2:1 څخه زیات دی.

په (Fig. 29.3) شکل کې دینې التهاب او د پانکریاس التهاب له کبله خوراغټې hyper. echoic لمفاوي غوټې لیدل کیږي. او یاد صفرا د نلونو التهاب کوم چې په porta hepatis (Fig. 33.3) کې ښوول شوی دی.

کروي شکله لمفاوي غوټې چې دهغوی اوږد محور او لنډ محور نسبت تقریباً 1:1 وي پرته له hilum sign داسې اټکل کیږي چې پاتولوژیک بدلون پکې شتون ولري.

خبیث لمفوما Malignant lymphomas داسې ځانګړتیاوې لري چې ګاونډي رګونو باندې فشار راولي او یاد چې بیخایه کوي

(Fig. 24.2) خو مګر دوی معمولاً نه د دوی دیوالونه باندې یرغل او نفوذ کوي او نه هم د نږدې نورو غړو ته ننوځي.

په Non-Hodgkin lymphoma ناروغۍ کې اکثراً mesenteric لمفاوي غدې (55) تریرغل لاندې نیسي چې په (Figs. 24.1 and 24.2) شکل کې ښوول شوې دي



Fig. 24.1 a




Fig. 24.1 b



Fig. 24.2 a




Fig. 24.2 b



Fig. 24.3 a





Fig. 24.3 b

۳۰- شکل : د ګیدې د پریټوانی طبقې شاته لمفاوي غوټې (55) ښوول شوې دي .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Transverse Planes of the Upper Abdomen, Normal Findings



دمعدي پورتنی برخې په
عرضي سطحې نورمل موندنې

هاپراکويک پوستکي (1)
اودپوستکي لاندې غوړجن
نسجونه (2) اودخيتې سم
سيخ دوه عضلات (3)
مستقيماً دبدلونکي صوتي
آلي Trancducer لاندې
موقعيت لري . دجمجمې
عرضي سطحه (Fig. 28.1)
دسلياک تنه (32) celiac trunk
رانبکاره کوي اودوه خانگې

لري چې دکبدي شريان (18) hepatic artery اودطحال شريان (19) splenic artery. په نوم
سره ياديږي. دالبا کربنې Linea alba خلفي خواته اوليرې لکې. خواته Figs. 28.2 ليگامنتوم
تيرز (7) ligamentum teres او دناف وريد موقعيت لري.
کوچنۍ کڅوړه د ځيگر په خلفي برخه کې د يوه تنگ سوري په څير بنکاري (9)؛ پانقراس (33)
سمدلاسه د هغې شاته پروت دی.

د پانقراس لکۍ اکثراً دمعدي د گاز څخه (26). د صوتي سيوري پواسطه پتيري (45) .
د طحال وريد (20) په مستقيم ډول د پانقراس د خلفي برخې په اوږدو کې غځيدلی دی. د
پښتورگو چپ رگ (25) لري خلفي خواته د superior mesenteric artery (SMA, 17)
شريان اودابهرشريان (15) aorta ترمنځ پروت دی اوپه (Fig. 28.3) شکل کې ښوول
شوی دی. فوقانی mesenteric شريان (17) دابهرشريان څخه راوييليرې. (15) aorta

د (16) vena cava دابهريان كيني خواته بنكاري . دملافقري (35) vertebra ، portal vein (1 1),



Fig. 28.1 a



Fig. 28.1 b



Fig. 28.1 c




Fig. 28.2 a



Fig. 28.2 b




Fig. 28.2 c



Fig. 28.3 a



Fig. 28.3 b



Fig. 28.3 c

۳۱- شکل : دمعدې پورتنۍ برخې په ساره سطحې وريد او شريان بنوول شوي دي .
د ليدلو وړ غړي اورگونه (Vessels) په لاندې ډول دي

☑ ينه (Liver 9) ، معدده (stomach 26) ، پانكرياس (pancreas 33) ، (diaphragm ،
13) (Venae cava inferior 16) ، د يني وريد رگ (Vena portae 11) ، (Arteria ،
(Truncus coeliacus 32) ، hepatica 18)

(Aorta abdominalis 15) (Arteria lienalis 19), (Corpus vertebralis 35), (acoustical shadow 45)

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




Fig. 27.2




Fig. 27.3

۳۲- شکل : دمعدې پورتنۍ برخې د عرضي سطحي بنسټيز اناتومي جوړښت کښل شوی دی.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

خلورمه برخه

پینځم څپرکی

التراساوند اطلس

(Ultrasound atlas)

د داخلي ارگانونو التراساوند معاینه

دالتراساوند ماشین په مرسته دداخلي غړومعاینات ډاکټر ته ددې امکانات ورکوي چې د بدن دننه په غړو لکه پروستېټ غدې، تخمدان یا رحم له ډیر نږدې وگوري اودناروغیوتشخیص په دقیق اوصحیح توگه وکړاښي وگوري.

په ۳۳: شکل کې دالتراساوند ماشین بنوول شوی دی چې دنوموړې آلې په مټ په بدن کې دداخلي ارگانونوالتراساوند معاینه ترسره کيږي .

د التراساوند سکین scann یوډول کړنلاره ده چې د داخلي ارگانونواناتومي جوړښت، دناروغیوتشخیص او فعالیت معاینه کولو لپاره کارول کيږي . داخلي ارگانونه لکه ځیگر، پښتورگي، پانقراص، طحال، یڼه ، پروستېټ، دصفراکڅوړه ،رحم،زړه ، اوهمدارنگه د التراساوند سکین د وینې رگونو معاینه کولو لپاره کارول کيږي. لکه شریانونه او رگونه د تنگیدو یا بندیدو لپاره اوداسې نور. التراساوند لمف نوډونه د تومورونو، سیستونو او تیږو ناروغیو لپاره ، د تایرایډ غدې د پراخیدو یا کمولو لپاره ، (سیستونه) او تومورونه، د رنځپوهنې بدلونونو لپاره اوهمدارنگه دزړه هراړخیز حرکت معاینه کول ترسره کيږي .

د مثال په توگه، د معدې التراساوند کولی شي د معدې درد یا پړسوب لامل معلومولو کې مرسته وکړي. دا کولی شي د پښتورگو تیږو، د ځیگر ناروغۍ، تومورونو او ډیری نورو شرایطو معاینه کولو کې مرسته وکړي. ستاسوکورنی ډاکټر ممکن دا ازموینې وړاندیز وکړي که تاسو د بطن د شریان انیوریزم په خطر کې یاست


د سینې التراساوند سکین یوه ازموینه ده چې د لوړ فریکونسی غږ څپې کاروي ترڅو د سینې دننه عکس رامینځته کړي..

کله یوه میرمن باید د سینې التراساوند سکین معاینه ترسره کړي ؟

لومړی : هغه د سینې معاینه اړین ده کله چې په سینه کې یوه غوټه لمس شي

دویم : که یوه میرمن په سینه کې یوه غوټه لري خو په ماموگرافي آله کې نه لیدل کیږي

دریم : په سینه کې یوه غوټه شتون لري خو ډاکټر غواړي چې پوه شي چې آیا دا غوټه جامد او که مایع مواد لکه سیټ cyst په داخل کې لري



۳۳ شکل : د التراساوند ماشین په مرسته د ناروغ داخلي ارگانونو معاینه کولو کړنلاره کښل شوې ده.

په نوموړي شکل کې لیکل شوي جرمني لغتونو ترجمه په لاندې ډول ده .

Bildschirm تلویزیوني پرده یا مونیتور Monitor

Bedienkonsole د اعیارولو په موخه د کنټرول کونسول

Computer کمپیوتر

Schallkopf د التراساوند څپې استوونکې اورانیوونکې آله ده چې د ترانسډیوسر Transducer یعنې بدلونکې په نوم یادېږي . ترانسډیوسر استوونکې بریښنايي سیګنالونه په التراساوند

بدلوي ، اورانيوونکی التراساوند خپې په بريننايي سيگنالونو بدلوي ، او ليردونکي دواړه کولی شي التراساوند خپې وليږدوي او هم بيرته بريننايي زيگنالونه ترلاسه کړي .
Gel يو ډول سريبنجنه نرمه ماده ده چې د پوستکي Haut په مخ موبنل کيږي اود بدن اوترانسډيوسرترمنځ مقاومت کموي ترڅو هلته هواورننه نه وځي Schallwellen د التراساوند خپې چې د ترانسډيوسر څخه راوځي دناروغ داړونده غړي Organ نسج Gewebe چې معاینه کيږي

د التراساوند ماشین په مرسته څه شی تشخيص کیدی شي؟

د التراساوند سکين په کارولوسره د زېږون ماشوم وده د امیندواری په جریان کې معاینه کیدی شي: د نسايی متخصص ډاکټر کولی شي اندازه کړي چې ماشوم څومره لوی دی او ایا ټول اعضاء او غړي جوړ شوي او ښه وده کوي. پلاسينټا (placenta) او د ناف تارچې د هغې له لارې ماشوم ته اکسیجن او غذايي مواد ورکول کيږي، هم ارزول کیدی شي.
همدرنگه د التراساوند معاینې ترسره کيږي ترڅو د ناروغيو یا نسجونو نیمگړتیا تشخيص کړي، په ځانگړې توگه:

د نسجونو پرسوب یا د ټولو ارگانونو پرسوب، لکه دطحال اویا د لمف نوډونه ، نوموړې کړنلاره کولی شي التهاب په گوته کړي.

دکڅوړې په شان دیوه رگ برامدگې (انیوریزم) یا د وینې رگونو یا د زړه دریچې یا valva تنگوالی.

تشه فضا cavities (چې د سیستونو په نوم یادېږي او دوی کولی شي دبیلگې په توگه، په پښتورگو یا تخمدانونو کې رامینځته شي.


Calcifications، د بیلگې په توگه په پانقراض کې، اویا لکه دصفراپه کڅوړه کې ډبرې چې د گالستون په نوم یادېږي .

د مایعاتو راټولولیدل، د بیلگې په توگه د سږو او سینې دیوال تر منځ دمایعاتو راټولیدل چې د pleural effusion په نوم یادېږي.

په نسج کې بدلونونه لکه په ځیگر کې دغوړ راټولیدل، دینې سیروسیس. liver cirrhosis
د غړو په اندازه اوحجم کې بدلون لکه د تایرایډ غټوالی (گوټیر) یا کوچني پښتورگي چې سره غونډ اولنډ شوی وي shrinking kidneys
دغړواویانسجونو وده کول لکه تومور یا د دوی دلور تومورونه (میتاتاسیس).

ینه، خيگر، کبد (Liver; Hepar)

ینه دشمزی لرونکو ژویو لپاره یو حیاتي ارگان دی اوپه بدن کې ترټولو درنده غټه غده ده. ینه نصواري سوررنگ لري او په لویانو کې دیونیم کیلوگرام څخه تر درې کیلوگرام پورې وزن لري. په بدن کې لکه یو کیمیاوي لابراتور د میتابولیزم مرکزي غړی تشکیلوي. ینه د خټې فضا په بڼې برخه کې پرته ده او د پورتنۍ خوا پوښ شوې سطحه **Fascia diaphragmatica** یې حجاب حاجزاني **diaphragm** د یافراگم سره نښتی ده.



۳۳- شکل: په ینه کې دوینې دخول او خروج رگونه ښوول شوې دي. سوررنگه رگونه پاکه وینه، ابې رنگه رگونه ناپاکه وینه اوشین رنگ د صفرا بهیدلولاره ښي

دینې فیزیولوژیکې دندې:

دینې هراړخیزې دندې د ځانګړو حجرو په واسطه ترسره کېږي چې دهیپتوسایت **hepatocytes** په نوم یادېږي. داسې اټکل کېږي چې ینه دنورو غړوسره یوځای دلږڅه پینځه سوو دندې مسؤلیت په غاړه لري. دینې دندې عبارت دي له:

- ینه د صفرا زیرېځونه مایع تولیدوي او هم یې اطراح کوي. کله چې په اثنی عشر کې **Duodenum** غذايي مواد جذب شي نو د صفرا په مرسته دهغې شحمیات هضم کېږي، او د شحمیاتو څخه تری گلیسیراید **triglycerides** جوړوي، همدارنگه داسیدي موادو څښتي کول د صفرا په مرسته ترسره کېږي،

- بلخوادصفرا په مرسته د بدن څخه کلوسترين ،بايلېروبين ،ذهرجن فلزات اوداستقلاب په پايله کې هراړخيز توليدشوي ذهرجن اوپاتې شوي مواد له بدن څخه بهرته اطراح کېږي.
- يڼه دانزايموپه مرسته په وينه کې ټوکسين او زهري مواد لکه الکھول تجزيه کوي اوذهرجن خواص يي کموي .
- په وينه کې دگلوکوزمقدارکنترول .که په وينه کې دگلوکوزمقدارډيرلوړشي نوپه لومړي گام کې دگلوکوجين Glycogen په شکل اوکه دڅلورسوه گرام څخه واورې نوپه خنثي غوړو triglycerides اړول کېږي . همدارنگه که په وينه کې دگلوکوزمقدارلوړشي نوبرعکس گلوکوجين په گلوکوزاړوي .
- شحميات دليپوپروتين Lipoproteins په شکل ذخيره کېږي .
- په يڼه کې دهورمونو توليد ،دکلسترول جوړښت اوکنترول ، اودوينې پروتينو (البومين ،گلوبولين فيبرينوجين ،ايمونوگلوبولين اونورو) جوړښت صورت نيسي
- دوينې لخته کيدنې يا پرې کيدنې فکتورونه لکه فايبرينوژن fibrinogen او پروتسترومبين prothrombin جوړښت
- په يڼه کې دوينې فيلتریشن ترسره کېږي ترڅو زاره اومړه شوي سره کروييات ليرې شي .
- په يڼه کې پروتين وازده ،اوسپنه ،مس ،ويتامين لکه (A,B,D,E, K, B12) ،مينرال اولږڅه شل په سلوکې 20% د بدن وينه ذخيره کېږي
- ، په يڼه کې ذخيره شوي غوړ په کيتون باډي باندې اوړي اوپه دې توگه د بدن لپاره سمدلاسه انرژي د ATP په توگه توليدولای شي .
- په رحم کې دماشوم لپاره شپږمياشتي دويني توليدکول
- کله چې دغذايي موادو پروتين هضم شي نوپه پايله کې ذهرجن امونياك (NH₃) منځ ته راځي چې دينې په واسطه ديوريا دوران Urea cycle په مرسته په لږذهرجنو موادويانې يوريا urea باندې اړول کېږي اوپه ادرارکې د بدن څخه وځي ،
- يڼه اينزولين ډوله غټوونکي فکتورتوليدوی (IGF-1) ،نوموړی يوهورمون دی چې دکوچنيانوپه وده کې مهم رول لوبوي
- يڼه دترومبوبويتين Thrombopoietin دتوليدلپاره يومهم ځای دی . نوموړی يوگلایکوپروتين دی چې د صفيحاتوليدکنترولوی

په يڼه کې دوينې جريان (Blood flow) :

ينې ته ددووسرچينوڅخه وينه وربهيږي . لومړي دينې وريد الباب Hepatic portal vein په واسطه 75% اودويم دينې اصلي شريان Common hepatic artery په واسطه 25% وينه

ځيگرته ورننوځي . په وريدالباب کې لږاکسيجن لرونکې اوپه غذايي موادو غني وينه جريان لري اودطحال ، دجهازهاضمي سيستم څخه راټولېږي اوينې ته ورېهيږي . دوريدالباب په وينه کې په عمده توگه جذب شوي غذايي موادوي اوکيدای شي چې پکې بکټرياوي ، دواگانې اوذهرجن موادشتون ولري .

هغه غذايي موادچې دکولموڅخه وينې ته انتقال کيږي لومړی د وريد الباب ((Vena portae) په واسطه يني ته ننوځي .

پاکه اواکسيجن لرونکي وينه دينې شريان په واسطه يني ته ورېهيږي . دواړه ډوله وينه يانې شرايني وينه اووريدي وينه دينې په شعريه رگونوکې Liver sinusoid سره گډيږي . ورپسې وينه دوينستان رگونو capillary يانې موی رگ څخه په خپل وار سره مرکزي وريد V. centralis ، بياديښ وريد (تور رگ) Vv. Hepaticae ، ورپسې د تش وريدلاندې برخې (الوريد الأجوف) V. cava inf ته جريان مومي اوپه پايله کې دزړه ښي دهليزته بهيږي . کله چې دينې عمده شريان او وريد الباب يني ته ورننوځي نو هلته دلوبونوپه څنډوکې په کوچنيو څانگو ویشل کيږي اودصفرا سره يوځای ځانگړی درې گون جوړښت منځ ته راولي . دلوبونوپه څنډوکې يوډول اناتومي جوړښت چې دشريان يوه څانگه Arteriae interlobulares ، دوريدالباب يوه څانگه Venae interlobulares اودصفرائل interlobular bile duct څخه تشکيل شوی وی دگليسن ترايز Glisson-Trias په نوم ياديږي . دينې لاندې سطحې پوښ fascia viscerales کې ددخول يوه سيمه شته ده چې د Porta hepatis په نوم ياديږي . په دې ځای کې وريد الباب Vena portae hepatis او دينې شريان A. hepatica يني ته ورننوځي اودهمدې ځای څخه دينې مشترک تيوب Ductus hepatici . راوځي . دصفرامايع ياداچې دصفراپه کڅوړه کې ذخيره کيږي اويادضرورت سره سم اثنی عشر Duodenum ته ورتويږي .

په ينه کې دحجروډولونه (Cell types) :

ديني په لوبونو(فصيص) کې دوه ډوله حجري شته دي . په سلوکې اتيا % 80 دهیپتوسايت hepatocytes حجري دي اوياتي يې فاگوسايت خوړونکي حجري دي چې دکپر سلول Kupffer cell په نامه سره ياديږي . نوموړې حجري غيرفعال سره کروييات دمنځه وړي . همدارنگه دکپر خوړونکي سلول زاړه سره کروييات ، زاړه سپين کروييات ، بکټريا اونورييگانه اوذهرجن مواددمنځه وړي کوم چې په وريدي وينه کې دمعدې اوکولموسيستم څخه راځي خو هغه څوک چې په الکھولو، روږدی وي دکپر خوړونکې سلولونه دومره فعال کيږي چې دهغوی ځيگر تخریب کوي .

دصفرا جریان (Biliary flow) :

دصفرا کڅوړه *Vesica biliaris* دناک په شان شکل لري ، طول يې د 7-10 cm پورې رسېږي . نوموړې کڅوړه دځيگر په لاندني پوښ سطحه *fascia viscerales* باندې نښتي ده اود کڅوړې مجرا *Ductus cysticus* په واسطه دينې مشترک مجرا سره تړلې ده . هره ورځ لږڅه اته سوه نه ترزرملي ليتر 800-1000 ml صفرامايع دهیپتوسايت حجروپه واسطه افرازکيږي اوپينځوس ملي لير دصفراپه کڅوړه کې ذخيره کيږي . که چيرته دينې په وريد الباب کې ډيرصفرااسيدشتون ولري نودصفرامايع دځيگرهيپتوسايت حجروفعاليت هم زيات کيږي اوپرلپسې دافرازاتوليدکړنلاره گړندی کوی . ورپسې دصفرانلونوته بهيږي . صفراوي لارې چې په ځيگرکې هرې خواته تيرې شوې دي ټول په گډه سره خپله صفرا نوموړې کڅوړې ته تشوي . صفراوي کڅوړه درې اساسي دندې لري لومړی داچې دصفرا زيرمتون دی يعنې صفراپکې ساتل کيږي . دغه ماده په پرله پسې ډول ځيگر کې جوړيږي خو يوازې داپتياپه وخت کولمو ته تويږي نو صفراوي کڅوړه صفراوي ماده ساتي اوپه مناسب وخت کې دهورمونونوپه ځواب کې دغه کڅوړه ځان راټولوي او خپله صفرا کولموته ليردوي . دا دصفراوي کڅوړې دوهمه دنده ده او ددغې کڅوړې دريمه دنده دصفراغليظه کول دي . په هغه موده کې چې صفرا په کڅوړه کې پاتې کيږي له هغې اضافي اوبه جذب کيږي په دې ډول نه پريږدي چې اضافي اوبه له بدنه ووځي .

په ينه کې دصفرامايع توليدکيږي اوورپسې په کوچنيوکانالونوکې راټوليږي اوبياتيوب ډوله مجرای صفراوی *Bile duct* ته ورتويږي . دينې دشی خوااوکيني خوامجراوکې صفراوي مايع په خپل وارسره دينې مشترک مجرا ته *Ductus hepaticus communis* ورهيهږي . دسيسټيک تيوب *Ductus cysticus* خوله يوخوادصفراکڅوړې ته ورننوتلي دی اوبله خوله يې دينې مشترک مجرا سره يوځای کيږي اوپه پايله کې دصفرامشترکه مجرا *Common bile duct* ورڅخه جوړيږي . دپادولوورده چې دينې څخه دصفرامايع راوځي اوبرعکس وريدي وينه د وريد الباب اوشراینې وينه دينې اصلي شريان په واسطه يني ته ورننوځي . په بله ژبه دصفرامايع اودوينې جريان ديوبل په تړاوپه مخالف سمت کې بهيږي .

دينې لوبونه (Lobes)

دينې په قدامی سطحه باندې يولورډوله جوړښت *Falciform ligament* ليدل کيږي چې ينه په شی اناتومي لوب اوکينه اناتومي لوب باندې ويشي . جگردووغټولوبونواوددووکوچنيولوبونوڅخه جوړدی ، بنی غټه ټوټه يانې فص (*Lobus dexter*) دحجاب حاجزلاندې پرته ده ، کينه غټه ټوټه يانې فص (*Lobus sinister*) ، آن دخيتې

چې خواته د پاسه رسيږي . دوه کوچنۍ ټوټې عبارت دي له مربع ډوله لوب (Lobus quadratus) اولکۍ ډوله لوب (Lobus caudatus). نوموړي لوبونه په خپل وار سره دنورو کوچنيو لوبگيو lobules څخه جوړې دي او شپږکونجه جوړښتونه لري . لوبگي پخپله د ځانگړو اپيټيل حجرو Hepatocytens څخه جوړې شوې دي. بلخوالوبگي شفاف کوچني شعريه رگونه lobules لري چې دمنځ څخه يې وينه تيريږي .

دينې ناروغۍ :

دينې ناروغۍ لاملونه ډيري خواړن يې کيدی شي ، دوايرسونوپه واسطه التهاب ، تومورونه، الکحول، دهرجن مواد وي . په وينه کې دينې انزايمونو اندازه کول دينې ناروغۍ په اړوند پوره مالومات وړاندي کوي . د بيلگې په توگه د يوتا کلي انزايم gamma-glutamyltransferase چې لنډيز يې په GGT بنوول کيږي او اندازه کول يې ډير اړين دی . داځکه چې دنارمل مقدار څخه دنوموړي انزايم تغير دينې سلولونو نيمگړتيا په ډيره حساسه توگه رابښي . نور انزايمونه عبارت دي له : GOT ، GPT او AP الکالي فوسفټيز دی .

• غوړه ينه Fatty liver : دينې په حجرو کې په لوړه اندازه تري گلسرايد triglyceride راتوليږي .

• هپاټيټيز hepatitis : دينې التهاب ناروغي ده چې دوايرسونو A;B;C;D;E په واسطه منځ ته راځي

• سيروزيس Cirrhosis : دينې مزمن ناروغۍ پايلې دي اومشخصات يې دادي چې دينې نسج د نورو فيبري نسجونه په واسطه تعويض کيږي . ددې په څنگ اضافه اود پرهاريه شان ، توپير لرنکي نسجونه منځ ته راځي

• دينې سرطان : Hepatocellular carcinoma : نوموړې ناروغي په ثانوي ډول منځ ته راځي او دوايرس B او يا C هپاټيټ التهاب په پايله کې پيدا کيږي .

هپاټيټ ، زېړی ، التهاب جگر: - دينې يوې ساري ناروغي ته ويل کيږي چې په پايله کې دينې التهاب لامل گرځي . هپاټيټ ناروغۍ پخپله له منځه ځي او يا دا چې په فيبروز ناروغۍ اوږي . که دهپاټيټ ناروغي Cirrhosis او يا سپروز Fibrosis د شپږومياشتو څخه لنډه موده دوام ولري د حادهپاټيټ او که زيات وخت دوام پيدا کړي نو د کرونيک يانې مزمنې هپاټيټ په نوم ياديږي . نوموړې ناروغي د وایرسونو لکه A, B C, D, E ، بکټرياوو، مرخيږي ، پارازايت ، مخدره موادو، الکحول ، زهرجنو موادو

اودواگانو په واسطه منځ ته راځي . دهیپاتیت وایروس دپیژندنې لپاره په وینه کې دانتی باډي تشخیص کول دي چې دارونده انټیجن پروړاندې یې ایمیون سیستم جوړوي . بلخواپه وینه کې دینې انزایمونولکه **Aptt, PT/INR** اندازه کول دي

۱- هیپاتیت A ناروغي (Hepatitis A):

دینې انتان حاده ناروغۍ ده چې دوایرس A په واسطه منځ ته راځي اوددوومیاشتوڅخه ترشپږمیاشتوپورې دوام کوي . دهیپاتیت A وایرس ناروغۍ په دریمه نړۍ کې په تیره بیاپه کوچنیانو کې ډیره زیاته ده داځکه چې هلته دومره پاکې اوبه نه شته بلخوا نظافت هم نه مراعات کیږي . دغه ناروغۍ دخولې مقعدله لارې بدن ته ننوځي

او په وایرس A ککړشووغذایي موادولکه میوه، ترکاری ، ډوډۍ، بحري حیوانات ، دڅښلوککړې اوبه اویادککړشوي شخص سره دتماس له لارې اوهمدارنگه دجنسي تماس په واسطه لېږدي . همدارنگه دککړې وینې له لارې هم انتقال کیدای شي . ډیرناروغان کومه نښه نه لري اویازکام ته ورته نښې لري . شدیدزېړۍ نه لیدل کیږي . نوموړې ناروغي پخپله له منځه ځي اوهیڅ کله دینې په مزمنه هیپاتیت ناروغۍ نه اوړي . دناروغې داخه کیدلو څخه ترکلینیکي نښورابرسیره کیدو پورې موده لږڅه اته ویشت ورځې اټکل کیږي . دیوې میاشتي څخه وروسته تبه ، ضعیفوالی ، دسترگوزیرتوب ، نس ناستې ، نس دردي ، زړه بدې ، غایطه مواد سپین رنگه اومتیازې یې توررنگه کلینیکي نښې کیدای شي . نوموړی وایرس دوینې له لارې یې ته ننوځي او په خړومتیازوکې دبدن څخه وځي . په همدې موده کې موادغایطه په وایرس A ککړشوي وی اودانتان احتمال یې ډیردی . دناروغ په وینه کې پروړاندې د

(ایمنیسیستم ځواب تردریومیاشتوپورې انتی باډي ایمونوگلوبولین **Anti-HAV-Igm** پیژندل کیدای شي .

همدارنگه دټول عمر په موده کې انتی باډي لکه **Anti-HAV-Igg** پیژندل کیدای شي لومړی کلینیکي نښې یې دینې التهاب څخه دوه اونۍ وروسته پیل کیږي . دهیپاتیت ناروغۍ په حاد پړاو کې دینې انزایم (**ALT**) اندازه دنارمل په پرتله ډیره پورته ځي . دمخنیوي په موخه دنظافت ساتنه واکسیناسیون ، پخه شوې غوښه ، دمیووپوستکی لیرې کول ، جوش شوې اودجوش شوو اوبو څښل دي . لومړی واکسین ترڅلوراوونۍ پورې اغیزمن دی اودویم واکسین وروسته له شپږومیاشتو څخه کارول کیږي . په دې ډول دلسوکالونولپاره دهیپاتیت A وایرس دناروغۍ څخه سړی په امن کې ساتل کیدای شي . ددرملنې لپاره استراحت کول ، دغورځوڅخه پرهیزکول اوډیرې اوبه څښل دي . دمخنیوي په موخه واکسین ، نظافت ساتنه ، روغتیاساتنه اړین ده . دوایرس A واکسین دغیرفعال هیپاتیت A وایرس څخه جوړشوي وي اوبه دووېراوونوکې ترسره کیږي . دلومړي پړاوڅخه شپږ میاشتي وروسته دویم پړاواوکسین ورکول کیږي چې لس کاله

معافيت بنبي . دځينو کيمياوي موادو لکه کلورين، فورمالين، پيراسيټک اسيد او ماورای بنفش وړانگوپه مټ وایرس A غیر فعال کیدی شي .
 . دهیپاتیت A ناروغې پروړاندې واکسين شته دي چې د غیر فعال وایرس A څخه جوړي دي خود بدن معافيتي سيستم يې د ژوندي وایرس A په صفت تشخيص کوي .
 د بیلگې په توگه لکه **Avaxim ; Havrix, Vaqta, Epaxal** هر هغه څوک چې په خطر کې وي سمدلاسه او هغه څوک چې نورو هیوادونو ته سفر کوي اړین ده چې دوه اونۍ تر مخه واکسين وکړي .

۲- دهیپاتیت بی ناروغی : Hepatitis B

یوه حاده انتاني ناروغي ده چې د B وایرس په واسطه منځ ته راځي او دینې التهاب لامل ګرځي . په عادي توګه هیپاتیت B ناروغي څوانۍ دوام کوي او بیا وروسته ناروغ پخپله صحت تر لاسه کوي . په سل کې نوي تازه زیږیدلو ماشومانو کې او په سل کې لس بالغ وګړو کې کیدای شي چې دهیپاتیت B حاده ناروغۍ په مزمنه ناروغۍ واوړي او دینې التهاب لامل وګرځي . په پایله کې دینې نسجونه د منځه ځي **Cirrhosis** او یا ګونجی شوې یڼه او یا دینې په سرطان باندې اوړي . د هیپاتیت بی ناروغۍ نښې عبارت دي له : بې اشتهايي ، زړه بدې، قی کول ، د بدن درد، نرمه تبه، تورې متیازې ، مواد غایطه بې رنگه ، د پوستکي ټکي ټکي زیررنگ کیدل ، دسترګوزیررنگ اړینې نښې دي . نوموړې ناروغي هغه مهال منځ ته راځي چې دیوچاد بدن وینه او یا د بدن مایع لکه دمني او یا مهبل مایع، د زیارومایع چې د B په وایرس ککړوي او د سالم سړي بدن ته لاره پیدا کړي . همدارنګه په سل کې پینځوس د جنسي تماس، د وینې ترانسفوزیون، د چټلې پیچکاری ، طب سوزني ککړې ستنې د غاښو ککړېرس، ککړقاشق پنځې استعمال د ناروغۍ لامل ګرځي . که چېرته یوه بلاربه مور په هیپاتیت B وایرس ککړه وي او په سیروم کې وایرسي پروتین لکه هیپاتیت بی انټیجن **Hbeag** ولري نو په سل کې نوي د خطر احتمال شته دی چې اولاد ته د تولد په ترڅ کې هیپاتیت B وایرس سرایت وکړي . په نوموړي حالت کې اړین ده چې زېږیدلي ماشوم ته سمدلاسه واکسين ورکړل شي هیپاتیت B وایرس کیدای شي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ هم یوه بل ته انتقال شي . هیپاتیت B وایرس د لاس په تماس، د ډوډۍ په شریکه خوړلو، ټوخی ، ترنجیدلو، میچ کولوله لارې نه انتقال کیږي . د ناروغۍ دمخنیوي لپاره د واکسينو څخه ګټه پورته کیږي . د پیژندنې په موخه د ناروغ سیروم او یا وینه ازمویل کیږي . هغه پروتین یانې انټیجن لکه **(Hbsag)** لټول کیږي چې پخپله وایرس یې تولیدوي او یا هغه ایمونوګلوبولین یانې انتي باډي لکه **Anti-Hbc-Igm** لټول کیږي چې ناروغ یې د B وایرس پروړاندې تولیدوي . دهیپاتیت وایرس A په برخلاف ، هیپاتیت وایرس B داوبو او غذايي موادو له لارې سرایت نه

کوي دحادي هپاتيت وایرس B لپاره کومه ځانگړې درملنه لارم نه ده اودخواونیوپه موده کې پخپله وړک کيږي

یوازې په کرونيک انتان اودناروغۍ د اختلال په حالت کې دلاندې درملوڅخه گټه پورته کیدای شی : Tyzeka او (Viread)، (Hepsera)، (Epivir)

دهیپاتیت B دمخنیوي په موخه فعال واکسین شته دي چې دوایرس پوښ په شان په مصنوعي توگه جوړښوي وي اودهیپاتیت بې سطحې انتیجن Hbs-Antigen په نوم یادېږي د بدن معافیتي سیستم حجرې وروسته له درې ځله واکسین څخه دوایرس بهرنی پوښ بڼه پیژندلای شي اوکله چې درښتونی وایرس سره مخامخ شي نوېې دمنځه وړي . په پیل کې لومړی واکسین ، دویم واکسین یوه میاشت وروسته، درېیم واکسین شپږمیاشتې وروسته ترسره کيږي .ایمونوگلوبولین غیرفعال واکسین په دې ماناچې سړي ته تیارجوړشوي هیپاتیت B ایمونوگلوبولین HBIG

پیچکاري کيږي ترڅو بدن معافیتي سیستم سره دوایرس په وژنه کې مرسته وکړي . هر هغه څوک چې په خطر کې وي اویانورو هیوادونو ته سفرکوي سمدلاسه اویا هغه ډله طبي پرسونل چې په روغتونو کې کارکوي اړین ده چې هرپینځه کاله واکسین وکړي

۳- هیپاتیت سي ناروغۍ (Hepatitis C) :-

یوه انتاني ناروغي ده چې د هیپاتیت وایرس C په واسطه منځ ته راځي اودینې تخریب، نیمگړتیا اوالتهاب لامل گرځي . نوموړی وایرس د Flaviviridae وایرس په کورنۍ پورې اړه لري اودیرش ډوله جینوتاایپونه یې پیژندل شوي دي . دهیپاتیت C وایرس ناروغۍ لپاره لاتراوسه واکسین نه دی موندل شوي . حادهیپاتیت C ناروغي پرته له کومې نښې پرځای پاتې کيږي خو په سل کې تیا 80% مزمنه بڼه خپلوي . په مزمنه توگه کې هیپاتیت وایرس C په ینه کې دوامدار پاتې کيږي او دینې سیروزناروغۍ Cirrhosis لامل گرځي . په پایله کې دینې ددندې نیمگړتیا اویا دینې سرطان پیدا کیدای شي . نوموړی وایرس په ډېری سره بدن ته دوینې انتقال (ترانسفوزیون)، زخم، دغروپیوندول، بدن ته په وایرس ککړشوې وینې رانیول، په ترزیقي مخدرمواد و دروړدیداڅخه، په وایرس ککړشوو ستنو اوپیچکاریو 60%، جنسي تماس (%) (15، دستنې په واسطه پرېوستکې خال وهنه، دوینې وینې تماس له لارې انتقال کيږي .

هیپاتیت وایرس C دغاړه غړی ، مچ کونې اودخوراک شریک کولو له لارې انتقال کيږي . که چېرته یوه حامله داره مورپه هیپاتیت C وایرس ککړه وي خوددې احتمال ډیرلږدی چې دتولدپه ترڅ کې ماشوم ته نوموړی وایرس انتقال شي . په سل کې نوي ناروغان ددوواونۍ څخه ترشپږویشتنی اونۍ پورې پرته له کلینیکي نښې پاتې کيږي . همدالامل دی چې دناروغۍ داڅته کیدنې څخه لږڅه درې اونۍ وروسته په وینه کې دوایرس C تشخیص د Polymerase Chain Reaction کړنلارې په مټ کیدونی دی . خو هغه انتي باډي چې

د نوموړي وایرس پروړاندې جوړېږي د دریو اونیو څخه تر پینځه لس اونیو وروسته موده کې پیژندل کېدای شي. دهیپاتیت C وایرس د پیژندنې په موخه د ناروغ وینې په سیروم کې دهیپاتیت C وایرس پر ضد جوړ شوي انټي باډي Anti-HCV مقدار اندازه کېږي. خو په مالیکولي نوکلیک اسیدازمونیې طریقه کې HCV-RNA د وایرس جینوتاېپ، د وایرس C شته والی او د وایرس مقدار هم پیژندل کېدای شي. ترټولو ډاډمن کړنلاره چې د ناروغۍ پراوښت کوي دینې څخه د نسجونو اخیستل Biopsy دي. که چېرته وایرس C په ینه کې د تل لپاره پاتې شي نو اړین ده چې درملنه یې د Peginterferon Alfa-2a اوسدو وایرسې درمل لکه Ribavirin په ګډه سره ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دهیپاتیت ناروغۍ Genotype I درملنه په حاده دوره یانې لومړیو شپږو میاشتو کې پیل شي. هغه ناروغان چې د سیروز ناروغي اویا دینې سرطان ورته ناروغۍ پکې پیداشوی وي نو د حل لپاره یې دینې ترانسپلانت یانې دینې پیوند کول دي د حاد هیپاتیت C ناروغۍ نښې په لاندې ډول څرګندېږي: لږ اشتها، ستړیا، دنس درد، د پوستکي ټکي ټکي زیررنگ، تخماریدل، متیازی کیدای شي توررنگ ولري، اود زکام ناروغۍ ته ورته نښې دي. دهیپاتیت C وایرس پروړاندې واکسین نه شته خو ناروغانو ته سپارښتنه کېږي چې دهیپاتیت A او B وایرس پروړاندې واکسین وکړي. همدارنګه دمخدره موادو څخه ځان وژغوري.

۴ - هیپاتیت ډي ناروغۍ Hepatitis D :

دینې التهاب کله کله پېښېدونکې ناروغي ده چې د RNA Virus وایرس په واسطه منځ ته راځي. نوموړی وایرس یوازې دهیپاتیت B وایرس په شته والي کې خپرېدلای شي. دا ځکه چې نوموړې وایرس خپل ساتونکی بهرنی پروتیني پوښ نه لري او یوازې دهیپاتیت B وایرس د سطحې پروتین (Hbsag) په مرسته خپل شمیرته تکثور کولای شي. په دې مانا چې یوازې هیپاتیت B ناروغان په هیپاتیت D ناروغۍ اخته کېدلای شي. هیپاتیت D وایرس د نورو ټولو وایرسونو په پرتله شل په سل 20 % کې دینې سیروز ناروغۍ اویا دینې سرطان لامل ګرځي. د هیپاتیت D وایرس د انتقال لاره دهیپاتیت B وایرس سره ورته ده دهیپاتیت B پروړاندې واکسین، کولای شي چې همزمان دهیپاتیت D ناروغۍ مخنیوی هم وکړي. درملنه یې دینې په پیوند کولو کې ترسره کېږي د نوموړي وایرس پیژندنه په وینه کې دهیپاتیت D وایرس انټیجن پروړاندې د بدن څخه جوړ شوي ایمونوګلوبولین igm شته والی چې په لاندې ډول موندل کېږي :

Anti-HDV-Igm, HDV-RNA

۵- دهپاتيت E Hepatitis :

دينې يوه انتاني ناروغي ده چې دهپاتيت واير س E په واسطه منځ ته راځي . نوموړې وايرس دخولې - مقعدله لارې بدن ته ننوځي او هلته تكثرکوي هيپاتيت E واير س په غايطه موادوکې شتون لري او په همدغه واير س ککړې اوبه اوغذايي موادوپه واسطه انتقال کيږي . د هيپاتيت E واير س تشخيص په غايطه موادوکې ترسره کيږي . دناروغۍ مزمنه بڼه ډيره نادره ده خو په بلاربوميرمنوکې دناروغۍ حاده بڼه وژونکې پايلې درلودلای شي . دناروغ په وينه کې دنوموړي واير س پروپاندي دايميون سيستم غبرگون په Anti-HEV-Igm, HEV-RNA . ډول موندل کيږي

ځيگر يو لوی ارگان دی چې يوازې په فقاريه حيواناتو کې موندل کيږي چې ډيری اړين بيولوژيکي دندې ترسره کوي لکه ارگانيزم دزهر وڅخه پاکول، او د پروتينونو توليد کول چې د هضم او ودې لپاره اړين دي.

ځيگر د هاضمې يو اړين ارگان دی چې صفرا توليدوي ، کوم چې يو الکلي مایع دی او کوليستيرول او بائل اسيدونه لري ، نوموړی د غوړ ماتولو کې مرسته کوي.

ځيگر د V. portae له لارې د هاضمې ارگانونو څخه وينه ترلاسه کوي او په ميتابوليزم او (detoxification (biotransformation کې مرکزي رول لوبوي. دا سترايډونه او بائل اسيدونه ترکيب کوي او همدارنگه ډيری اړين پلازما پروتينونه لکه البومين او کوگوليشن فکتورونه.

دلويانولپاره پينځه ميگا هرڅ اودکوچنيانو لپاره دری نیم ميگا هرڅ کوپړی وکارول شي. يوتخنيک وټاکل شي، چې دالتراساوند کوپړی دپنستيوترمنځ (Intercostal technik) ورننه ايستل شي. د عکس اخيستلوپه ترڅ کې ناروغ ته وويل شي چې دلېمودې لپاره ژور تنفس وکړي او بيايې بندکړي.

دناروغيوډولونه:

❏ دينی غتيدل (Hepatomegaly)

❏ غورجنه ينه (Steatosis hepatis) دالتراساوند عکس ډير سپين رنگ لری



❏ دينی التهاب (Hepatitis)

❏ کله چې ينه سره راغونډه شي او ديوه غړي په ځانگړي ډول دينې بين البيني التهاب ته سيروزيس ويل کيږي. (Cirrhosis hepatis) . دنوموړی

ناروغی نښه داده چې د التراساوند عکس يې ډیر انعکاس ښيي ګډه وډ او غیر متجانس مالومیږي.
 ☒ په ینه کې د وینې جریان او یا مایع بندیدل او په پایله کې ډنډه کیدل (Stasis liver)

کوم شي ته باید ډیر پام وکړو:

☒ د ښې عادي غټوالی:

د ښې ښې برخې اود Lobus caudatus حاصل تقسیم: $LC:RL = < 0,55$	د ښې شې زاویه د پینځه څلوېښتو درجونه کوچنی وي
	 Leberwinkel links $< 30^\circ$ Leberwinkel rechts $< 45^\circ$

۳۴- د ښې عادي غټوالی رسم شوی دی

☒ د ښې جوړښت متجانس انعکاس لري او که نه لري، د ښې غټوالی نورمال دی او که نه دی، دمخ سطحه همواره ده او که نه ده، په غوړجنه ینه کې د التراساوند انعکاس ډیروی، پوله يې د شاوخوا نورو غوړو څخه جوت سرحد نه ښيي، انعکاس يې د پانکریاس سره ډیر ورته دی. د کین څنګ ښې څنډې پنډې وي، شاوخوا ته د التراساوند سیوره لیدل کیږي او توررنگ لري.
 ☒ ایا ینه د پښتورګي په پرتله لږ منعکسه ده او که نه،

✕ دینې پوله باید سپینه وه بریشی او وریدونه باید توررنګ ولری، پخپله یښه د التراساوند خپوته په منځنۍ کچه انعکاس ورکوي.

Porta hepatis دینې لاندې برخې ته ویل کیږي چې هلته دوینې رګونه، د صفرانلکۍ، د لطف رګونه او عصبي فایبرونه یښې ته ورننوځي. د التراساوند په انځور کې د Porta hepatis ځای هغه مهال ښه لیدل کیږي کله چې ناروغ ژورتنفس وکړي یعنې الهام وکړي

ځیګر په 8 برخو یا زیګمنتونو ویشل شوی دی. د A. hepatica propria لومړۍ برخه ځیګر په pars sinistra او pars dextra باندې ویشي. د نورو ویشونو په پایله کې ټول 8 برخې رامینځته کیږي چې د کارکولوپه تړوله یو بل څخه خپلواک دي.

په فزیولوژیکي تړاو د ځیګر لپاره وینه ۲ پر ۳ د V. portae له لارې، او یوه درې د A. hepatica propria له لارې تآمین کیږي. دوینی جریان د ځیګر د رګونو له لارې زړه ته ځي. ځیګر یو تور سور نسواري، د رې کونجه شکل لرونکی عضو دی چې دوه لوبونه په غیر مساوي اندازه او شکل لري. د انسان ځیګر په نورمال ډول شاوخوا 1.5 کیلوګرامه وزن لري او شاوخوا 15 سانتي متره پلنوالی لري.

ځیګر د وینې دوه لویو رګونو سره تړلی دی: د ځیګر شریان او پورټل رګ portal vein. د ځیګر شریان د سیلیک تنی celiac trunk له لارې د اورټا aorta څخه په اکسیجن بډایه وینه لیږدوي، پداسې حال کې چې پورټل رګ د ټول معدې له لارې او همدارنګه د پانقراس او پانقراس څخه د هضم شوي غذايي موادو سره بډایه وینه لیږدوي.



Fig. 32.1 a



Fig. 32.1 b

Normal values
of the porta hepatis:

Portal vein:	< 13 mm (maximum 15 mm)
Common bile duct:	< 6 mm (< 9 mm post- cholecystectomy)



Fig. 32.2 a



Fig. 32.2 b




Fig. 32.2 c

۳۵- شکل : دینې په Porta Hepatis برخه کې دغړو عادي موندنې دالتراساوندو په انځور کې
ښوول شوی دي

په Fig,32 a,b,c کې لاندې غړي لیدل کیږي

- ☑ (Linea alba 6) ،ینه (Liver 9) ، معده (stomach 26) ، پانکریاس (pancreas 33) ،
(A. hepatica 18)
(V. renalis ، (A.mesenterica superior 17) ، (V. portae 11) ، (Confluens V.portae 12)
(A.renalis sinistra 24b et ، (Aorta 15) شریان ابهر (V.cava inferior 16) ، sinistra 25b)
(Corpus vertebralis دشمزی هډوکي (Diaphragma 13) (V. hepatis 10) ، dextra 24a)
(35)

مأخذ :

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]



Abb. 33.2 a




Abb. 33.2 b




Abb. 33.2 c

۳۶- شکل : دليدلووږغري اورگونه (Vessels) په لاندې ډول دي

- ☑ ينه (Liver 9)، غټې کلمې (Colon 43) ،
- ☑ دصفراکڅوړه (Vesica fellea 14)، (V. hepatis 10)،
- ☑ ،((bladder wall 80)
- ☑ ، (Diaphragma 13) ،)
- ☑ سږې (Lung, 47) (acoustical shadow 45)
- ☑ دينې وريد رگ (Vena portae 11)

مأخذ :

[With permission

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual ,
2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013
]




Abb. 33.3 a




Abb. 33.3 b




Abb. 33.3 c

۳۷- شکل: دليدلوورغري اورگونه (Vessels) په لاندې ډول دي

☑ دنس عظمات (M.rectus 4)، ينه (Liver 9)، (Diaphragm 13)، سږی (Lung 47)، دصفراکڅوپه (Vesica fellea 14)، (bladder wall 80)، (Vena portae 11)، (V. hepatis 10)، (acoustical shadow 45)، نری کلمې (Smal intestine 46)، غټې کلمې (Colon 43)




Fig. 39a. Longitudinal scan of a normal homogeneous liver.

۳۸- شکل: د يو نورمال همجنس جگر په اوږدوالي التراساوندسکين بڼوول شوی دی




Fig. 39b. Longitudinal scan of the portal and hepatic veins in a normal liver.

[S. Palmer „Manual of diagnostic ultrasound “ WHO 2002]

۳۹- شکل : دیوعادي ئیگر وریدونو په اوږدوالي سکین بنوول شوی دی

Portal vein , Hepatic veins , normal Liver



fig. 35.2 a




Fig. 35.2 b





Fig. 35.2 c



ig. 35.3 a



Fig. 35.3 b




Fig. 35.3 c

۴۰- شکل : دینې عادي جوړښت او موندنې د التراساوند په انځور کې بنوول شوې دي

وروسته له دې چې په لومړي گام کې يې په SAGITTAL PLANE سطحه کې سکن کړنلاره ترسره شي نو دینې کین خوا لوب LOB د سرخوانه بڼکته لکۍ خواته CRANIOCAUDALLY په ساره سطحه TRANSVERSE PLANE کې سکن کيږي ترڅو کیدی شي احتمالي کتله وموندل شي.
Gallbladder 14, Hepatic vein 10; Diaphragm 13; Liver 9; portal vein (11)

[With permission :
Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart, new york 2013]

دینې وریدي ستوری : Hepatic Venous Star

دینې وریدي ستوری د دریو وریدي رگونو یوځانگړي ترکیب ته ویل کيږي چې کټ مټ لکه دیوه ستوري شکل لري او د Vena cava inferior ته ورننوځي. دینې وریدي ستوري اهمیت په دې کې دی چې د التراساوند په سکن کې د زړه د پمپ کولو قدرت تشخیص کیدلای شي چې ښه زړه په کافي اندازه وینه بدن ته رسولای شي او که نه؟. په بله وینا د وریدي ستوري التراساوند په انځور کې د زړه کمزورتیا تشخیص کیدلای شي. دلیدلو وړ غړي په لاندې ډول دي :
د نس عضلات (M. rectus abdominis 3)، يېنه (Liver 9)، (Diaphragm 13)، (Vena portae 11)، (V. hepatis 10)، (V. cava inferior 16)، سږی (Lung 47)

په عادي توگه دینې وریدي ستوری اورگونه په محیط کې اوږد مستقیم خط السیر لري خو کله چې په يېنه کې دننه د نسجونو غیر عادي کتله لکه یو تومور او یا ډنډ شوې مایع لکه وینه شتون ولری او یا لکه د زړه د کار کولو کمزورتیا شتون ولري نو دینې وریدي بڼه تغیر کوي. همدالامل دی چې د التراساوند کړنلارې په مرسته نوموړې نیمگړتیاوې تشخیص کیدلای شي.



Fig. 36.2 a



Fig. 36.2 b




Fig. 36.2 c

۴۱ شکل: دینې وریدي ستوري Hepatic Venous Star التراساوند انځور بنسول شوی دی چې د دریو وریدي رگونوپه مرسته دینې هرې برخې څخه وریدي وینه راټولوي او د Vena cava inferior منح ته ور بهیري. د Vena cava څخه لیرې محیط کې دینې وریدونو قطر د شپږملي متر 6 mm څخه زیات نه وي.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart, new york 2013]

Normal Values:
Hepatic veins: < 6 mm
(periphery)

		
دینې عادي جوړښت اوموندنې	hepatic veins دینې رگونه	Accessory lobe of the liver دینې فرعي لوب


Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

	
د نورمل ینې ورید ونوستوری (Glisson Trias)	د عادي ینې ورید چې په اوږدو پرې شوې دی (Normal finding)

۴۲- شکل : دنورمل يني وریدونوستوری

Hepatic Venous Star


[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




۴۳- شکل : د عادي يني اوبني خواپنستورگي موندنې

دینې هیم انگیوم: liver hemangioma


دینې درگونوسلیم تومورونوته ویل کیږي . دینې هیم انگیوم لږڅه گردی، شکاره شکل لري اودگاوندیونسجونوپه پرتله ډیرانعکاس ښيي. په منځنی برخه کې کله د التراساوند څپوانعکاس کمښت لیدل کیږي. ځینې نورې ناروغۍ لکه دینې نسجونوکارسینوم او دینې میتاستاز کولای شي چې همدغه ښې ولري اوپه تشخیص کې ستونځې رامنځ ته کړي. په یوه داسې حالت کې باید د عکس اخیستلونوړې کړنلارې ولټول شي.



۴۴- شکل : دینې درگونوسلیم تومورونه ښوول شوي دي
له بلې خوا دینې هیمنگیوم د گاونډیو یڼې نسجونو په پرتله متجانس روښانه او ډیر انعکاس کوونکی hyperechoic خواص لري




۴۵- شکل: د معدې په فضا کې د آزادو مایعاتو راټولیدل Ascites ښوول شوی دی



۴۶- شکل . دينې ميتاستاز (Liver metastasis)


سرطان چې د بدن په يوه برخه کې پيل کيږي او ځيگر ته خپريږي د ليور ميتاستاسز په نوم ياديږي. دا ځينې وختونه د ميتاستيک جگر ناروغي بلل کيږي. سرطان چې په ځيگر کې پيل کيږي د لومړني جگر سرطان په نوم ياديږي. د ځيگر ميتاستيزونه د لومړني جگر سرطان په پرتله خورا عام دي.



۴۷- شکل . دینې میتا ستا زیس (Liver metastasis) په وکتورونو کښل شوی دي

Hepatomegaly

دینې غټوالی



۴۸- شکل : د الکولو خخه ناوړه گټه اخیستنه داسې پایلې لري چې ینه دنورمال په پرتله غټه شي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

غورځنه ینه (Steatosis hepatis)

کله چې ینه ډیر غوړ ولري ، نودسپینې ینې اویا د غوړ جنې ینې په نامه یادېږي . دینې او پښتورگي ترمنځ د التراساوند انعکاس (التراساوند مقاومت) په ښکاره توپیر سره لیدل کیږي . دینې رنگ تګ سپین دي ، داځکه چې هیپاتوسیت ډیر مزی کیږي اودهغی سره سم انعکاس هم زیات کیږي . پخپله ینه سره راغونډېږي او په رگونو کې هم بدلون راځي .

په لویډیز صنعتي هیوادونو کې د ځیگر ترټولو عام ناروغي چې د غوړ انحراف (تړایګلیسیریدز ، فاسفولیپیدز) په ځیگر کې د ۵٪ - ۳۳٪ (متوسط) ، ۳۴٪ - ۶۶٪ (متوسط) او < ۶۶٪ (شدید) قیمت لري . په کلینیکي توګه ، غوړ ځیگر تقریبا تل خاموش وي یا په ښي خوا کې د پورتنۍ معدې ښې ښانې ښیي (د بیلګې په توګه فشار ، ایستل ، تپي کول) .



شکل ۴۹. په ميتابوليک سندروم کې غوړجن ځيگر
Fatty liver in metabolic syndrome



شکل ۵۰: د غوړجن جگر التهراساوند انځور کښل شوی دی چې د پښتورگي په پرتله سپين رنگ لري او د التهراساوند انعکاس increased echogenicity زيات دی .

په يڼه کې د غوړونفوډ اړين نه ده چې په ټوله يڼه کې غوړنفوډ وکړي بلکې کيدی شي چې دينې په يوه برخه کې اویاخای په خای غوړ شتون ولري اود فوکل چاغي په نوم ياديږي



۵۱- شکل : فوکل چاغي
Focal obesity

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

يو غوړ ځيگر (ځيگر يعنی ستيتوسس داسې ځانگړتياوې لري چې په ځيگر کې په پراخه کچه د echogenicity زياتوالی شتون لري چې په (انځور 37.3) کې موندل شوی دی. په نوموړي شکل کې دينې echogenicity زياتوالی د نږدې پښتورگو (29) په پرتله خورا په ښکاره ډول تشخيص کيږي .

د رگونو بندوالي له امله د ځيگر اختلال دی Congestive hepatopath



۵۲- شکل : په يڼه کې داجوف وريد كمزورتيا كښل شوې ده

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

Congestive hepatopathy

دينې احتقاني ناروغي



۵۳- شکل : دينې احتقاني ناروغي ښوول شوې ده


[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

liver cirrhosis د ځيگر سيروسيس

د ځيگر اوږدمهاله، پرمختللي ناروغي چې د نښلونکي نسج وده کوي، مگر اصلي غړی په تدريجي ډول د سختوالي او انقباض له لارې له منځه ځي. د الکول د اوږدمهاله ناوړه گټه اخيستنې سربيره، سيروسيس ممکن د جگر (هيپاټايتس)، ميتابوليک اختلالاتو، يا د چاپيريال زهرجن موادو سره د اخته کيدو د ويروسي التهاب د ناوخته پايلې په توگه منځ ته راشي. د ځيگر سيروسيس په التراساوند کې ناهمواره نرمه، ټيټه جگه سطحه لري، دوظيفوي نسجونو غيرمتجانس جوړښت لري.


د ښي سيروسيس معيارونه :

په داسې حال کې چې يو نورمل ځيگر د خپل پولې په اوږدو کې يو پتلی هايپرکويک کيپسول hyperechoic ښکاره کوي د سيروسيس جگر سطح اکثراً د کوچنيو ناخالو يا ټپونو سره غير منظم شکل لري. پايله يې داده چې همدغه ناهمواره سطحه د التراساوند څپې په لوړه کچه هرې خواته شيندي او transducer ته په لږه اندازه رسيږي.



۵۴- شکل : د سيروسيس ښي ناهمواره سطحه ليدل کيږي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



۵۶- شکل : دینې غتہ شوې لکۍ لوب لیدل کیږي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

Checklist of Cirrhosis Criteria



- Absence of thin hyperechoic capsule line
- Diminished peripheral vascularity
- Widened angle of the hepatic veins $> 45^\circ$
- Abrupt caliber changes of the portal vein
- Possible enhanced "embankment" in the portal vein
- Regenerating nodules with displaced vessels

Additional Findings in the Late Stage

- Rounded organ shape (obtuse marginal angles)
- Shrinkage of the liver
- Signs of portal hypertension


liver cyst د ځيگر سيست

په ځيگر کې تر ټولو عام مرکزي زخمونه او تخريبيونه سلیم سيستونه دي . سيستونه کيدای شي د زيرون سره په تړاو کې منځ ته راغلي وي (dysontogenetic) او يا دا چې وروسته تر لاسه شوي وي . خود ژوند په اوږدو کې تر لاسه شوې سيستونه د زيرون اتساع شوو صفرا وي نلنو سره توپير کيدی شي داځکه چې دوی صفرا نلري بلکې يوازې سيروس مايع لري . د زيرون د ځيگر سيستونه معمولاً هيڅ کلينيکي اهميت نلري

		
Simple liver cyst د ځيگر ساده سيست	cyst liver سيست جگر	Complicated liver cysts د ځيگر پيچلي سيستونه

۵۷- شکل : ديني هراړخيز ډول سيستونه بنوول شوي دي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin
Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




۵۸- شکل : دينې سيست هراړخيز ډولونه کښل شوي دي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

دلاندو ځانگړتياوو په پام کې نيولوسره کولای شو چې سليم سيستونه د نورو کتلوي نسجونوڅخه په اسانۍ سره ٲوپيروکړای شو. نوموړي خواص hypoechoic په لاندې ډول بيان کيږي

- ◀ محتويات يې الٲراساوند ته انعکاس نه ورکوي
- ◀ کروي شکل لري
- ◀ سرحد يې صاف او ښکاره وي
- ◀ اوکله چيرته غټ سيستونه شتون ولري نو ترشاخواته يې د الٲراساوند شدت زيات وي




په ینه کې ګڼ شمیر سیست لیدل کیږي چې د یوې بلې سره ګډه پوله لري. څرنگه چې دینې ډیره برخه دسیستونوڅخه جوړه ده ، نوله دې کبله دسیست ینې په نامه هم یا د یږی.


په ینه کې درې سیستونه لیدل کیږي، چې د التراساوند څپې نه انعکاس کوي او له دی کبله توررنگ لری. خوترشا پرتونسجونوکې د التراساوند څپوانعکاس دګاونډیونسجونوپه پرتله ډیر زوروردی. دسیست بڼه نامنظمه ده خو په خپل منځ کې دیوه بل څخه ښکاره پوله لري.

۵۹- شکل : په ینه کې ګڼ شمیر سیستونه لیدل کیږي چې په وکتورونو کښل شوي دي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




Malignant liver foci د ځيگر خبيث تومور مرکزونه




۶۰- شکل : د ځيگر خبيث تومور مرکزونه ليدل کيږي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




۶۱- شکل : د ډيني حجرو ډير حلقوي سرطان

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



۶۲-شکل : ديني ميتاستاسيس

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



۶۳-شکل : په ينه کې هرډول ميتاستاسيس ليدل کيږي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




۶۴- شکل .: په ینه کې میتاستاسیس پېژندل شوي دي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]


In medicine, a halo is a ring-shaped structure that is arranged around a central object. Metastasis with halo and necrosis and dorsal sound enhancement

په طب کې، هالو یو حلقوي ډوله جوړښت ته ویل کیږي چې د مرکزي جسم په شاوخوا کې تنظیم شوی وي. هغه میتاستاسیز چې هالو او نیکروسس ولري خټ خواته د التراساوند شدت زیاتوالی څرګندوی.



۶۵- شکل : دیني حجرو منفرد سرطان لیدل کیږي


Benign liver lesions د ئيگر سليم تخريبيونه



Focal nodular hyperplasia is subject to degenerative changes.


۶۶- شکل : فوکل نوډولر هايپيرپلاسيا

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



۶۷- شکل : ديني سليم تومور . مأخذ : مايو كلينيك

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



Hemangioma دینې رگونو سلیم تومور

hematoma of the liver دځیگرهیماتوما

۶۸- شکل : دځیگرهیماتوما او دینې رگونو سلیم تومور

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



ligamentum teres
لیگامنتوم ترز هایپراکوئیک د آکوستیک
سیورې سره
Hyperechoic ligamentum teres with
acoustic shadows (simulating
calcification; changing the position of
the transducer provides clarification)

د میتاستاسیس جراحی وروسته
کلسیفیکیشن
Calcification after metastasis surgery
Subcapsular calcification after
metastatic surgery.

۶۹- شکل : د میتاستاسیس جراحی وروسته کلسیفیکیشن



د نری رنځ څو ځلیز کیلکیفیکیشن
Multiple tuberculous calcifications



د ګوتو په شکل کیلکیفیکیشن هم د
میتاستاسس جراحي وروسته حلقوي ډوله
کلسیفیکیشن
ring-shaped calcification also after
metastasis surgery

۷۰- شکل : په ینه کې کلسیفیکیشن calcification



حفره ای کبدی هیمنگیوماس
Cavernous hepatic hemangiomas




حفره ای کبدی هیمنگیوماس
Cavernous hepatic hemangiomas

۷۱- شکل : په ینه کې همانژیوم



Hamartomas in tuberous sclerosis
هامارتوما په تيوبروس سكليروسيس کې



Small lipoma / focal steatosis
کوچنی لیپوما

۷۲- شکل : په ینه کې کوچنی لیپوما

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



دصفرا کڅوړه (Gallbladder)

دصفرا کڅوړه يو کوچنی تش غړی دی چېرې چې د ځيگر لخوا توليد شوي صفرا ذخيره کوي او مخکې له دې چې کوچنی کولمو ته خپور شي غليظ کيږي. دصفراکڅوړه دناک په بڼه يو تش غړی دی چې نری ديوال لري اوپه منځ کې يې دصفرامايع ذخيره کيږي اوهم هلته ټينگيږي . دانسان دصفراکڅوړه لږڅه لس سانتي متره اوږدوالی اولږڅه څلورسانتي متره پلنوالی لري . څرنګه چې دصفرارنگ شين دی نوله دې کبله دنوموړي غړي رنگ هم شين مالوميږي . ځينې حيوانات لکه ځينې کوتري، طوطي، شترمرغ، موږکان، نهنگ، فيل، اوبن اونور دصفراکڅوړه نه لري.

دصفرا کڅوړه صفرا ترلاسه کوي او ذخيره کوي، د ځيگر لخوا توليد شوي، د عام هيپاټيک نالی، [common hepatic duct](#) له لارې، او دا د عام بائل ډکټ [the common bile duct](#) له لارې دودينم [duodenum](#) ته خوشې کوي، چيرته چې صفرا د غوړ په هضم کې مرسته کوي. د صفراکڅوړه د صفراډبرو لخوا اغيزمن کيدی شي، داډبرې د هغوموادو په واسطه رامينځته کيږي چې نشي حل کيدی - معمولاکوليستېرول يا بليروبين، کوم چې د هيموگلوبين د ماتيدو محصول دی

د صفراکڅوړه تقريبا 50 ملی ليتر ظرفيت لري، ديوال يې د مغز غشا مخاطی، نرم نښلونکي نسج او نرم عضلات لري.

دلويانولپاره پينځه ميگا هرڅ اودکوچنيانو لپاره دري نيم ميگا هرڅ [probe](#) وکارول شي.

دناروغيوډولونه:

✖ دصفرا ډبرې (Cholecystolithiasis)، داوبودډندکيدلوله امله دصفراکڅوړې

پرسيدل (Gallbladder hydrops)

✖ دصفراکڅوړې کارسينوم (Gallbladder carcinoma)


✖ دصفراکڅوړې التهاب (Cholecystitis)

✖ تبه لرل او دخيتې په پورتنی برخه کې ديوه کلک او غټ شي حس کول

کوم شي ته بايد ډيرپام وکړو:

✖ دصفراکڅوړې غټوالی:

❖ بنه يې دناك په شان ده. د ديوال ضخامت لږڅه څلورملي متر، طول يې سل ملي متر، عرض يې څلوېښت ملي متر، حجم يې دسل ملي مترڅخه کوچنی دی




۷۳- شکل : د صفرا کڅوړې نورمل جوړښت کښل شوی دی

❖ د التراساوند انعکاس پکې نه شته اوله دې کبله د التراسوند عکس يې توردی.

❖ د صفرا په کڅوړه کې اکثراً د تېرولو له امله د صفرا التهاب Cholecystitis رامینځته کېږي.

د صفرا کڅوړه د ناک په څیر شکل لري، د هغې سر په سیسټیک نالي cystic duct کې خلاصیږي. نوموړې په دریو برخو ویشل شوې ده: fundus، بدن، او غاړه



۷۴- شکل : دصفراکخوړې اناتومي جوړښت کښل شوی دی

مأخذ :

<https://www.ehealthstar.com/anatomy/gallbladder>



Fig. 35.2 a



Fig. 35.2 b






Fig. 35.2 c





normal findings of gallbladder

دصفراکخوړې عادي موندنې




normal findings of Postprandial contracted gallbladder

عادي موندنې

۷۵- شکل : دصفراکخوړې عادي موندنې

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



standard variants of gallbladder
GB diverticula

دصفراکخوړې متغیرستاندارد ډولونه



standard variants of gallbladder
Septated GB

دصفراکخوړې متغیرستاندارد ډولونه

۷۶- شکل : دصفراکخوړې متغیرستاندارد ډولونه بنوول شوي دي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



Multiple gallbladder stones
دصفراکخوره کې ګڼ شمیر ډبرې



Gallbladder Sludge
دصفراکخوړې مایع ټینګیدل

۷۷- شکل : دصفراپه کخوره کې ګڼ شمیر ډبرې موندل شوې دي

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



stone Gallbladder
ډبریزه صفراکخوره



stone Gallbladder
ډبریزه صفراکخوره

۷۸- شکل : ډبريزه صفراکڅوړه په التراساوند عکس کې ښوول شوې ده

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



۷۹- شکل : د صفراکڅوړې په التراساوند عکس کې ډبره ليدل کېږي شاخواته يې تورتياړه سيوره هم ليدل کېږي.


د درملنې په موخه د يو ډول تخنيک څخه گټه پورته کېږي چې د لېپروسکوپيک کوليسيستيکټومي په نوم ياديږي په عام ډول کارول کېږي. دا کړنلاره کوچني جراحي چيری کاروي، کوم چې د چټک بيا رغونې لپاره اجازه ورکوي. يو ناروغ اکثرا کولی شي د جراحي په 1 ورځ کې دننه له روغتون څخه کور ته لاړ شي.

د شاک څپې لیتوتريپسي (ESWL) د گال بليډر د هغو خلکو لپاره هم کارول کېږي چې نشي کولی جراحي وکړي. دا درملنه لکه څنگه چې يوځل کارول شوې وه نه کارول کېږي ځکه چې د گالستون ډيری وختونه بيرته راځي.

موخه :

Mayo foundation for medical education and research

Gallbladder adenoma دصفراکڅوړې اډينوما



Gallbladder adenoma دصفراکڅوړې
اډينوما



Gallbladder adenoma دصفراکڅوړې
اډينوما

۸۰- شکل : دصفراکڅوړې اډينوما

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




دصفراکڅوړې سرطان جمع ډبره
GB carcinoma + stone




دصفراکڅوړې سرطان جمع ډبره
GB carcinoma + stone

۸۱- شکل : دصفراکڅوړې سرطان او ډبره تشخيص شوې ده




۸۲- شکل : دصفراکڅوړی نورمال جوړښت دډوډی څخه وروسته اودمخه ښوول شوی دی

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




۸۳- شکل : دصفرایه کڅوړه کې ډبرې تشخیص شوي دي



دصفراپه کڅوړه کې ډبره لیدل کیږي چې په وکتوربنول شوې ده او شاخواته سیوره اچوي
 دصفراپه کڅوړه کې ډبره لیدل کیږي چې په وکتوربنول شوې ده او شاته سیوره اچوي
 ۸۴- شکل : دصفراپه کڅوړه کې ډبره لیدل کیږي چې په وکتوربنول شوې ده


[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg



دصفراپه کڅوړه کې ډبرې پیداشوېدې اوله دې کبله دالتهاب لامل گرځیدلی دی . په پایله کې دصفرا دیوال هم پنډ شوی دی.
 دصفراپه کڅوړه کې ډبره لیدل کیږي چې په وکتوربنول شوې ده او شاخواته سیوره اچوي
 دصفراپه کڅوړه کې ډبره لیدل کیږي چې په وکتوربنول شوې ده او شاته سیوره اچوي
 ۸۴- شکل : دصفراپه کڅوړه کې ډبره لیدل کیږي چې په وکتوربنول شوې ده
 acute Cholecystitis and ,
 Pericholecystitis

۸۵- شکل : دصفراپه کڅوړه کې التهاب تشخیص شوی دی

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]




کله چې دصفراکڅوړه التهاب وکړي نو دصفراد دیوال موکوزا یوه برخه ورڅخه بیلېږي . داځکه چې دالتهاب له کبله هلته نسجونه مړه کیږي. دصفراکڅوړی چاپیره نسجونوهم په بشپړه او ښکاره توګه التهاب نیولې دی.

necrotic Cholecystitis with Pericholecystitis

۸۶- شکل : دصفراپه کڅوړه کې التهاب تشخیص شوی دی

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]



۸۷- شکل: دصفرا په کڅوړه کې التهاب تشخیص شوی دی

[Internistischer Sonographieatlas ; Innere Medizin Albertinen-Krankenhaus Hamburg]

Checklist for Acute Cholecystitis


- Thickened, multilayered wall
- Fluid rim around gallbladder
- Indistinct border between gallbladder and liver
- Wall thickness ≥ 4 mm (preprandial)
 ≥ 7 mm (postprandial)
- Tenderness to palpation with probe in right midclavicular line
- Hyperperfusion on color duplex sonography

دصفراکڅوړې د التهاب ځانگړتیاوې کښل شوې دي .

دمثانی کڅوړه Bladder

دمثانی کڅوړه د بدن یو غړی دی چې منځ یې تش دی او د پوښتورګي څخه اطراح شوی ادرار پکې راټولېږي . لږ څه درې سوه ان پنځه سوه ملي لیتر ادرار پکې ځایږي او په پایله کې د تحلیل له لارې د بدن څخه بهرته بهیږي.

د عضلاتو څخه جوړ شوی تش غړی دی چې په کوچني لګن کې د سمفیز symphysis شاخواته موقعیت لري . هغه ادرار چې په پښتورګي کې تولید شوی وی د مثنای کڅوړې څخه اخراج کیږي ، هم هلته ذخیره کیږي .



۸۸- شکل : دنارینه تناسلي غړي اود مثنای کڅوړې اناتومي جوړښت کښل شوی دی
ماخذ :

[Waldeyer Anatomie des Menschen. 19. Aufl. Berlin: de Gruyter, 2012]

د مثنای غاړه د تريگون trigone په پای کې هغه ساحه ده چې د داخلي urethral orifice شاوخوا ګرځي . په نارینه وو کې د ادرار مټانه غاړه د پروستات غدې سره نږدې وي .

◀ د لویانو لپاره پینځه میګا هرڅ اود کوچنیانو لپاره دری نیم میګا هرڅ کوترانسډیوسر وکارول شي.

اناتومي :

نوموړې غړې د لاندې برخو څخه جوړې دي

. Trigonum vesicae ، Fundus vesicae ، Corpus vesicae, Apex vesicae

دمثاني په کڅوړه کې ډير ناروغۍ منځ ته رايي . د بيلگې په توگه لکه cystitis ، او ادرار کنترول کولو نيمگړتيا اونور

د ناروغيو ډولونه:

✗ دمثاني ډبرې، تومور، سرطانې نسجونه، دمثاني التهاب (Cystitis)


✗ د ډيرو ميتيازو حاجت لرل، دميتيازو کولوستونځه اودرد Dysuria

✗ په حوصله يانې پيلويس Pelvis کې درد لرل

کوم شي ته بايد ډير پام وکړو:

✗ د مثاني عادي غټوالي: اوږدوالي د شپږونه تر لس سانتي متر، پلنوالي پينځه سانتي متر، پندوالي درې سانتي متر، د ديوال غشا پندوالي د دريو نه تر اتو ملي متره

مثانه په انسانانو او نورو مهره لرونکو حيواناتو کې يو خالي غړی دی چې د پښتورگو څخه ادرار ذخيره کوي. مثانه په فندس، بدن، سر او غاړه ویشل کيدی شي



په پورتنی شکل کې د مثاني کڅوړې عادي غټوالی کښل شوی دی. په نارینه وکې لږڅه آن تراوه سوه پنځوس ملي لیتر او په ښځینه وکې آن ترپینځه نیم سوه ملي لیتره میتیازې ذخیره کولای شي.

❏ د مثاني کڅوړه کې د التراساوند خپو انعکاس نه شته اوله دې کبله دالتراسوند عکس یې تورښکاري.

د مثاني کڅوړه (38) او د لیدلووړغري په لاندې ډول دي

☑ دنس عضلات (M. rectus abdominis 3)، نری کلمې (Smal intestine 46)، غټې کلمې (Colon 43)
دمیتیازوکڅوړه (Urinary bladder 38)، پروستات (Prostata 42) د مثاني کڅوړې په خټ برخه کې د التراساوند شدت ډیرښت (Dorsal Echo Enhancement 70)




Fig. 59.2 a



Fig. 59.2 b




Fig. 59.2 c




Fig. 59.3 a



Fig. 59.3 b





Fig. 59.3 c

۸۹- شکل : د مثاني کڅوړې (38) عادي جوړښت په التراساوند سکين کې ښوول شوی دی،

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

$$\text{Bladder Volume} = \text{Width} \times \text{Depth} \times \text{Height} \times 0.7^*$$



۹۰- شکل : دمثانی کڅوړې دحجم محاسبه دعرضي او طولی لید په مرسته کښل شوی دی . دمثانی حجم په واحد ملي مترمکعب مساوي دی : پلنوالی ضرب ژوروالی ضرب ارتفاع ضرب صفرعشاریه اووه



د مثانی نورمال موندنې
Bladder normal findings



د مثانی ډیورتیکولا
Bladder diverticula



bladder bleeding or Bladder clot



bladder tumor
د مثاني تومور

که چيرته ناروغ خپله د مثاني کڅوړه د متيازوڅخه تشه کړي او بيا وروسته د متيازو متباقي مقدار اندازه شي نوحته آن ترسل ملي ليتر 100 ml پورې لاهم فزيولوژيکي گڼل کيږي .



Bladder Sedimentation
په مثانه کې رسوب



Bladder Stone
د مثاني ډبره

دمثاني كخوري نورمال جوړښت Vesica urinaria	د ابحر شريان نورمال جوړښت Aorta

د مثنې سرطان د سرطان يو عام ډول دی چې د مثنې په حجرو کې پيل کيږي. مthane ستاسو په تيټ معدې کې يو خالي عضلاتي ارگان دی چې ادرار ذخيره کوي.

د مثنې سرطان اکثرا په حجرو (urothelial حجرو) کې پيل کيږي چې ستاسو د مثنې دننه کرښه لري. Urothelial حجري ستاسو په پښتورگو او تيوبونو (ureters) کې هم موندل کيږي چې پښتورگي له مثنې سره نښلوي. د يوروتيليل سرطان په پښتورگو او ureters کې هم پيښ کيدی شي ، مگر دا په مthane کې خورا عام دی.



پانکریاس (Pancreas)

پانکریاس په فقاريه حیواناتو کې د هاضمي سیستم اود اندروکړین endocrine سیستم یو اړین غړی دی. په انسانانو کې، دا د معدې په شا کې موقعیت لري او د غدې په توګه کار کوي.

پانکریاس یو مخلوط یا هیټروکړین غده ده، د بیلګې په توګه دا د اندروکړین او هاضمي خارجي فعالیت دواړه لري. د پانکریاس 99% خارجي او 1% د اندروکړین دنده په غاړه لري. د اندروکړین غدې په توګه، دا په عمده ډول د وینې د شکر کچه تنظیمولو لپاره کار کوي، د انسولین، ګلوکاګون، سوماتوستین او پانکراتیک پولیپتاید هورمونونه ترشح کوي.

پانکریاس یوه غده ده چې اوږدوالی یې د 15 څخه تر 20 سانتي متره پورې رسېږي. نوموړې غده د duodenum او spleen تر منځ موقعیت لري. پانکریاس یوه خارجي برخه لري چې د هاضمي لپاره انزایمونه په ډوډینم کې ترشح کوي، او د اندروکړین برخه چې هورمونونه ازادوي (د بیلګې په توګه، انسولین) چې د کاربوهایډریت carbohydrate میتابولیزم تنظیم کولو لپاره مهم دي.

دالتراسونوګرافي نه ترمخه ناروغ دوه ګیلاسه اوبه وڅښي، ترڅو په خټه کې دغازونومخنیوی وشي، او یا داچې د کوپړۍ په فشارور کولوسره غازیوې بلې خواته وښورول شي. ناروغ باید د معاینې څخه د 8 ساعتونو لپاره د خولې له لارې هیڅ شی ونه خوري. که چیرې مایع د ډیهایډریشن مخنیوي لپاره اړین وي، یوازې اوبه باید ورکړل شي. که نښې نښانې شدیدې وي، معاینه وکړئ. که چیرته د ماشومانو - کلینیکي حالت اجازه ورکوي - باید د ازمویني دمخه د 3 ساعتونو لپاره د خولې لخوا هیڅ شی ورنه کړل شي.


❖ دلویانولپاره پینځه میګا هرڅ 5MHz اود کوچنیانو لپاره دری نیم میګا هرڅ 3.5 MHz کوپړۍ وکارول شي.

دناروغیو ډولونه:

☒ سرطان (Carcinom)، سیست (Cyst)، د پانکریاس التهاب (Acute pancreatitis)

کوم شي ته باید ډیر پام وکړو:

✘ د پانکریاس عادي غټوالی: دتنې برخه تر اته لس ملي متره، د سر برخه دپینځه لسوڅخه تر دیرشوملی مترو، دلکۍ برخه دپینځه ویشتونه تر دیرشوملي مترو.



✘ دالتراساوندۍ څپو ته داسې انعکاس ورکوي لکه یڼه او جوړښت یې متجانس رنگ لري


د پانکریاس Echogenicity د عمر په زیاتیدو سره بدلیږي. په ځوانو او ډنگرو ناروغانو کې، د hypoechoic په څیردی (انځور Fig. 28.3b). په چاغو ناروغانو کې یا د عمر په ډیریدو سره، د پانکریاس نسجونه (brighter hyperechoic) اوروښانه شکل ځانته غوره کوي (انځور Fig. 30.1 a).

اناتومي:

په اناتوميکي لحاظ، پانکریاس په سر، غاړه، بدن او لکۍ ویشل شوی دی. پانکریاس د ډوډینم د داخلي انحنای څخه غزیدلی، چیرې چې سر یې د وینې دوه رگونه یانې سپریر میسنټریک شریان superior mesenteric او ورید په شاوخوا محاصره کوي. د پانکریاس تر ټولو اوږده برخه بدن دی چې د معدې شاته غځول شوی دی، او د پانکریاس لکۍ د طحال سره نږدې پای ته رسیږي.

د پانکریاس تر شا د وینې څو رگونه دي، په شمول د غټ شریان، splenic ورید، وسیاه رگ کلوي چپ، او همدارنګه د غوره mesenteric شریان پیل. د پانکریاس د بدن لاندې ځینې کوچنۍ کولمو کې موقعیت لري، په ځانګړې توګه د ډوډینم duodenum وروستۍ برخه او جیجنوم jejunum چې دا ورسره نښلوي، او همدارنګه د ډوډینم سوسپنسوري لیګامینټ

suspensory ligament of the duodenum چې د دې دواړو ترمنځ تيرېږي. د پانكرياس په مخ کې دغټې كولمې عرضي برخه موقعيت لري .



۹۱- شکل : د پانكرياس اناتومي جوړښت او شاوخوا غړي کښل شوي دي

د پانکريټيک تومور ترټولو عام ډول د پانکراتيک اډينوکارسينوما دی چې د پانکراس د ټولو سرطانونو نږدې ۹۰٪ جوړوي. اډينوکارسينوماس د پانکراس خارجي تومورونه دي ، کوم چې پدې معنی دي چې دوی د پانکراس په برخه کې پيل کېږي د هاضمي انزایمونو رامینځته کولو مسؤليت لري. د Exocrine adenocarcinomas مختلف فرعي ډولونه شتون لري ، چې تر ټولو عام يې د پانکراتيک ډيکټل اډينوکارسينوم (PDAC) دی.

د پانکريټيک تومور ډولونو دوهمه پراخه کټگوري د نيوروينډروکرين تومورونه دي (چې د "انډروکرين" يا "ايسليټ سيل تومور" په نوم هم پېژندل کېږي). [7][5] دا ډول تومورونه په پانکراس کې د هورمون توليدونکي حجرو څخه رامینځته کېږي او د ټولو پانکراتيک تومورونو يوازې ۱-۲٪ جوړوي. مأخذ :

<https://twitter.com/Medillustrates/status/1499445263009828864>



Fig. 30.1 a




Fig. 30.1 b



Fig. 30.2 a




Fig. 30.2 b



Fig. 30.3 a




Fig. 30.3 b



Fig. 30.4 a



Fig. 30.4 b





Fig. 30.4 c

٩٢- شكل : دپانكرىاس(33) عادى موندنې اوشاوخاوغروالتراساوندسكىن كنبل شوى دى


[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

pancreas (33); splenic vein (20) ; confluence of the portal vein (12).; Pancreatic tumors (54) ; Abdominal Aorta (15); Inferior Vena cava (16); Liver caudate Lob (9)



Transverse scan: the splenic vein, superior mesenteric artery and the body of the pancreas




Longitudinal scan: the inferior vena cava and the head of the pancreas

حاد پانکريتائيتس Acute Pancreatitis

د لومړۍ درجې حاد پانکريتائيتس په پيل کې پرته له کوم التراساوند عکس العمل سره پېښ کېدای شي. په هر صورت، پراخه التهاب د څرگند ډول hypoechoic ځانگړتيا سره مل وي، او پانکرياس (33) کيدای شي د شاوخوا نسجونوڅخه په سختۍ سره تشخيص کېدای شي. د يادولو وړ ده چې د پانکريتائيتس pancreatitis د تشخيص کولو په موخه د التراساوند کړنلاره لومړی انتخاب نه ده بلکې نورې کړنلارې لکه سي تي سکن اصلي لومړنی انتخاب گڼل کېږي.

دحاد پانکريتيتيس اړين لامل دادی چې د صفرا په کڅوړه کې د مینرالونو یوه تیرېه منځ ته راشي او په پایله کې د پانکریاس مشترک صفراوي نل بندوي .



Transverse scan: acute pancreatitis

۹۳- شکل : حاد پانکريتيتيس Acute Pancreatitis

له بلې خوا مزمن پانکريتيتيس Chronic pancreatitis داسې ځانگړتياوې لري چې د پانکریاس نسجونه غیرهمجنس ښکاري (Fig. 29.1) او په منځ کې يې ځينې ساحې nodular calcification په ډول پکې موجودې وي. بلخوا د پانکریاتيک لوله (75) pancreatic duct هم کيدی شي د غیر منظم luminal قطر ولري. د پانکریاس نورمل لولې قطر لږ څخه 1-2 mm ته رسيږي. دحاد پانکريتيتيس pancreatitis په حالت کې دنوموړي غړي بهرنۍ سرحد غیرمنظم شکل لري (Figs. 29.1 and 29.2). د پانکریاس په شاوخوا ساحه کې (Fig. 29.3) کيدی شي لمفاوي غوټې (lymph nodes) (55) شتون ولري چې د التهاب له کبله غټې شوې وي. دبيلگې په توگه لکه (1 1) portal vein منځ خواته لمفاوي غوټې غټې شوې دي.

gastric wall (46), 26, splenic vein (20)، د يادولو وړ ده چې په ډيری سره ټول پانکریاس التهاب نه کوي بلکې د پانکریاس يوه برخه التهاب کوي. همدا لامل دی چې د پانکریاس التهاب برخه د سرطان ناروغۍ سره تشخيص کول سخت تماميږي او په پایله کې کيدی شي د غلط تشخيص لامل وگرځي



Fig. 29.1 a



Fig. 29.2 a



Fig. 29.3 a




Fig. 29.1 b




Fig. 29.2 b




Fig. 29.3 b

۹۴- شکل : د پانکریاس (33) التهاب اوشاوخاوغري دالتراساوند په سکن کې ښوول شوي دي .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

❖ د لیدلو وړ غړي په لاندې ډول دي :

لمفاوي غوټې (55) lymph nodes ، pancreatic duct (75) ، portal vein (11) .

☑ ینه (Liver 9) ، معدده (stomach 26) ، پانکریاس (pancreas 33) ، (diaphragma 13) (Vena cava inferior 16) ، د ښې ورید رگ (Vena

portae 11) ، (Arteria hepatica 18) ، Confluence of the portal vein 12

☑ (Truncus coeliacus 53) ، fibrosis calcified 53 ؛ Pancreatic duct 75

superio mesenteric artery 17

(Aorta abdominalis 15) (Arteria lienalis 19) ، (Corpus vertebralis 35) ،

(acoustical shadow 45)

تشخیصیه التراساوندیاطلس

	Tumour	Acute pancreatitis, diffuse or local	Chronic pancreatitis	Aging normal pancreas
Echogenicity relative to the adjacent liver	Low	Low	High	High

Pancreas with lead structures


د پانکریاس غړی د اړینو جوړښتونو سره یوځای په لاندې شکلونو کې ښوول شوي دي



د پانکریاس سر د مجرای وایرسونژین سره
Head of pancreas with wirsungian duct





د پانکریاس سراویدن
Pancreas head and body



د پانکریاس دسر التهاب
pancreatic head pancreatitis




د پانکریاس بدن اولکې التهاب
Corpus / tail pancreatitis




Symptoms نښې نښانې :

په ناروغانو کې څرګندې نښې ژېړ يا د پوستکي او سترګو "ژېړوالی" دی. که څه هم دا يرقان په درسي کتابونو کې د بې درده په توګه تشرېح شوی، د پام وړ شمير ناروغان د يخۍ سربيره د درد سره شتون لري چې معمولاً د معدې په پورتنۍ برخه کې رامینځته کېږي او شا ته خپرېږي.]


اضافي ننبې نبنانې عبارت دي له د معدې درد، خواگرځي، کانگې، او عمومي خارش. ډیری وختونه، د پام وړ وزن کمول او د اشتها ضایع هم شتون لري



Extended Ductus wirsung



دنيورواندوکرين مختلفو حجرولرونکي تومورونه
Neuroendokriner Tumor



د پانکریاس نورمال بڼه
Pancreas



د پانکریاس سرطان
Pancreas tumor




Fig. 76a. Chronic pancreatitis with calcification.




Fig. 76c. Transverse scan: a large calculus in the pancreatic duct.

۹۵- شکل: دپانکریاس په نل کې دمینرالونویوه ټینګه کتله

د پانقراس تومور په پانقراس کې غیر معمولي وده ده. په لویانو کې، نږدې 90% د پانقراس سرطان لري او ځینې یې سلیم دي. د پانقراس تومورونه په ماشومانو کې نادر دي.

د تيرايډ غده (Glandula thyroidea)

تيرايډ غده، په شمزۍ لرونکو حیواناتو کې د اندروکراین endocrine غده ده. په انسانانو کې، دا په غاړه کې دی او دوه تړل شوي لوبونه لري. د لوبې لاندینی دوه پر دریمه برخه د نسج د یوه نري بند پواسطه وصل دی چې د استمس isthmus په نامه یادېږي. د تيرايډ غده درې هورمونونه تولید کوي، دوه د تيرايډ هورمونونه (triiodothyronine (T3 او تایروکسین (thyroxine (T4 - او یو پیپتایډ هورمون، کلسیتونین calcitonin. د تيرايډ غده د لویانو اود کوچنیانو لپاره اوه نیم 7.5 MHz میگا هرڅ کوپړی دالتهراساوند عکس لپاره کارول کېږي.

د ناروغیو ډولونه:

✉ سیست (Cyst)، سلیم غوټې، د تيرايډ غده پر سیدل (Struma diffusa)، د سرطان ناروغي.

د تيرايډ هورمونونو زیات تولید ته هایپر تيرايډیزم hyperthyroidism ویل کېږي

کوم شي ته باید ډیر پام وکړو:

دالتهراساوند په عکس کې د تيرايډ غده یو متجانس بڼه لري او د شترنوکلایدوماستوید عضلې په پرتله M.Sternocleidomastoid ډیره سپینه مالومېږي. حجم یې د بڼې لپاره پینځه لسوڅخه تر شل ملي لیتر او د نارینه و لپاره د شلونه تر پینځه ویشته پورې رسېږي.

اناتومي:

د تيرايډ غده اناتومي جوړښت په ۹۶- شکل کې کشل شوی دی. د ناروغ سردمعاینې په ترڅ کې لږڅه شاخواته زغول کېږي. ورپسې د تيرايډ غده په سیستماتیک ډول اوپرلېسې د ترانسډیوسر آلې په عرضي سطحې حرکت کولو سره د سرخواخه د پښوخواه craniocaudal direction (Fig. 101. la sagittal images). معاینه کېږي. په دویم گام کې د تيرايډ هر لوب زاگیتل عکسونه


اخیستل کېږي چې په Fig. 101.1b شکل کې شول شوی دی.

دالتهراساوند عکس منځ برخه کې د trachea صوتي سیوره (84) لیدل کېږي او څنګ خواته لږڅه په لیرې توګه، د کیروټید شریان (carotid artery) (82) او همدارنګه (jugular vein) (83) رګ د اناتومیک عرضي سطحې انځورونو لپاره اناتومیک نښې چمتو کوي. د تيرايډ (parenchyma) (81) دنوموړو رګونو اود trachea ترمنځ موقعیت لري.

د نورمال تایراید parenchyma د (89 sternohyoid) او (90 sternothyroid) عضلاتو په پرتله چې د هغې په مخ کې دي او د (85 sternocleidomastoid) عضلې په پرتله لږ څه ډیر هایپرکیک (روښانه) دی او په (Fig. 101.2) عکس کې لیدل کیږي .

د تایراید حجم اندازه کول

د تایراید غدې د حجم د معلومولو لپاره، د هر لوب اعظمي ترانسورس transverse او ساگیټل sagittal (انټروپوسټریر) قطرونه په عرضي سکن سطحه کې اندازه کیږي. نوموړي اندازه شوي قیمتونه د کرینیوکاډال اوږدوالی craniocaudal قیمتونو سره ضرب کیږي کوم چې په ساگیټل sagittal پرې شوې سطحه کې اندازه کیږي او حاصل ضرب یې بیا د 0.5 عدد سره ضرب کیږي. د ټولنټیجه د هر اړخي لوبې حجم سره مطابقت لري او (په mL اندازه کیږي ، نوموړې کرڼلاره د شاوخوا 10% غلطۍ سره مل ده. د دواړو لوبیو حجم باید په نارینه کې 25 mL څخه کوچنی او په میرمنو کې 18 mL څخه کوچنی وي



Anatomy of the thyroid region in the transverse plane

- | | |
|--------------------------------|--|
| (a) Vagus nerve | (81) Lateral lobes of thyroid |
| (b) Fibrous capsule of thyroid | (82) Common carotid artery |
| (c) Isthmus | (83) Internal jugular vein |
| (d) Platysma muscle | (84) Trachea |
| (e) Omohyoid muscle | (85) Sternocleidomastoid muscle |
| (1) Skin | (88) Scalenus anterior and scalenus medius muscles |
| (2) Subcutaneous fatty tissue | (89) Sternohyoid muscle |
| (34) Esophagus | (90) Sternothyroid muscle |
| (35) Spine | |

۹۶- شکل : د تایراید غدې اناتومي جوړښت کښل شوی دی .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




Fig. 101.1 a




Fig. 101.1 b




Fig. 101.1 c



Fig. 101.2 a




Fig. 101.2 b




Fig. 101.2 c

۹۷- شکل : دتایرایدغدی نورمال موندنی بنوول شوې دي . وچه مری (84) trachea ، دتایراید لوبونه (81)

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

نورمال تایراید موندنې
Normal thyroid findings

هایپرتایرویدیږم هغه حالت دی چې د تایراید غدې لخوا د تایراید هورمونونو د ډیر تولید له
[امله رامینځته کیږي. 3]




نورمال عرضي تايرايد موندني
thyroid transverse



نورمال عرضي تايرايد موندني
thyroid transverse



نورمال طولي تايرايد موندني
Thyroid longitudinal



نورمال طولي تايرايد موندني
Thyroid longitudinal

دتايرايد رنځپوهنې پېښې Thyroid: Pathologic Cases

Goiter

په هغو سيمو کې چې د ايودين خوراکي مواد تر ټولو لږ وي، د تايرايد تر ټولو عام اختلال د ايودين د کمښت له کبله يوډول ناروغۍ منځ ته راځي چې د گوټر goiter په نوم ياديږي، د بيلگې په توگه، د تايرايد غدې غټيدل

په نوموړي حالت کې د تايږايد د نورمال جوړښت سره په پرتله د تايږايد دواړه لوبونه غټ او پند کېږي ، ډيری وختونه isthmus استمس هم ورسره غټ کېږي. د آیوډين کمښت په مکرر ډول د گيتردننه د isoechoic nodules لامل کېږي. چيرته چې دوی په عين حال کې واقع کېږي، دوی کولی شي د تايږايد سطحې د پراخيدلو لامل شي (انځور 102.3)

د آیوډين په اوږدمهاله کمښت کې، د ريگريسيو کلسيفيکيشن (64 calcifications or cysts in Fig. 102.4) او يا سيستونه اکثرا په نوډولونو (54 nodules) کې وده کوي په يوه پرمختللی degeneration سره، دا anechoic cysts کولی شي د پام وړ اندازې (102.5 انځور) ته ورسېږي او کولی شي لکه په 102.6 انځور کې مرکزي هايپرايکويک هيمورج hyperechoic hemorrhages. منځ ته راولي .



Fig. 102.2




Fig. 102.4 a



Fig. 102.5




Fig. 102.3




Fig. 102.4 b




Fig. 102.6

۹۸- شکل : د تايږايد غدې گوټر goiter ناررغي د التراساوند په سکن کې ښوول شوې ده

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




Diffuse goiter
گویترومنتشر تایراید



Diffuse goiter
گویترومنتشر تایراید



Thyroid **adenoma**
د تایراید ادینوما




Thyroid **adenoma**
د تایراید ادینوما



Thyroid **nodes**
تایراید غوتی



Thyroid **nodes**
تایراید غوتی



Thyroid carcinoma
تایراید سرطان



Thyroid **sarcoma**
تایراید سارکوما



calcifications
د تایراید کلسیفیکاسیون ها





Calcified cyst
د تایراید کلسیفیه سیست

د Exophthalmos

د سترگو غټوالی دی چې رډې راوتلې بریښي او کټ مټ کیدای شي لکه د Graves ناروغۍ سره ورته تشخیص شي ،
Hyperthyroidism د د درملنې درې اصلي انتخابونه شتون لري: د رادیو آیوډین درملنه، درمل، او د تایراید جراحی.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

	
M. Basedow دجاغور التهاب یوډول ناروغي ده چې دزيات فعاليت له کبله منع ته راځي اونوموړې غده غټه کیږي	Hashimoto دجاغور التهاب یوډول ناروغي ده

د تایرایډ اصلي دنده د آیوډین لرونکي تایرایډ هورمونونو تولید دی چې د تایرایډ هورمونونو، کلسیټونین تولید دی. د تایرایډ هورمونونه د آیوډین او تایروسین څخه جوړ شوي دي. T3 ځکه نومول شوی چې دا په هر مالیکول کې د آیوډین درې اتومونه لري او T4 په هر مالیکول کې د آیوډین څلور اتومونه لري. د تایرایډ هورمونونه د انسان په بدن پراخه اغیزې لري. پدې کې شامل دي:

میتابولیک. د تایرایډ هورمونونه د basal میتابولیک کچه لوړوي او د بدن په ټولو نسجونو اغیزه لري.

نوموړي هورمونونه د زړه ضربان او قوت زیاتوي. دوی د تنفس، اخستلو او اکسیجن مصرف زیاتوي، او د مایتوکونډریا فعالیت زیاتوي. په ګډه، دا فکتورونه د وینې جریان او د بدن تودوخه زیاتوي

د تایرایډ هورمونونه د نورمال پرمختګ لپاره مهم دي. دوی د ځوانانو د ودې کچه لوړوي، او د پرمختلونکي دماغ حجړې د تایرایډ هورمونونو T3 او T4 لپاره لوی هدف دی. د تایرایډ هورمونونه د نازېږېدلي ماشوم د پرمختګ او د زېږون وروسته د ژوند په لومړیو څو کلونو کې د مغز په بشپړتیا کې په ځانګړې توګه مهم رول لوبوي.

پښتورگی (kidney)

پښتورگی دوه سور نسواري د لوبیا په شکل لرونکي ارګانونه دي چې په شمزی لرونکو حیواناتو کې موندل کیږي. دوی په ریتروپیریتونیل retroperitoneal فضا کې کین او ښي خوا ته موقعیت لري، او په بالغ انسانانو کې شاوخوا 12 سانتي متره اوږدوالی لري. دوی د رینال شریانونو renal arteries څخه وینه ترلاسه کوي؛ وینه د پښتورګو وریدونو ته ځي. هر پښتورگی د یوریتیر سره تړلی دی، یو تیوب چې مثانې ته خارج شوي ادرار لېږدوي. په بله وینا د پښتورګو او مثانې (پوکنۍ) تر منځ د متیازو نل (نلکۍ)


❧ د لویانو لپاره پینځه میګا هرڅ اود کوچنیانو لپاره دری نیم میګا هرڅ کوپړی وکارول شي. د عکس اخیستلو په ترڅ کې ناروغ ته وویل شي چې دلږمودې لپاره ژور تنفس وکړي او بیایې بند کړي.

کلیه، پوښتورگی د لویا په شان دوه اطراحیه غړي دي چې په عالیتر حیواناتو کې شتون لري او په بدن کې بیکاره او مضر مواد ادرار له لارې د بدن څخه خارج کوي. د کلیوی شریان رګونو څخه وینه پوښتورګو ته ورننوځي او هلته د زهرجنو او اضافي موادو څخه تصفیه کیږي او په پایله کې وینه د کلیوی وریدرګونوله لارې بیرته د پښتورګو څخه خارج کیږي. ګرده یګ جسم کتلوی بوده که از یګ قسمت داخلی و یګ قسمت خارجی ساخته شده است و به رګهای خون وصل است در داخل کلیه لوله هاورګهای زیادی بوده که مواد ادرار را از خون جمع نموده و توسط یګ لوله بزګتر یعنی ureter حالب به مثانه جهت ذخیره انتقال میدهد که انجا وقتاً فوقتاً لوله تخلیه میګردد. کلیه در حیوانات عالی ارتباط نزدیک ساختمانی بادستګاه تناسلی دارد nephron. نفرون واحد ساختاری و عملکردی کلیه است. هر کلیه انسان بالغ حدود ۱ میلیون نفرون دارد. کلیه در کنترل حجم مایعات مختلف بدن، اسمولایته مایعات، تعادل اسید و باز، غلظت های مختلف الکترولیت شرکت می کند. فیلتراسیون در ګلومرول رخ می دهد: یګ پنجم از حجم خون بدن که وارد کلیه ها می شود، فیلتر می شود. نمونه هایی از مواد که دوباره جذب می شوند، آب بدون املاح، سودیم بیکربونات، ګلوکز و امینواسیدهای هستند. نمونه هایی از مواد

ترشح شده عبارت از هایدروجن ، آمونیوم ، پتاسیم و اسید اوریک است . کلیه هورمون های رنین(برای تنظیم فشار خون و اریتروپویتین Erythropoietin برای تشکیل خون افزا میکند.

اناتومي :

د انسان د پښتورگو فعاله ماده، يا پارينچيما parenchyma په دوو لويو جوړښتونو ویشل شوې ده: خارجي د پښتورگو کورتیکس renal cortex او داخلي د پښتورگو میډولا renal medulla. په ټولیز ډول، دا جوړښتونه د اتو څخه تر 18 پورې د مخروط په شکل cone-shaped د پښتورگیز لابونو شکل لري، چې هر یو یې د پښتورگو کورتیکس لري چې د میډولا د یوې برخې په شاوخوا کې د پښتورگو هرم په نوم یادېږي. د پښتورگو هرمونو په مینځ کې د کورتیکس projections شتون لري چې د پښتورگو ستنې يا columns په نوم یادېږي. نیفرونونه Nephrons، د پښتورگو د ادرار تولیدي فعال جوړښتونه دي چې د کورتیکس او میډولا پراخوي. د نیفرون لومړنۍ فلترکونکې برخه د پښتورگو corpuscle ده چې په باندنۍ برخه cortex کې موقعیت لري.



۹۹- شکل : د ښي خوا پښتورگي اناتومي جوړښت کښل شوی دی

مأخذ :


[/https://www.psychyrembel.de/Niere/K0F7V/doc](https://www.psychyrembel.de/Niere/K0F7V/doc)

د ناروغيو ډولونه:

- ❑ داس نعل پښتورگي (Horseshoe kidney)
- ❑ د ډيروسيسټونه ډك پښتورگي
- ❑ د پښتورگي د پيدا يښت ځای نشتوالی (Renal agenesis)
- ❑ د پښتورگي ډبرې (Nephrolithiasis)، د وينې جريان نيمگړتيا، دميتيازوبنديدل
- ❑ د پښتورگي دندې نيمگړتيا (Renal failure)
- ❑ د پښتورگي التهاب (Pyelonephritis)
- ❑ د پښتورگي په جوړښت کې نيمگړتيا (Renal hypoplasia)
- ❑ د پښتورگي حجرو سرطان (Renal cell carcinoma)

کوم شي ته بايد ډير پام وکړو:

- ❑ د پښتورگي عادي غټوالی: اوږدوالی 100-115 cm، پلنوالی 50-70 cm، پڼډوالی د 30-50 cm څخه لږ وي. د پښتورگو وزن لږ څه 160 g دی



- ❑ د پښتورگي ځای ثابت نه دی او کيدای شي چې د بدن په بله برخه کې وي. د بېلکې په ډول د پلويس (Pelvis) برخې ته ليږدېدلې وي (Mobile kidney).
- ❑ د التراساوند انعکاس متجانس بڼه لري او دينې او طحال په پرتله لږ دی.
- بڼی خواپښتورگي په بڼه توگه د طولی سطحې په مټ د ځيگر له لارې هغه مهال ليدل کيدلای شي چې ناروغ پرمخ پروت وي او ژور تنفس وکړي.



Fig. 47.2 a



Fig. 47.2 b




Fig. 47.2 c




Fig. 47.3 a



Fig. 47.3 b




Fig. 47.3 c

۱۰۰- شکل : دپښتورگي نورمال موندنې دالتراساوند په عرضي او طولاني موقعيت کې ښوول شوې دي

د ليدلو ورځي په لاندې ډول دي :

- ☑ (Parenchyma ren dextra 29) ، (Apex renalis cranial 27) ، (renal medulla 30)
- (Pyelon, kidney pelvis 31) ، يڼه (Liver 9) ، غټې کلمې (Colon 43) ، (M.psoas 44) ،
- سږی (Lung 47)
- (Diaphragm 13)

Checklist of Normal Renal Values

Kidney length: 10 – 12 cm
 Kidney width: 4 – 6 cm
 Respiratory mobility: 3 – 7 cm
 Width of parenchyma: 1.3 – 2.5 cm


PP index, age < 30 years > 1.6 : 1
 PP index, age 30–60 years 1.2–1.6 : 1
 PP index, age > 60 years 1.1 : 1



دپښتورگي نورمال موندنې
kidney normal findings



دپښتورگي نورمال موندنې
renal parenchymal bridge



دپښتورگي معياري نورمال ډولونه
standard variants Malrotation



دپښتورگي څخه بهر لگن چې هلته متيازي
راتوليري
Extrarenal pelvis

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]



دپښتورگي سيستونه
renal cysts



سيستيك پښتورگي
cystic kidney



په حالب کې دډبرو په اساس دپښتورگي په
لگن کې متيازې ډنډشوې دي



دپښتورگي په لگن کې ډبرې
renal pelvis stones



دشكر ناروغى له كبله دپښتورگوناروغي
diabetic nephropathy-



دپښتورگونو د نسج گلوميرولي التهاب
Acute glomerulonephritis



د پښتورگو حجرو سرطان چې
د سرحد یا کنټور څخه اوږي
renal cell carcinoma




د پښتورگو حجرو سرطان
renal cell carcinoma




سليم فوق الكلوي غده
Benign adrenal gland




خبيث فوق الكلوي غده
Malignant adrenal gland




په پښتورگي کې د ډ برې پیژندنه
Nephrolithiasis



په پښتورگي کې د ډ برې پیژندنه
Nephrolithiasis




په پښتورگي کې سيستونه ښوول شوي دي
Kidney cysts




په پښتورگي کې داوبو ډنډ کيدل چې نسجونه بيخي
خراب کوي. دغه ډول پوښتورگي داوبو پښتورگي په
نامه ياديږي

Hydronephrose



په خپل ځان کې ننوتلې او کوچنې شوي پوښتورگي په
پوښتورگي کې لومړې د ناروغۍ له کبله هراړخيز بدلون
پيل کيږي، چې په پايله کې نيفرون دمنځه ځي او په
ځای يې مړه شوې نسجونه د پياوړ په ډول پاتې
کيږي. همدا لامل دی چې د پښتورگي حجم اونورمال
غټوالی کمښت مومي

Contracted kidney



پښتورگي داسې ناروغي لري چې ډبرې پکې منځ ته
راځي اوله دې کبله ورته د پښتورگو ډبرو ناروغي ويل
کيږي.

اوپا نوموړې ناروغۍ ته Nephrolithiasis

ويل کيږي Kidney stone disease

که يوه تيره تر 5 ملی مترو څخه زياته وده وکړي، دا
کولی شي د ureter د بنديدو لامل شي،

توری یا طحال (Spleen, Lien)

توری یوغړی دی چې تقریباً په ټولو فقاریه حیواناتو کې موندل کیږي. د لمفاوي غوټو په شان طحال هم په ابتدایي توګه د وینې فلتډ په توګه کار کوي توری یا طحال د وینې سره کرویات چې زاړه شوي وي لرې کوي او د وینې زیرمه ساتي ، کوم چې د هیمرجیک شاک hemorrhagic shock په حالت کې ارزښتناکه کیدي شي ، او د اوسپنې ریسایکل هم کوي. توری د ډایفراګم د چپې برخې لاندې دی، او یوه همواره ، محدب سطح لري چې د ډایفراګم سره مخ کیږي. دا د نهم، لسمې او یوولسمې پوښتیو لاندې دی. د طحال بل اړخ په دوو برخو ویشل شوی دی: د معدې مخکې برخه، او د پښتورګو وروسته برخه. د طحال سره څلور لیګامینټونه تړلي دي : د گیسټروسپلینیک لیګامینټ gastrosplenic ligament ، سپلینورینل لیګامینټ splenorenal ligament ، کولیکوسپلینیک لیګامینټ colicosplenic ligament ، او فرینوکلیک لیګامینټ phrenocolic ligament په صحي بالغو انسانانو کې د طحال اوږدوالی تقریباً له ۷ تر ۱۴ سانتي مترو پورې وي.


◀ **دلویانو لپاره پینځه میګا هرڅ اود کوچنیانو لپاره دری نیم میګا هرڅ کوپړی وکارول شي.**

د ناروغیو ډولونه:

- ⊗ د طحال غټوالی Splenomegaly ، هیم انګیوما Haemangioma کالسیفیکېشن Calcification ، سیست Cysts ؛ Splenic rupture
- ⊗ دځیټي خلکو په کینه پورتنی برخه کې درد حس کیږي.

کوم شي ته باید ډیر پام وکړو:

- ⊗ **د طحال نورمال غټوالی:** پلنوالی لږ څه اووه سانتي متره، پندوالی لږ څه پینځه سانتي متر. د سرخو اته اوږدوالی یوولس سانتي متر، قطر تر پینځه سانتي متر، په غاړه کې پندوالی لږ څه څلور سانتي متره.



❗ دالتهراساوند خپو ته لږانعکاس ورکوي اوله دې کبله يې جوړښت توربخون خومتجانس رنگ لري. دانعکاس کچه دينې په پرتله لږ، خو دپوښتورگي په پرتله ډيره ده.




Abb. 69.2 a



Abb. 69.2 b




Abb. 69.2 c


۱۰۱- شکل: طحال او دليدلووږغري په لاندې ډول دي

☑ طحال (37 spleen)، (20 V. lienalis)، (19 A. lienalis)، تريخی (33 pancreas)،
(13 Diaphragma)، غټې کلمې (43 Colon)، (45 acoustical shadow)

اناتومي:

د تايموس په خير، طحال هم يوازې د ليمفاتيك efferent رگونه لري. طحال د لمفاتيك سيستم يوه برخه ده، دواړه د معدې لنډې شريانونه او splenic شريان ورته وينه ورکوي.

طحال دوه مختلف نسجونه لري، سپينه پلپ (A) pulp او سور پلپ (B) red pulp. سپينه پلپ د معافیت او وینې حجرو په تولید او وده کې کار کوي. سور پلپ د انټیجنونو، مایکرو ارګانیزمونو، او د وینې ضعیف یا خراب شوي سر و حجرو د وینې فلټر کولو کې کار کوي.



۱۰۲- شکل : د طحال اناتومي جوړښت ښوول شوی دی
مأخذ :

[/https://www.psychyrembel.de/Milz/K0EAF/doc](https://www.psychyrembel.de/Milz/K0EAF/doc)



د طحال عادي جوړښت ، ناف طحالی با دم
پانکریاس

Splenic hilum with pancreatic tail



د طحال نورمال جوړښت اود نامه غوټې رگونه
Spleen with hilar vessels



دطحال سيست
Dysontogenetic spleen cyst



له تروماتيک څخه وروسته دطحال سيست
Post traumatic cyst



دينې اوتورې غټيدنه
hepatosplenomegaly



دځيگرسيروزله کبله دطحال غټيدل
Splenomegaly in liver cirrhosis

سيروسيس دينې يو ډول ناروغي ده چې دينې نورمال نسجونه په زخم يا پياوړي داغ نسجونو scar tissue په واسطه تعويض کيږي او له دې کبله تخريب کيږي او نورمال نسجونه خپله دنده نه شي ترسره کولای


هغه خلک چې شراب چيني دسيروسيس په ناروغي اخته کيږي همدارنگه هيپاتيتس بي Hepatitis B او هيپاتيتس سي هم لامل کيدلای شي




دطحال سليم تومور
Spleen benign tumor




دطحال خبيث تومور
Spleen Malignant tumor




په طحال کې سيست ليدل کيږي
Spleen cysts




دطحال نورمال جوړښت
Spleen, normal




په طحال کې کالسيفيکيشن
Spleen calcification




په طحال کې ميتاستاز
Spleen metastasis



په طحال کې دوينې راتوليدل (هيماتوم)
Spleen hematoma



په طحال کې دوينې راتوليدل (هيماتوم)
Spleen hematoma



په نارینه کې دطحال اوږدوالی لږڅه 8.6–13.4 cm پورې رسېږي. نوموړی غړی دديافراگم لاندې کيڼ خواته پروت دی او یوهمواره محدبه سطحه لري. طحال دښمې لسمې او یوولسمې پوښتې لاندې موقعیت لري. عمده دنده یې دسروکرویاتومیخانکي فیلترکول دي. د سپلین پراخیدل د سپلینومگالي په نوم یادېږي.

پروستات Prostate


پروستات د نارينه تناسلي سيستم غده ده. په لويانو کې، د چارمغز په اندازه وي، او په اوسط ډول شاوخوا 11 گرامه وزن لري، معمولاً د 7 او 16 گرامو ترمنځ وي. پروستات په لگن کې د ادرار د مثاني لاندې موقعيت لري او د ادرارنل شاوخوا راگرځي. د يوريترا urethra هغه برخه چې له هغې څخه تيريږي د پروستاتيک يوريترا prostatic urethra په نوم ياديږي چې د دوه انزال نلونو ejaculatory ducts سره يوځای کيږي. پروستات په يوه سطحه پوښل شوی چې د پروستاتيک کيپسول يا پروستاتيک فاشيا prostatic fascia په نوم ياديږي.

په اناتوميکي لحاظ، پروستات په بني، چپ او منځني لوبي ویشل کیدی شي: لوبس پروستاتي دیکسټر Lobus prostatae dexter، لوبس پروستاي سينيسټر Lobus prostatae sinister او استمس پروستاي (لوبس ميډيوس) Isthmus prostatae (Lobus medius) د پروستات اناتومي :

د پروستات قاعده د ادرار مثاني ته caudal پرته ده، د پروستات سرڅوکه د يوروجنيټل ډايفرام پورې تړلی دی. پروستات دمخ خوا څخه Symphysis اودڅټ له خوا څخه دمقعدپه واسطه محدوده شوې ده. پروستات په اناتوميکي لحاظ په بني پروستات لوب، کين پروستات لوب او د پروستات استمس Isthmus prostatae (ميډيل لوب) ویشل شوی دی. د پروستات دمخ څخه د انزال نلکې Ductus ejaculato-rii تيريږي، کوم چې د سيمينل کوليکولس Collicu-lus semina-lis ته ورننوځي.


د پروستات ناروغۍ عبارت دي له .:

د پروستات سليم غټوالی، حاد يا مزمن پروستات التهاب، د پروستات سرطان چې په ډيری سره د بهر خوا سطحې څخه پيل کيږي



۱۰۴ شکل : د پروستات اناتومي جوړښت کښل شوی دی
مأخذ :

[/https://www.pschyrembel.de/Prostata/K0HTK/doc](https://www.pschyrembel.de/Prostata/K0HTK/doc)




د پروستات نورمال موندنې
normal findings



د پروستیت غیر نورمل غټوالی یا هایپرپلازیا
hyperplasia


د پروستات سرطان په پروستات کې د حجرو غیرکنترول کوونکې وده ده د پروستات نسج غیر معمولي وده معمولا د سکرینینګ ازموینو له لارې کشف کیږي ، په ځانګړي توګه د وینې معاینات چې د پروستات ځانګړي انټیجن (PSA) کچه معاینه کوي. هغه کسان چې په وینه کې د PSA لوړه کچه لري د پروستات سرطان د پراختیا لپاره ډیر خطر لري. تشخیص د پروستات بایوپسي ته اړتیا لري.




ډیری پروستات تومورونه کوچني پاتې کیږي او هیڅ ډول روغتیا یی ستونزې نه رامینځته کوي. دا د فعالې څارنې سره اداره کیږي، د منظم ازموینې سره د تومور څارنه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دا وده نه ده کړې. هغه تومورونه چې ډیر احتمال یې خطرناک وي د وړانګو درملنې سره له مینځه وړل کیدی شي یا په جراحي ډول د راډیکال پروستاتېتومي لخوا لرې کیږي. هغه کسان چې سرطان یې د پروستات څخه بهر خپریږي د هورمون درملنې سره درملنه کیږي کوم چې د اندروجن (نارینه جنسي هورمونونو) کچه راټیټوي چې د پروستات حجرو ژوندي پاتې کیدو ته اړتیا لري. بیا، د تومور نمونې د دې په اساس درجه بندي کیږي چې د تومور نسج د نورمال پروستات نسج څخه څومره توپیر لري؛ هرڅومره چې تومور ډیر توپیر لري ، په هماغه اندازه د تومور وده امکان لري

د پروستات هایپرپلاسیا – Hyperplasia of prostate

نسج د نورمال څخه لوی دی ، حجم یې له 25 ملی لیتر څخه ډیر دی ، په هرصورت ، نوموړې غده په التراساوند کې همجنسه او ښه سرحد لري.



۱۰۵ شکل : د پروستات هايپرپلاسيا - په دې عرضي پروجيکشن کې موږ هايپرپلاستيک گورو. د پروستاتيک نسج د ادرار مثاني په خوا غټ بڼکاري



په پورتنی شکل کې دمثاني په کڅوړې دپاتې شوي ادرار ارتفاع، طول او عرض اندازه کولوکړنلاره ښوول ده په پایله کې دمثاني په کڅوړه کې دادرار باقي پاتې شوې برخه اندازه شوی ده چې قیمت یې لږڅه پینځه ویشتملي لیتر دی نوموړی قیمت ځکه اړین دی چې کله چیرته دپروستات غده غټه شي نوزیات حجم ادرار په مثانه کې پاتې کیږي

رحم Uterus

شاوخوا 7 سانتی متره اوږد، عضلاتي، د ناک په شکل، د مثاني او مقعد تر مینځ په انټراپیریتون in-traperitone-al ډول موقعیت لري، په کوم کې چې القاح شوي هګۍ حجرې د بلاستوسیسټ (نایدیشن) په توګه څړول کیږي، او جنین د پلاستیا او decidua له لارې تغذیه کیږي او وده کوي.

په انسان کې، د رحم لاندې برخه یوه تنګ برخه ده چې د isthmus په نوم پیژندل کیږي چې د cervix سره نښلوي او وروسته بیا محبل یا دښځې تناسلي الې سره نښلي. پورتنۍ برخه، د رحم بدن، د رحم د فیلوپین تیوب fallopian سره تړلی دی، او د فالوپین تیوبونو د خلاصیدو څخه پورته ګرده برخه د fundus ده.

القاح شوې هګۍ د فیلوپین تیوب fallopian په اوږدو کې رحم ته لیږدول کیږي. دا به د خپل سفر په جریان کې ویشل شوی وي چې یو بلاستوسیسټ blastocyst جوړ کړي چې ځان به د رحم په استر کې ځای په ځای کړي او هلته نښلي – اندومیتريوم endometrium، هغه ځای دی چېرې چې دا به غذايي مواد ترلاسه کړي او د امیدواری د مودې په درشل کې د جنین په ډول وده کوي.

د رحم التراساوند د یوې ځانګړې استوانه یې ډوله التراساوند خپروونکې آلې Transducer په مټ ترسره کیږي چې د transvaginal ultrasonography په نوم یادېږي. په نوموړې کړنلاره کې د التراساوند څپې د رحم دیوالونو څخه عرضي خواته هم تیریږي او په پایله کې دلګن خاصره په خالیګاه کې پراته غږي د لیدلو وړ ګرځي.

نسایي التراسونوګرافي Gynecologic ultrasonography


نسایي سونوګرافي په پراخه کچه کارول کیږي او ګټې یې په لاندې ډول دي.

- د حوصلې د غړو ارزونه، د حیض په موده کې درد
- دنسایي یا ښځینه تناسلي غړو لکه رحم uterus، تخمدان ovaries او نفیری تیوبونو fallopian tubes

التراساوند کړنلاره کې دنوموړو غړو غیر نارمل جوړښت لکه میوما myomas ، او mullerian malformations سره مل وي .

- د حاد اپینډیسایټس تشخیص لپاره
- دنسایي ستونزو تشخیص او اداره کول په شمول د Endometriosis ، leiomyoma ، adenomyosis ، د تخمدان سیستونه او آفاتونو تشخیص ،
- د اډنیکسال adnexal کتلې پیژندلو لپاره ، پشمول د رحم څخه بهر حاملګي ،
- د نسایي غړو سرطان تشخیص اونور
- دمهبیل خونریزي او یاده حیض نه شتون
- دغیر حاملګي په حالت کې د follicle څیړنه

د ښځینه تناسلي غړو لکه رحم (39) uterus ، تخمدان (91) ovaries ، مهبل (41) vagina ، او ریکتوم (43) rectum التراساوند تشخیصیه معاینه د ګېډې له لارې ترسره کیږي چې د ټرانس اېډومینل التراسونوګرافي transabdominal ultrasonography په نوم یادېږي او په (Fig. 77.1) شکل کې ښوول شوې ده . دنوموړې موخې لپاره د التراساوند څیړونکې آلې Transabdominal transducers کارول کیږي چې فریکونس یې لږ څه 3.5 MHz دی . دنوموړې آلې ګټه داده چې د التراساوند څپې په بدن کې ژور انتقال کیدلای شي اوله دې کبله هلته پراته غړي د لیدلو وړ ګرزي . خونیمګړتیا یې داده چې ځایزحل یې لږ دی .



۱۰۶ شکل : د ښځینه تناسلي غړي رحم uterus اناتومي جوړښت ښوول شوی دی

مأخذ : <https://alchetron.com/Arcuate-vessels-of-uterus>

د رحم بدن (corpus uteri) یو گنبد (fundus uteri) لري چې په دواړو خواوو کې د فیلوپین تیوب هاخوا تیریږي. دا د رحم غاړې مقابل کې (Cervix uteri) مخ خواته کوږشوی ante flexion دی .

سرېره پردې د رحم د بې شمیره اختلالاتو لکه B. uterine aplasia, uterus bicornis, uterus arcuatus، رحم د یو شمیر ناروغيو لخوا اغیزمن کیږي لکه: uterine prolapse، uterine polyps، د میاشتنی اختلالات menstrual disorders، د پستو نسجونو سلیم تومور Myom، endometrial سرطان، د ماشوم زیږون وروسته د رحم انتاني uterine prolapse



Fig. 77.1 a



Fig. 77.1 b




Fig. 77.1 c

۱۰۷ شکل : د بنځینه تناسلي غړو التراساوند سکین عملي کرنلاره کښل شوې ده .

د لیدلو وړ غړي په لاندې ډول دي :

Bladder (38) , Uterine Cervix (40), Uterus (39), Vagina (41), Acoustic shadowing (45) behind air, bone and calcium

مأخذ :

[With permission :


Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart, new york 2013]

د ترانزابډومينل transabdominal معاینې لپاره په عمومي توګه اړین ده چې د مټانې کڅوړه د مټيازوڅخه ډکه وي ترڅو د التراساوند کړکۍ په ډول ورڅخه ګټه پورته شي او په پایله کې دلګن خاصره غړې د تشخیص په تړاو ښه لید ترلاسه کړي . د ډکې مټانې درلودل ګټور دي ، داځکه چې التراساوند د مټانې مایع له لارې په لږ مقدار سره کمزوری کیږي اوله دې کبله درحم او تخمدان چې د مټانې شاته پراته دي ښه لیدل کیږي.

دمهبل له لارې د التراساوند کارول Endovaginal Ultrasound

په شکل کې درحم uterus ، تخمدان Ovary ، مهبل Vagina ، درحم غاړې Cervix | ناتومي جوړښت ښکلی شوی دی .

خوښځینه ډاکټر ترجیح ورکوي چې دمهبل له لارې Endovaginal د یوه ځانګړي ډول التراساوند خپروونکې آلې په مټ Endovaginal Transducer د ښځینه تناسلي غړو التراساوند کړنلاره ترسره کړي (Fig. 77.2) ، دنوموړې کړنلارې ګټه داده چې دالتراساوند آلې د ښځې تناسلي غړو ته نږدې موقعیت لري اوله دې کبله لوړ فریکونس 5-10 MHz التراساوند خپروونکې آلې کارول کیدلای شي . په پایله کې د غړو ځایزحل کچه خورا لوړه کیږي . بله ګټه یې داده چې دناروغ مټانې کڅوړه ضرورته ده چې د مټيازوڅخه ډکه وي .



Vaginal Ultrasound

۱۰۷ شکل : دځانگړې استوانه يې ډوله التراساوند خپروونکې آلې Transducer په مټ دمهبې له لارې درحم التراساوند عملي کړنلاره ښوول شوې ده . درحم اوشاوخواتناسلي غړواناتومي جوړښت کښل شوی دی

درحم ، تخمدان ، محبل ، مقعد دالتراساوند معاینې لپاره اړین ده چې کیسه مثانه ډکه وي ، داځکه چې دصوتې کړکۍ په توگه ورڅخه گټه پورته کیږي . دنوموړې موخې لپاره د نسايی ناروغیو متخصص ډاکټريوډول ځانگړي Transvaginal Transducer استعمال کوي چې خورالورځایزحل اولورفریکونس لري اوپه 77.2a شکل کې ښوول شوی دی . دنوموړي التراساوند آلې فریکونس 5-10 MHz څخه هم اوړي .




Fig. 77.2 a

۱۰۸ شکل : دالتراساوند Transvaginal Transducer آلې جوړښت کښل شوی دی . نوموړی کړنلاره دوختي حاملداري په تړاو ډیرمهم دی

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

بلخوا د Transvaginal Transducer آلي برترې داهم ده چې دمثاني کڅوړه ضرورنه ده چې ډکه وي .




Fig. 77.3 a



Fig. 77.3 b




Fig. 77.3 c

77.3a-c شکل : په نوموړي شکل کې 39 uteru ، صوتي سيوره 45 Acoustic shadows ، درحم سرخواساحه ياد غاړې ساحه 40 cervical region

کيسه مثانه 38 bladder ، رحم 40 cervix ليدل کيږي .

مأخذ :

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

درحم عادي موندنه Uterus normal findings

دمياشتنی دورې سره سم د Endometrium 78 پنډوالی تغيرکوي . دحيض څخه سمدلاسه وروسته يوازې يوه نرۍ مرکزي خوراډير التهراساوند انعکاس کوونکې hyperechoic کرښه ليدل کيږي Fig.78.1

دهگۍ اچولوپه موده کې Ovulation اندومتريم (78) endometrium دميومتريم (39) myometrium څخه د التهراساوند لورانعکاس سرحدپه واسطه بيل کيږي چې په (E in Fig. 78.2) شکل کې ښوول شوي دي . دهگۍ اچولوڅخه وروسته endometrium پرلپسې خپل مرکزي انعکاس دلاسه ورکوي Fig. 78.3 . ترڅوچې په لوړه کچه د التهراساوند انعکاس منځ ته راشي . درحم بدن (39) او درحم غاړه (40) cervix د التهراساوند څپوانعکاس په تړاودومره توپيرديوبل سره نه لري .

په بنځوکې دمینو پاوزمرحلې راتگ څخه دمخه premenopausal د اندومتریټ (78) دوه چنده ارتفاع د (Fig. 78.3). 15 mm څخه کوچنی وي . په پوست مینوپاوزال postmenopausal میرمنو کې ، نوموړې اندازه باید له 6 ملي میتر څخه کمه وي ، مگر دا چې ناروغ د هورمون بدلولو درملنې لاندې وي.

منعکس شوي صوتي څپې echo

☑ دالتراساوند ترانس دیوسر Transducer یوډول الکترونيکي آله ده چې برقي انرژي په صوتي انرژي اړوي او برعکس صوتي انرژي په برقي انرژي باندې اړوي



Fig. 78.1 a




Fig. 78.1 b



Fig. 78.2 a




Fig. 78.2 b



Fig. 78.3 a




Fig. 78.3 b

۱۰۹ شکل : درحم عادي موندنې التراساوند انځورونه کښل شوي دي . دمیاشتنی دورې سره سم د 78 Endometrium پنډوالی تغیرکوي

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

درحم تومورونه Uterus Tumors

دطبیعی یانورمال رحم ځانگړتیا داده چې hyperechoic serosa لري اوبلخوا متجانس hypoechoic myometrium (39) په درلودلوسره تشخیص کیږي .

د رحم تر ٲولو عام سلیم ٲومورونه عبارت له (54) Myomas څخه دي . هغوی د نرم عضلاتو څخه رامینځته کیږي او معمولاً د رحم په بدن کې شتون لري .
میوما Myomas همجنس یا متمرکز ډوله انعکاس echo نمونه بڼیې اودیوې هموارې سطحې په واسطه محدود شویدي . په هر صورت ، دوی کولی شي د اکوستیک سیوري یا مرکزي نیکروسز necroses سره کیلسیفیکیشنونه calcifications هم ولري .
که چیرته درحم myomectomy په پلان کې نیول شوی وي نوپه دې حالت که درحم بهرنۍ سطحې دلید څخه میوما په دریوبرخودرجه بندي کیږي . لکه (Fig. 79.1) transmural ، (Fig. 79.2) submucosal او (Fig. 79.3) subserosal .



Fig. 79.1 a




Fig. 79.1 b



Fig. 79.2 a




Fig. 79.2 b



Fig. 79.3 a




Fig. 79.3 b

۱۱۰ شکل : د رحم تر ٲولو سلیم ٲومور (54) Myomas بڼوول شوی دی .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




Fig. 146a. Longitudinal scan: a uterine myoma elevating the posterior wall of the bladder.

۱۱۱- شکل : درحم میوماتوموربنسول شوی دی چې دمثانې کڅوړې شادیوال تپله کوي
یاپورته کوي WHO




Fig. 146f. Longitudinal scan: a myoma distorting the posterior part of the uterine cervix.

۱۱۲- شکل : درحم میوماتوموربنسول شوی دی چې درحم غاړې خلفي برخه تخریب اوتحریف
کوي WHO

درحم دننه یوه غیرعادي شکله کتله کیدی شي چې درحم سرطان وي اوپه عادي توگه
hyperplastic او hypoechogenic نوموړی تومور سرطان دی .
خواص لري اوکیدى شي چې myometrium هم خپورشي .

کله چې تومور پرمختللی وي، کیدای شي نیکروسس necrosis منځ ته راښی او په پایله کې د پیچلي التراساوند نمونې لامل ګرځي .





Fig. 151b. Longitudinal scan: an extensive endometrial carcinoma enlarging and distorting the uterus.

۱۱۳- شکل : یو پراخه Endometrial کارسنوما چې درحم غټولو او تحریف کولولامل ګرځي .
WHO
دجنین بهرنۍ پرده yolk sac






Fig. 135b. Longitudinal scan of a normal uterus.

درحم نورمال موندني WHO



فیبروئید تومور
Calcified fibroid




فیبروئید تومور با احتباس ترشح
Fibroid with retention of secretion

تخمدان Ovarium

تخمدانونه د کیپسول په واسطه احاطه شوي، او یو بهرنی کورتیکس او یو داخلي مغز لري. کیپسول د کلک ارتباطي نسج څخه جوړ دی او د تونیکا البوگینیا په نوم یادېږي. په عادي توګه هګۍ اچونه، د دوو تخمدانونو څخه په یوه کې واقع کېږي چې په هره میاشتني دوره کې یوه هګۍ آزاده کېږي.

تخمدانونه د بنځينه جنسي غده په توگه گڼل كيږي . هر تخمدان سپين رنگ لري او د رحم د غاړې ديوال په اوږدو يوه سيمه كې موقعيت لري چې د تخمدان فوسا په نوم ياديږي. د تخمدان فوسا هغه سيمه ده چې د خارجي iliac شريان سره تړلی ده او درحم مخ خواته دداخلي iliac شريان سره تړل كيږي. دا ساحه شاوخوا 4 cm x 3 cm x 2 cm حجم لري تخمدان د بنځينه تناسلي سيستم يو غړی دی چې تخم ياهگۍ توليدوي. كله چې هگۍ خوشې شي، دا د فيلوپين ټيوب څخه رحم ته حركت كوي، چيرته چې دا د سپرم په واسطه القاح كيږي. تخمدان هم هورمونونه ترشح كوي چې د مياشتني دورې او زيږون په برخه كې اړين رول لوبوي. د تخمدان يو اړخ د فيلوپين ټيوب سره نږدې د انفنديولوپيلويك ليگامينټ په واسطه تړل شوی، او بل اړخ يې د رحم سره د تخمدان له ليگامنت په مټ تړل شوی دی.

كه چيرې هگۍ په تخمدان كې د follicle څخه په خلاصيدو كې پاتې راشي، كيداى شي د تخمدان سيست جوړ شي. د تخمدان كوچني سيستونه په سالم ميرمنو كې عام دي. د تخمدان د ناروغيو مختلف ډولونه شتون لري. د تخمدان ځينې ناروغۍ عبارت دي له: Endometriosis، د تخمدان سيستونه، د تخمدان د اپيتيل سرطان، د تخمدان د ميكروبي اوياوايروسي حجرو تومورونه، د تخمدان لږځيټ احتمالي تومورونه، او د پولی سيستيك تخمدان سندروم (PCOS).



۱۱۴ - شکل : درحم اوتخمدان اناتومي جوړښت کښل شوی دی

تخمدانونه (91) په craniolateral sagittal اناتومي سطحه (انځور 80.1) كې ليدل كيږي او معمولا د iliac رگونو په نږدې سيمه كې موقعيت لري (21 او 22). د تخمدان حجم اندازه كولو

لپاره، تخمدان په يوه transverse اتاتومي سطحه کې د ليدلو وړ ښکاره کوو او ورپسې کله چې د دريو قطرونو محصول يوځل بيا د 0.5 سره ضرب کړو نو د تخمدان حجم لپاره کافي اټکل وړاندې کوي. په لويانو کې، د تخمدان حجم له 5.5 څخه تر 10 سانتي مترو پورې رسيږي.

د تخمدان حجم د اميندواری له امله هيڅ نه اغيزمن کيږي، خو په post menopausal ميرمنو کې په دوامداره توگه له 3.5 څخه تر 2.5 سانتي مترو پورې کميږي.



Fig. 80.1 a



Fig. 80.2 a



Fig. 80.3 a




Fig. 80.1 b




Fig. 80.2 b




Fig. 80.3 b

۱۱۵ - شکل : د تخمدان نورمال التراساوند انځور او د حجم اندازه کولو کړنلاره ښوول شوې ده.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart, new york 2013]

Cycle Phases

د حيض دورې په لومړيو ورځو کې، ډيری (93 follicles) معمولاً د تخمدان دننه د 4-6 ملی متر anechoic cysts په توگه ليدل کيږي. د حيض دورې د 10مې ورځې په پيل کې (80.2 شکل)، يو غټ follicle چې شاوخوا 10 ملی متره قطر لري په بالغيدو پيل کوي. نوموړي فولیکل د (Graafian follicle) په نوم سره ياديږي.

د ovulation وروسته، د Graafian follicle وړک کيږي يا لږ تر لږه د پام وړ اندازه کيږي. په ورته وخت کې، Douglas په فضا کې ازاد مايع منځ ته راځي. انځور Fig. 80.4 a

د ruptured follicle په منځ کې درگونو تکثر ترسره کيږي او په پايله کې د يوه ډير جسم په توګه په corpus luteum باندې اوږي، کوم چې يوازې د څو ورځو لپاره د پخواني follicle په ځای کې د hyperechoic سيمې په توګه ليدل کيږي. که چيرته په رحم کې دهګۍ د زايګوت پروسه ترسره شي او دهګۍ ځای په ځای کيدنه اوتم کيدنه په زيلانځه کې د القاح وروسته د بېلابېلت په محال هغه پروسه چې پکې درحم د اندرومتریوم طبقه د دوو حيض دورو ترمنځ بيرته بياتر ميم کيږي، په بله وينا که چيرې په رحم کې امپلانتيشن ترسره شي، د corpus luteum همداسې د ليدلو وړ دی او کولی شي د اميندواری تر 14 اونۍ پورې د 64 corpus luteum cyst په توګه ښکاره شي (80.3 انځور).

د وخت څخه مخکې فولیکولر لوتينيزيشن follicular luteinization داسې پایلې لري چې د فولیکولر follicular غیرعادي وده منځ ته راځي او په پایله کې د پخې هګۍ ازاديدنه ovulation کړنلاره په تېره دريږي او د فولیکولر سيست رامینځته کيدو لامل کيږي.

د تخمدان التهاب ته oophoritis ويل کيږي. دا معمولا د فيلوپين ټيوبونو د التهاب سره يوځای پېښيږي او بيا د اډينکسيټس Adnexitis په نوم ياديږي. د وينې د رګونو بنديدل د تخمدان د رګونو ترومبوس لامل کيږي، چې په عمده توګه د زېږون وروسته دوره کې واقع کيږي. تخمدان کيدای شي د مختلفو تومورونو ځای وي. د تخمدان تومورونه په ښځو کې د ټولو تومورونو شاوخوا 15% جوړوي، چې شاوخوا څلورمه برخه يې خبيث تومورونه تشکيلوي. د بيلګې په توګه د تخمدان کارسینوما او دنرمو حجرو خبيث تومورونه دي. د تخمدان بڼه د التراساوند په انځورونو کې د يوې هګۍ په ډول ښکاري او درحم په پرتله لږ متجانس اولږ echogenicity خواص څرګندوي. د تخمدان څټ خواته په ډيری سره صوتي سيوره ليدل کيږي.

Ovaries: Cysts and Tumors

يو ساده سيست هموار نرم ديوالونه لري، داخلي echoes نلري، شاوخوا بڼه ديوال لري او تقريبا تل سليم وي

د تخمدان سيست چې قطر يې له 5 سانتي مترو څخه ډير وي د تومور سره په تړاو کې شکمن دی. په يوه خبيث ناروغي باندې هغه مهال بايد شکمن شو په ځانګړې توګه که چيرې د سيست په منځ کې سپټا septa and/or solid شتون ولري او همدارنګه زيات echoes () ولري او يا د ديوال ضخامت زيات شوی (انځور 81.1)

ورته ځانگړتياوې د ډرمايد سيستونو (Fig. 81.2) dermoid cysts کې موندل کيږي، کوم چې د يو اړخيز تخمدان تومورونو 15% جوړوي. د دوی داخلي echoes د سيبوم sebum، وينستو او نورو نسجونو برخو سره مطابقت لري. دوی معمولاً سليم وي او يوازې په ندرت سره خبيث کيږي.

دا موندنې بايد د hemorrhagic يا endometriotic cysts څخه توپير و شي، کوم چې يا د دوی په (81.3) lumens انځور کې

د مايع کچه (+) ولري او يا په بشپړه توگه د متجانس وينې څخه ډکې وي. (50 in Fig. 81.4)




Fig. 81.1



Fig. 81.2




Fig. 81.3

۱۱۶ - شکل : د تخمدان توپير ډوله سيستونه بنوول شوي دي

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




د تخمدان نورمال موندنه
Ovarium normal finding



د تخمدان سرطان
ovarian carcinoma

که څه هم د تخمدانو موقعیت تغیر کوي خو په ډیری سره درحم او کیشه مثانی شاته موقعیت لري .
تخمدانونه په عمومي توګه د adnexal فضا کی څنګ خواته موندل کیږي ،



WHO Fig. 142a. Longitudinal scan: normal left ovary د تخمدان نورمال موندنه

Ovarian follicles

د تخمدان ترشحي حفره یا فولیکونه د سیسټ په څیر anechogenic بڼکاري چی یا دننه په تخمدان کی اویا د تخمدان د سطحې شاوخوا برخه کی موندل کیږي
د بڼځی میاشتنی دورې مرحلې سره په تړاو کی د فولیکلونو سیسټ کیدای شي آن تردوه نیم سانتي متره پورې قطر ولري
تر 2.5 سانتي مترو پورې قطر. ساده فزیولوژیکي سیسټونه چې اندازه یې له 5 سانتي مترو څخه کم وي دوخت په تیریدوسره کوچنی کیږي اویا بیخي وړک کیږي نوموړی غړی هورمونونه افراز کوي چې د میاشتنی دورې په مرحلو اغیزه کوي. د بلوغت په وخت کې، بڼځې نږدې 200,000 څخه تر 300,000 follicles لري، چې هر یو د تخمدان لپاره د تخمدان په وخت کې د هګۍ حجرې (ovum) خوشې کولو توان لري. دا هګۍ په هره میاشتنی دوره کې یو ځل رامینځته کیږي چې شاوخوا 450-500 د یوې میړمنې د ژوند په هغه موده کې چې د اولاد پیداکولو وړتیا لري بڼځه تخم گذاري کوي.




Fig. 145a. Longitudinal scan: two follicular cysts within the ovary.

د تخمدان په منځ کې دوه فولیکلار سیستونه موندل شوي دي




Fig. 155a. Transverse scan: an ovarian cyst with smooth walls.




Fig. 155a. Transverse scan: an ovarian cyst with smooth walls.

په ښي خوا تخمدان کې یوه سیست پېژندل شوې ده

Pregnancy Testing

دالتراسونډ تکنالوژي دپيدايښت سره سم ددې هڅه شوې ده چې دجنين دتکامل پړاوونه دتشخيصیه التراسونډ په مرسته معاینه شي . داځکه چې دالتراساوند معاینې په کارولوسره کولای شوچې دمورپه نس کې دجنين نیمگرتیاوې ، ناروغۍ مخکې له زیږون څخه تنظیم اومديریت شي . د امینوتیک مایع amniotic fluid او پلاسنټا placenta ارزولو لپاره ، سونوگرافي د انتخاب ډیره غوره اوحساسه طریقه ده امونیتیک مایع او پلاسنټا باید د امیدواری دپېژندنې په موخه په هر التراساوند سکین کې معاینه شي .

د التراساوند سکین کولی شي درحم دننه لومړنۍ حاملگي تشخیص کړي ، کله چې د chorionic cavity شاوخوا 2-3 ملي میتر قطر ته رسیدلی وي . دا اندازه عموماً د حاملگي څخه 14 ورځې وروسته، یا د وروستۍ میاشتنۍ حیض څخه 4 اونۍ او 3 ورځې وروسته رسیږي.

د رحم د بدن (39) په 78 (Hyperchc Endometrium) کې ځای پر ځای شوی کوچنی chorionic cavity په ورځ کې د 1.1 ملي میتر په اندازه غټیږي ترڅو د حاملگي gestation sac (101) کڅوړه ورڅخه جوړه شي، په کوم کې چې جنین (95) وروسته تشخیص کیدلای شي. (انځور 82.2)

د جنین د زړه فعالیتونه د امیدواری د 6 اونیو په عمر کې gestation age پیل کیږي اود زړه ضربان په یوه دقیقه کې 80-90 اندازه کیږي .

Early pregnancy

ټول طبیعي امیدواری باید د 6 اونیو وروسته په رحم کې د ښه تعریف شوي "ډبل ایکوجینک حلقې" "double echogenic ring" په توګه د پیژندلو وړ وي. داخلي حلقه یونیفورم echogenicity حلقه ده او 2 mm یا ډیر ضخامت لري. شاوخوا یې یوه نازکه echogenic حلقه راتاوشوې ده، کوم چې د امیدواری ټوله کڅوړه نه محاصره کوي. د دوو حلقو په منځ کې د anechogenic پاتې uterine cavity شتون لري

د امیدواری کڅوړې موقعیت دښځې د حاملگي لومړی ثبوت دی. د حاملگۍ کڅوړه اکثراً په رحم کې د پنځو اونیو د amenorrhoea وروسته پیژندل کیدی شي . بل داچې کیدی شي په asymmetrically ډول موقعیت ولري (165 انځور). WHO




Fig. 165. The gestational sac at 5-6 weeks. The centre is hypoechogenic, surrounded by a double echogenic ring. The inner ring is complete and is the gestational sac. The outer ring is incomplete and is the lining of the uterus. These two rings are separated by the anechogenic space of the residual endometrial (uterine) cavity.

انځور 165. د اميدوارۍ کڅوړه د حاملگۍ د 5-6 اونيو په درشل کې ښوول شوې ده او مرکز يې hypoechogenic دی چې د دوه گوني echogenic حلقې لخوا محاصره شوی. داخلي حلقه بشپړه ده او د اميدوارۍ کڅوړه ده. بهرنۍ حلقه نيمگړې ده او د رحم د غاړې استر دی. دا دواړه حلقې د رحم endometrial حفرې anechogenic په واسطه جلا شوي. WHO د 5-6 اونيو په ترڅ کې، د اميدوارۍ کڅوړې ترټولو لوی قطر نږدې 1-2 سانتي متره دی. په 8 اونيو کې د حاملگۍ کڅوړه بايد د رحم نيمایي برخه ونيسي؛ په 9 اونيو کې بايد د حاملگۍ کڅوړه د رحم دوه پر دريمه برخه ونيسي، او په 10 اونيو کې بايد رحم بيخي ډک کړي.

د اميدوارۍ عمر د د يوې اونۍ په ترڅ د کڅوړې د اوسط بعد څخه اټکل کیدی شي. د longitudinal scan سکين په کارولو سره، د کڅوړې اعظمي ابعاد په اوږد محور (اوږدوالي) په اوږدو کې اندازه کړئ، او د دې سره سم د 90 درجې څخه دمخ خواڅخه څټ خواته antero-posterior (AP) ابعاد اندازه کړئ (انځور 166، پورتنۍ سکين). د اوږدوالي سکين سطحې longitudinal scan plane سره په تړاو کې دنوي درجې زاويې 90 له ديد څخه يو عرضي سکين transverse scan ترسره کړئ او د کڅوړې ترټولو لوی پلنوالی اندازه کړئ (انځور 166، لاندنی سکين). د کڅوړې منځنۍ ابعاد د دې دريو اندازه شوو کميتونو مجموعه ده چې په 3 ویشل شوي.

$$\text{Mean gestational sac dimension} = \frac{\text{Length} + \text{AP} + \text{Width}}{3}$$

پنځه یا شپږ اونی د امیدواری ترټولو لومړنۍ نېټه ده چې د التراساوند په مرسته د ښځې حاملګي پیژندل کیدی شي.





Fig. 166. Measurement of the gestational sac. The length is the longest internal dimension in the longitudinal plane (upper). The antero-posterior measurement is the widest part of the sac at right angles to the length (upper). The width is the widest part in a transverse scan (lower).

۱۱۸- شکل : د حاملګي کڅوړې gestational sac درې بعده اندازه کولو کړنلاره کښل شوې

ده



۱۱۹- شکل : د امیندواری کڅوړه gestational sac، د ژیر کڅوړه yolk sac او جنین embryo (د + نښو ترمینځ فاصله د 3 ملي میټر اندازه شوې ده)

• د 18-22 اونۍ الٲراساوند سکین کې څه مهم دي؟

د امیدواری د 18-22 اونۍ په جریان کې الٲراساوند سکین ترټولو غوره وخت دی:

1. د امیدواری عمر په سمه توګه تنظیم کړئ؛
2. د څو امیدواری تشخیص کول؛
3. د جنین غیرعادي حالت تشخیص کول؛
4. پلاسنټا معلوم کړئ او هغه ناروغان وپیژنئ چې په کوم کې یې چې د پلاسنټا پراویا ؛خطر شتون لري
5. myomas یا کوم بل غیر نورمل جوړښتونه تشخیص کړئ

• د 32-36 اونۍ الٲراساوند سکین کې څه مهم دي؟

دا د امیدواری په درشل کې ترټولو غوره وخت دی:

1. د رحم دننه برخې د ودې دځنډ اوځنډ پیژندل؛
2. د جنین اختلالات پیژندنه چې په لومړي سکین کې ندي موندل شوي؛
3. د جنین پرېزنتیشن او موقعیت تایید کړئ؛
4. پلاسنټا په سمه توګه معلوم کړئ؛
5. د amniotic مايع اندازه ارزول؛
6. ممکنه اختلاطاتو تشخیص، د بیلګې په توګه مایوما myoma، د تخمدان تومور.

The embryo

که څه هم د امیدواری کڅوړه په ځینو کې په 5 اونيو کې پیژندل کیدی شي او په 6 اونيو کې په اکثریت میړمنو کې تشخیص کیدی شي، خو جنین د امیدواری تر اتمې اونۍ پورې لاهم نه لیدل کیږي (انځور a169). که چیرته د امیدواری په کڅوړه کې جنین ژوندی وي، نوزږه به یې وپیژندل شي چې د جنین په مینځ کې پروت دی، معمولا داسې ښکاري چې د سینې پاتې برخې ته مخکې پروت وي.




Fig. 169a. A normal 9-week pregnancy, with thick, echogenic decidual reaction around the sac.

۱۲۰- شکل : د 9 اونيو یو طبیعي امیدواری، او د کڅوړې په شاوخوا کې ډیر پنډ، echogenic غبرگون لیدل کیږي.

دامیدواری نهمې یا لسمې اونۍ وروسته، د جنین سر د پاتې بدن څخه توپیر کیدی شي او د بدن حرکتونه لیدل کیدی شي. په 10 اونيو کې جنین ډیر انسان ته په ظاهري بڼه ورته معلومیږي (انځور 169b Fig. د دولسمې هفتې څخه وروسته د جنین کوپړۍ ښکاره کیږي).




Fig. 169b. A normal 12-week pregnancy. The crown-rump length (CRL) and biparietal diameter (BPD) are shown (see pp. 236–237).

۱۲۱- شکل : د ۱۲ اونۍ عادي حمل اوهمدارنگه د تاج - ریمپ اوږدوالی (CRL) او د سردواروخنګ خواتوتو اړخیز قطر (BPD) بنودل شوي



Fig. 82.1 a




Fig. 82.2 a



Fig. 82.3 a




Fig. 82.1 b




Fig. 82.2 b




Fig. 82.3 b

۱۲۲- شکل : د التراساوند سکین په مرسته کولای شو چې درحم دننه لومړنۍ حاملګي تشخیص کړو . د حاملګي (101 gestation sac) په کڅوړه کې د جنین (95) شتون تشخیص شوی دی .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

که چیرې یو جنین په chorionic cavity کې د توقع په وخت کې ونه پیژندل شي، لومړی ګام د امیدواری، عمر تصدیق او امتحان کول دي. که چیرې تعقیبي معاینه اوڅیرنه د chorionic cavity وده اوانکشاف دتوقع برخلاف وي یعنې اندازه یې دتوقع څخه لږوي ، نویو نیمګړی القاح شوې هګۍ شتون لري، چې د ټولو حملونو شاوخوا 5٪ کې واقع کیږي.

Ectopic Pregnancy

امیدواری د القاح شوي هګۍ سره پیل کیږي. په نورمال ډول، القاح شوې هګۍ د رحم د استر سره نښلي. اکتوپیک حمل هغه وخت پیښیږي کله چې القاح شوې هګۍ د رحم له اصلي غار څخه بهر وده وکړي.

که چیرته حاملګی درحم څخه بهر خواته لکه په fallopian tube کې ترسره شی او په ectopic pregnancy (Fig. 82.3) اکتوپیک حمل کې د امیدواری کڅوړه (101) د رحم څخه بهر وي (39). څرنگه چې نوموړی حالت خطرناکې پایلې لری نو باید دحل هرډول لارې چارې دلته ورنکړل شی




Fig. 164a. Transverse scan of an ectopic pregnancy, showing a small embryo. Movement of the embryo's heart could be seen.


۱۲۳- شکل : اکتوپیک حمل ښوول شوی دی چې جنین د رحم له اصلي غار څخه بهر موقعیت لری او هلته وده کوي.

Placenta Position and Gender Determination

د پلاسينټا Placenta نورمال موقعيت د فندس سره نږدې د مخکينۍ يا خټ خواته د رحم ديوال سره دی . په شاوخوا 20% قضيو کې، پلاسينټا (94) به يو يا څو يونيلوکولر unilocular او يا ملټيلوکولر multilocular سيستونه يا لاکونا lacunae (64) ښکاره کوي، کوم چې معمولاً هيڅ اغيزمنه دنده نلري (انځور 83.1).

داميدواری، دوهمې درې مياشتنۍ مودې اخيرڅخه second trimester ترمخه د پلاسينټا دقيق موقعيت په ډاډ سره نشي ټاکل کیدی. fig. 83.2 •

د پلاسينټا درې ډوله توپير لرونکي قبلي پلاسينټا placenta previa شتون لري : بشپړ پلاسينټا پريويا total placenta previa ، چې په بشپړه توگه د رحم غاړې داخلي OS پوښي (40)؛ جزوی پلاسينټا پريويا partial placenta previa ، کوم چې يوه برخه د داخلي OS پوښي (83.2 انځور)؛ او حاشيه يی پلاسينټا marginal placenta previa انځور Fig. 83.2 b ، کوم چې په داخلي OS باندې نفوذ کوي.



۱۲۵- شکل : حيض دوره د هورمون په توليد کې د طبيعي بدلونونو لړۍ ده او د ښځينه تناسلي سيستم د رحم او تخمدان جوړښت چې اميدواری ممکنه کوي.



Fig. 83.1 a



Fig. 83.2 a




Fig. 83.1 b




Fig. 83.2 b

١٢٤- شكل : د پلاسينتا توپيرلرونكي قبلي پلاسينتا placenta previa التراساوند انځورونه كښل شوي دي.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Multiple Pregnancy

په خوځلیزه امیدواری کې، دا باید معلومه شي چې ایا د امیدواری کڅوړې gestational sacs (95 یو پلاستیا شریکوي یا د جلا پلاستیا لخوا چمتو کېږي) (• په 83.4 انځور کې). مور او پلار (او د زیږون ډاکټر) خوښوي چې پوه شي چې ایا د جوړه اولادونو تمه وکړي (83.3 انځور) یا حتی درې ګونی اولادونو تمه وکړي (83.4 انځور).



Fig. 83.3



Fig. 83.4

د څېړنې ماشومان التراساوند

د درې ګونو ماشومانو التراساوند

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Biometry in the First Trimester

د بايومټريک پرامیټرو په مرسته، التراساوند کېنلاره کولی شي د امیدواری د ودې په لومړیو کې خطرونه ښکاره کړي او د جنین نیمګړتیاوې تشخیص کړي.

د امیدواری عمر معمولاً د میرمنې د وروستۍ میاشتې دورې د نیټې لخوا ټاکل کېږي، او داسې انګیرل کېږي چې تخم ګزاري د میاشتې دورې په څوارلسمه ورځ پېښ شویدی.

Chorionic Cavity Diameter (CCD)

د امیدواری کڅوړه د مایع څخه ډکه فضا ده چې په منځ کې یې جنین لمبیږی او شتون لري . د جنین په لومړیو وختونو کې دا د extraembryonic coelom څخه جوړه ده، چې د Chorionic Cavity په نوم هم یادېږي. د امیدواری کڅوړه معمولاً د رحم په دننه کې شتون لري. دا یوازینی موجود جوړښت دی چې د دې معلومولو لپاره کارول کیدی شي چې ایا د رحم دننه حمل شتون لري تر هغه چې جنین وپېژندل شي.

ابتدایي کورونیک حفره (anechoic chorionic cavity) (101) د لاندې خوا څخه او همدارنګه د پورته خوا څخه د 78 in Fig. 84.1 په واسطه احاطه شوی دی او د حمل څخه 14 ورځې وروسته په التراساوند کې لیدل کیږي.



Fig. 84.1 a




Fig. 84.1 b




Fig. 84.1 c

۱۲۶- شکل : کین خواته دامیدواری anechoic ابتدایي کڅوړه د (101) chorionic cavity بنسول شوې ده چې ابعاد یې د التراساوندیاڅوړه مرسته اندازه کیږي . بنی خواته دنوموړې کڅوړې طول په واحد ملي متر په تابع دامیدواری اونۍ GW کښل شوي دي .

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Yolk Sac Diameter (YSD)

د زیرې کڅوړې قطر (YSD) : زیره کڅوړه په بله وینا د نامه غوټه umbilical sac یو حلقوی شکله hyperechoic جوړښت دی چې مرکزي anechoic خواص لري او د امیدواری په 10 اونۍ کې شاوخوا 5 ملي میترو ته لوړیږي. که چیرته د زیرې کڅوړې yolk sac قطر د 3 ملي متر څخه کم یا له 7 ملي متر څخه پورته وي د ماشوم د غیرنورمل ودې د زیاتوالي خطر په ګوته کوي. زیرې کڅوړې ته د نامه غوټې کڅوړه umbilical sac هم ویل کیږي. انځور 84.2 د نخاع تر څنګ (35) زیره کڅوړه (102) رابښي چې د 7 اونیو او 6 ورځو امیدواری عمر لرو نګي جنین څخه اخیستل شوی دی. امیدواری عمرته د جنین عمر هم ویل کیږي



Fig. 84.2 a




Fig. 84.2 b




Fig. 84.2 c

۱۲۷- شکل : شی خواته د زیرې کڅوړې yolk sac قطر اندازه په واحد ملي متر په تابع د حاملګې اونۍ GW اوکین خواته د 7 اونیو او 6 ورځو امیدواری عمر لرونکي جنین التراساوند انځور رابښي.

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart, new york 2013]

زیره کڅوړه د جنین بهرنۍ پرده ده چې د څلورمې اونۍ په پای کې دیوه ناک په شان وده مومي . د شاوخوا 7 اونیو څخه وروسته دا معمولا ممکنه ده چې یو ګردی سیستیک جوړښت وګورئ چې لږ څه 4-5 ملي متر قطر لري او د جنین سره نږدې موقعیت لري . دا همغه زیره کڅوړه ده چې هلته د وینې د لومړنیو حجرو د جوړیدو ځای تشکیلوي . زیره کڅوړه د یوولسمې اونۍ څخه وروسته ورکیږي . زیره کڅوړه ممکن په ټولو امیدواری میندو کې ونه لیدل شي حتی کله چې شخې نورمال هم وي.




Fig. 170. A normal yolk sac with a surrounding echogenic decidual reaction.

۱۲۸- شکل : طبیعی زیره کڅوړه اود حاملگی کڅوړه دالتراساوند په انځور کې لیدل کیږي .
د زیرې کڅوړې په شاوخوا کې سپین رنگه انعکاسی echogenic غبرگون منع ته راغلی دی

Crown-Rump Length (CRL)

ځینې وختونه یوه ښځه ممکن د خپلې وروستۍ میاشتې دورې د نیتې په اړه باوري نه وي، یا ممکن د دې دلیل شتون ولري چې شکمن تخمدان د هغې د دورې د څوارلسمې ورځې څخه دمخه یا وروسته پیښ شوی وي. د التراساوند سکینونه د امیدواری عمر اټکل کولو بدیل میتود وړاندې کوي. د جنین عمر ټاکلو لپاره ترټولو دقیق اندازه د سرتاج یا د سردڅوکې څخه ترکوناتي پورې طول CRL دی.

یو باثباته جنین چې د سردڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې 5 ملي متره اوږدوالی لري د 6 اونیو او 3 ورځو امیدواری عمر په پیل کې د لیدلو وړ دی. په دې وخت کې، د امیدواری کڅوړه د 15 ملي مترو څخه آن تر 18 mm پورې اندازه کیږي.

یوځل چې یو ښکاره جنین (95) د لیدلو وړ وي، د سردڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې داوږدوالي اندازه کولوپه عوض یو بل کمیت باید اندازه شي ترڅو د امیدواری عمر دقیق وټاکل شي. د بیلګې په توګه لکه chorionic cavity قطر اندازه کول تر ټولو معیاري کمیت تشکیلوي داځکه چې نوموړی کمیت د امیدواری عمر دقیق اود اعتبار وړ ټاکل (په څو ورځو کې) آن د امیدواری تر 12 اونۍ پورې اجازه ورکوي (انځور 84.3 Fig.).

د امیدواری د 12 اونۍ څخه وروسته د سر جمجمې دو اړوتو قطر د امیدواری عمر ټاکلوپه تړاو تر ټولو دقیق ترین کمیت دی



Fig. 84.3 a




Fig. 84.3 b




Fig. 84.3 c

۱۲۹- شکل : دجنين عمر دټاکلو په موخه دالتراساوند په انځور کې دجنين دسرڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې اوږدوالي اندازه کيږي ، د بنۍ خوا دياگرام په عمودي محور کې کې دجنين دسرڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې اوږدوالي په واحد ملي متر او په افقي محور کې داميدواری اونۍ GW کښل شوې ده . دپېلگې په توگه که چېرته دجنين دسرڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې اوږدوالي لس ملي متر اندازه شي نو دجنين اميدواری عمر لږ څه اوه اونۍ اټکل کيږي . په نوموړي دياگرام کې منځنۍ منحنۍ متوسط قيمت رانښيي اولاندې باندې منحنۍ گان غير دقيقوالی په بله وينا دغلطي سرحدونه رانښيي

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]




Fig. 179. Up to 11 weeks (left) measure the crown-rump length; after 11 weeks (right) measure the biparietal diameter.

۱۳۰- شکل : کين خوا دجنين دسرڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې اوږدوالي اندازه کيږي اوبنۍ خواته د جنين عمر د biparietal قطر په اندازه کولوسره اټکل کيدی شي

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Biometry in the Second and Third Trimesters

دامیدواری په دوهمه او دریمه درې میاشتني موده کې د جنین بایومیتري کمیتونه

- په دویمه درې میاشتني امیدواری موده کې second trimester ، یو معیاري التراساوند ازموینه معمولاً په لاندې ډول ترسره کیږي :
- د جنین شمیره، په شمول د امونیک ساکونو شمیر amnionic sacs او د څو امیدواری لپاره د کوریونیک کڅوړې chorionic sacs شمیر
- د جنین د زړه فعالیت
- د رحم او رحم په تړاو د جنین موقعیت
- د پلاسینټا placenta موقعیت او بڼه، د امکان په صورت کې د umbilical cord موقعیت
- د امونیک Amnionic مایع حجم
- د امیدواری عمر ارزونه
- د جنین وزن اټکل
- د جنین اناتوميکي سروې
- د مور د رحم، نلونو، تخمدانونو او شاوخوا جوړښتونو ارزونه کله چې مناسب وي

Biparietal Skull Diameter (BPD)

دامیدواری دوولسمې اونۍ په شروع کې د جنین عمر د ټاکلو په موخه د جنین د سر څوکي څخه تر کوناتي (CRL) پورې اوږدوالي اندازه کولو په پرتله یوه بله کړنلاره هم شته او هغه د سر مجموعي دو اړو څنګ خواتو او اندازه کول تر ټولو دقیق تره او اسانه عملي کړنلاره ده.

د امیندواری له 13 اونيو وروسته، د جنین عمر د biparietal قطر په کارولو سره اټکل کیدی شي (د سر عرضي قطر، د دوو پاریتال هډوکو په اوږدو کې)، د سر محیط، د فیمر femur اوږدوالی، د سرتاج څخه ترپونډې پورې اوږدوالی (head to heel) او د جنین نورپارامترونه parameters ارقامونه.

$$GA_{weeks} = CRL^{0.2313} \cdot e^{1.4653 + 0.001737 \cdot CRL}$$

Crown-rump length (CRL) in relation to gestational age^[2]

CRL (mm)	Gestational age (weeks + days)		
	5th centile	Median	95th centile
5	5 + 6	6 + 2	6 + 6
10	7 + 0	7 + 4	8 + 1
15	7 + 5	8 + 2	9 + 0
20	8 + 2	9 + 0	9 + 5
25	8 + 6	9 + 4	10 + 2
30	9 + 2	10 + 0	10 + 6
35	9 + 5	10 + 3	11 + 2
40	10 + 1	10 + 6	11 + 5
45	10 + 3	11 + 2	12 + 1
50	10 + 6	11 + 5	12 + 4
55	11 + 1	12 + 0	13 + 0
60	11 + 3	12 + 3	13 + 3
65	11 + 6	12 + 5	13 + 5
70	12 + 1	13 + 0	14 + 0

۳- جدول : د جدول پورته خواته یو ریاضي فرمول لیکل شوی دی چې دهغې له مخې د جنین د سرڅوکې څخه ترکوناتي (CRL) پورې اوږدوالي اندازه په واحد ملي متر اچول کېږي او په پایله کې د جنین دامیندواری عمر GA_{weeks} په واحدونې ټاکل کېږي .

شبکه مشیمیه (104) choroid plexus د دوه اړخیز hyperechoic جوړښت په توګه ښکاري. د کره او د تکرار وړ مقادیرو د ترلاسه کولو لپاره ، د دوه اړخیزو مجموعو قطر باید تل روی بیضی پیوسته مجموعه (105) در همان سطح مرجع اندازه گیری شود (شکل 85.1). دا مهمه ده چې د falx cerebri (106) د echoes منځني کرښې په اوږدو کې یوه عمودي کرښه اندازه شي ، کوم چې د septum lucidum حفرې لخوا د هغې په دریمه برخه کې قطع شي. د عکس اخیستنې سطح کې باید cerebellum او یا سترګې شامل نه وي ځکه چې پدې کچه اندازه کول خورا لرې caudal خواته دی . د سر ګرد چاپیره او fronto-occipital قطر په ورته سطحه کې اندازه کیدی شي.



Fig. 85.1 a




Fig. 85.1 b




Fig. 85.1 c

۱۳۳- شکل : د جنین عمر دسر biparietal قطر اود سرکوپری محیط په اندازه کولو سره اټکل کیدی شي

[With permission :
Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

د فیمور اوږدوالی (FL) Femur Length

د (107) ossified femoral diaphysis اندازه کول نسبتا اسانه دي. د پورتنۍ ران یعنی ورانه Femur اوږد محور (108) باید په یو عرضی موقعیت کې وي، د transducer د سطحې محور سره موازي وي (85.2 انځور).



Fig. 85.2 a




Fig. 85.2 b




Fig. 85.2 c

۱۳۴- شکل : د جنین عمر دټاکلولپاره د فیمور اوږدوالی (FL) Femur Length اندازه کیږي ، په بنی خوا دیاگرام کې دجنین دورانه یاران طول په واحدملی متر په تابع دامیدواری اونۍ کښل شوی ده

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

د زړه او د وینې رګونه Heart and Blood Vessels

د زړه سیستم د جنین لومړنی فعال سیستم دی. د زړه انقباض د امیدواری په شپږمه اونۍ کې پیل کیږي. د زړه د انقباض نشتوالی او د امیدواری د کڅوړې وده، چې په دې وخت کې اکثراً په غیر واضح ډول نښه شوې وي، د یاد شوي abortion وړاندوینه کوي، کوم چې په عمومي توګه پراخول او کیوریټیج curettage ته اړتیا لري.

د نوي زیږون سر: نورمال موندنې Neonatal Skull: Normal Findings

دنوي زیږون دسر معاینه د مخکینۍ فونټینیل anterior fontanel (135 په شکل 93.1 کې) له لارې ترسره کیږي تر هغه چې دنوي زیږون یونیم کالو په عمر کې وي. کوپړۍ په کورونل coronal او سیګیټل سطحو کې sagittal planes سکین کیږي اودنوموړې موخې لپاره د transducer په ورو او پرله پسې مایل حرکت سره (Fig. 93. 1a, b) دالتراساوندانځوراخیستل کیږي. دکوپړۍ ازموینه پنځه معیاري کورونال سطحې coronal planes مستند کوي. دالتراساوند سکین کړنلاره د مخ خواڅخه anteriorly څخه پیل کیږي (93.2 انځور) او د پریوینټریکولر سپینې مادې معاینه کول ترسره کیږي (1 periventricular white matter (31)، کوم چې د کورټیکس cortex (132) په پرتله ډیر hyperechoic دی. په نوموړې کړنلاره کې transducer د سیګیټل سینوس superior sagittal sinus (136) دپاسه موقعیت لري.



Fig. 93.2 a




Fig. 93.2 b




Fig. 93.2 c

۱۳۵: شکل : د نوي زیږون Neonatal دسر نورمال التراساوند موندنې کښل شوې دي

[With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

دنوي زیږون مغزد sulci, fissures او د basal cisterns په داخل کې د دماغی - نخاعي مایع cerebrospinal fluid(CSF) لخوا احاطه شوی دی.

CSF Spaces in the Newborn

SCW	(Sinocortical width)	< 3 mm
CCW	(Craniocortical width)	< 4 mm
IHW	(Interhemispheric width)	< 6 mm
LVW	(Lateral ventricle width, anterior horn)	< 13 mm
3rd VW	(Width of third ventricle)	< 10 mm

په نوي زیږون کې د دماغی - نخاعي مایع cerebrospinal fluid(CSF) فضاګانې په واحد ملي متر بنډول شوي دي


د امیدواری التراساوند کله جنسیت ټاکي؟

ستاسو د ماشوم جنسیت په التراساوند کې د 18 څخه تر 20 اونيو پورې نه لیدل کېږي. ډاډ ترلاسه کړئ چې د امیدواری پاملرنې چمتو کونکي ته ووايست چې ایا تاسو غواړئ د التراساوند دمخه د خپل ماشوم جنسیت وپېژنئ.

دستنې په مرسته لارښود پروسیجر التراساوند

اوسمهال د ډیریو ناروغیو د علاج په موخه د یو ډول نوي تخنیک څخه ګټه پورته کېږي چې دستنې لارښود پروسیجر التراساوند په نوم یادېږي. په نوموړې کړنلاره کې د بدن اړونده ناروغې برخې ته د التراساوند په کارولو سره د پوستکي له لارې یوه پیچکاری ورننوي اودلارې مسیریې د التراساوند په تصویر کې تعقیب کېږي. د بیلګې په توګه په ۱۳۶: شکل کې ښوول شوي ده

چې دسرطان په ناروغۍ اخته نسجونوته ددرمل څخه ډکه پیچکاری ورننوځي او هلته درمل انجیکشن inject کوي . په پایله کې دسرطان ټولې حجرې دمینځه ځي .



۱۳۶ : په کین خواشکل کې دالتراساوند په کارولوسره په بدن کې دسرطان په ناروغۍ اخته برخه تشخیص شوې ده . نوموړې برخې ته دالتراساوندعکس په مرسته ددرمل څخه ډکه پیچکاری ورننوځي . په بني خواعکس کې بنوول شوې ده چې دپیچکاری څخه درمل دسرطان ناروغۍ نسجونوته انجکشن inject کیږي . په همدې استانه طریقه سره دسرطان نسجونه دمینځه وړل کیږي .





1. Hofer,M „Ultrasound Teaching Manual”; 2. Aufl. 2005; ISBN-10: 3131110422; ISBN-13: 9783131110428; Georg Thieme Verlag Stuttgart
2. Morneburg,H:“Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik“ Siemens 1995; MCD Verlag
3. Laubenberger, T.:“Technik der medizinischen Radiologie“ 4.Auflage1986, Deutscher Ärzte Verlag Köln
4. Delorme,S.:“Sonographie“ Thieme Verlag Stuttgart 2005
5. Manual of diagnostic ultrasound 1995, WHO , Genf
6. Palmer,P.E.S.:”Einführung in die Sonographie”, Hans Haber Verlag 1999
7. Dr. med. Abdulhamid Bahij “Medical dictionary English-Pashto”, published by: Danish Publishing Association 2006, peshawar
8. Lorenz,A.,Delorme, S.”Physicalische und technische Grundlagen der B-Bild Sonographie“, Radiologe 1999; 39(624-642) ,Springer Verlag 1999
9. Hans-Dieter Bundschu ,“Abdominelle Ultraschalldiagnostik in der praxis, Hippokrates Verlag Stuttgart
10. http://www.brooksidepress.org/Products/OBGYN_101/MyDocuments4/Ultrasonound/basic_ultrasound.htm
11. Ultrasound\Basic Physics of Nuclear Medicine-Sonography & Nuclear Medicine - Wikibooks, collection of open-content textbooks.htm
12. <http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/Ultrasound/>
13. Pschyrembel,: “Klinisches Wörterbuch”, 260 Auflage 2002; Walter de Gruyter Verlag
14. <http://www.cis.rit.edu/research/ultrasound/ultraintro.htm>


15. http://www.physics.ucok.edu/~mbingabr/BiomedicalImaging/ENGR4223_Ch1.ppt
16. <http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/Ultrasound/>
17. http://medbio.utoronto.ca/student/MBP1008/2005-06/Module%202_Burns_Ultrasound.pdf
18. <http://www.sonographiebilder.de/html/start.php>
Dr. Joachim Guntau ;II. Medizinische Abteilung
Albertinen-Krankenhau
19. Prof,Dr.Najeebullah Khalili; Ultrasound; www.ecampus-afghanistan.org
2015
20. Dr.M.Nawab kamal , Diagnostic Ultrasound; www.ecampus-afghanistan.org
2011

ملونه


With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Standard Planes with Corresponding Position of the Transducer and Diagrams



Standard Planes with Corresponding Position of the Transducer and Diagrams



With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Primer of Ultrasound Findings

When communicating with experienced colleagues, novices are occasionally confused about which terms to use to describe findings clearly and concisely. This brief review is

intended as a guide to until you have become more familiar with the common terms.

A

General Description of the Sonographic Morphology of a Finding

Imaging plane?	Name the imaging plane (see front cover flap). Is the lesion visualized in the longitudinal or transverse plane?
Where?	Location, side, position within an organ or relative to other organs and vessels, i.e., central, hilar or peripheral, subcapsular, adherent to the wall.
Number?	Lesions may be focal or unifocal, multifocal, multiple, or diffusely distributed.
How large?	Specify in mm or cm. Important for follow-up examinations: Estimate progression or regression, such as can occur under therapy.
Shape?	Round, oval, spherical or stellate, wedge-shaped, geographic, irregular, thickened.
Demarcation?	Sharp (more likely benign) or ill-defined (= evidence of infiltration, as in inflammation or malignancy).
Echogenicity?	Anechoic (= homogeneous fluid), hypoechoic, or hyperechoic (possibly relative to surroundings).
Echo texture?	Homogeneous or inhomogeneous, finely granular or coarse, septated. Recently introduced categories also include elastic deformation (using special scanning technique).
Acoustic phenomena?	Acoustic shadow; edge shadow; total reflection; acoustic enhancement; section thickness, mirror image, side lobe, reverberation artifacts.
Expansion?	Displacement or infiltration of adjacent structures or vessels. Caution: mass effects can also occur with benign cysts and are therefore not necessarily a sign of malignancy.

B

Useful Terms (in alphabetical order)

(⇒ application, possible meaning)

Ampullary	Developmental variant of the renal pelvis (⇒ can mimic obstruction)	Diffuse	Distribution pattern, as in increased echogenicity
Anechoic Black	(⇒ homogeneous fluids: blood, urine, bile, cyst contents, pericardial or pleural effusion)	Dissection	Complication (⇒ aortic aneurysm)
Artifacts Illusory	Visual findings lacking physical correlates	Double barrel shotgun sign	Immediate adjacency of two anechoic ductal structures in the hepatic parenchyma (⇒ dilation of intrahepatic ducts parallel to portal venous branches)
Capsule line	Thin hyperechoic line created by the margin of an organ (⇒ absent in cirrhosis of the liver)	Eccentric	Adherent to the wall (⇒ location of thrombus in blood vessels)
Comet tail	Artifact deep to pulmonary air or bowel gas	Echogenicity	"Brightness" of the pixels (increases with the number of impedance mismatches)
Concentric	At a pericentral location in a vessel (⇒ thrombus or calcification)	Ectasia	Dilation of the lumen of the abdominal aorta > 2.5–3.0 cm
Delayed rupture	Can occur in the spleen with late hemorrhage after trauma	Edge shadows	Acoustic phenomenon occurring deep to the edge of the gallbladder and cysts
Density	Term is occasionally used incorrectly. The echogenicity of a tissue on an ultrasound image has little to do with its physical density	Fluke of a whale	Typical appearance of the celiac trunk in the transverse plane
Depth compensation	Adjustment of gain to sound penetration depth	FNH	Focal nodular hyperplasia of the liver
		Focal	Circumscribed lesion (focus)

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Primer of Ultrasound Findings

117

Focal zone	Part of the image with the highest vertical resolution	Predilection	Common location of a lesion or abnormality
Forced inspiration	Respiratory maneuver (⇒ vena cava collapse test)	Pruned tree	Abrupt changes in caliber of the portal vein branches (⇒ cirrhosis of the liver)
Gain	Amplification of received echoes when generating image	Pseudocysts	Simple (⇒ arteries such as aorta), double (⇒ veins such as inferior vena cava)
Halo	Hypoechoic rim of a lesion (⇒ typical of hepatic metastases)	Pulsation	Decreased vascularity (⇒ cirrhosis of the liver)
Haustration	Convex pouching (typical of colon)	Rarefaction	Failure to invade vascular structures is inconsistent with infiltrative growth (⇒ benignity criterion)
Hilum fat sign	Benignity criterion for lymph nodes	Reverberation	Repetitive echoes (artifact)
Hyperechoic	Bright (⇒ as in fatty degeneration of parenchymal organs)	Section thickness artifact	Apparently ill-defined border of an obliquely sectioned hollow organ (⇒ important to consider in differential diagnosis of gallbladder sludge or bladder sediment)
Hypoechoic	Dark, few echoes (⇒ muscle, subcutaneous fat, parenchyma)	Septate, septated	Anechoic hollow spaces are divided by hyperechoic lines (⇒ cysts, cystic ovarian tumors; ⇒ aortic dissection)
Ill-defined	Demarcation (⇒ criterion of infiltration in malignancy and inflammation)	Sharp	Demarcation (⇒ benignity criterion)
Impedance mismatch	Interface between tissue layers with differing velocity of sound propagation that produces echoes	Side lobe artifact	(⇒ Occurs in anechoic structures next to strong reflectors)
Infiltration	Spread into adjacent structures (⇒ malignancy criterion)	Sludge	Hyperechoic sediment in the gallbladder
Inhomogeneous	Irregular pattern of distribution of echogenicity	Spoke-wheel pattern	Pattern of echogenicity (⇒ focal nodular hyperplasia of the liver, ⇒ septation in echinococcal cysts)
Iris sign	Typical progression of enhancement in a liver hemangioma on spiral CT	Starry sky	Multiple hyperechoic focal lesions (⇒ in tuberculosis of the spleen)
Jet sign	Inflow from the ureter into the bladder on color coded Doppler studies (⇒ intrastenotic and poststenotic acceleration of flow)	Stenosis	Narrowing of a vessel or hollow organ
Kinking	Tortuous, angular course (⇒ aortic aneurysm)	Stent	Tube implanted to maintain patency of vascular or ductal stenosis
L/T ratio	Longitudinal diameter divided by transverse diameter (⇒ malignancy status of lymph node)	String of pearls	Configuration of the medullary pyramids along the border between the parenchyma and renal pelvis (⇒ pattern of dilation of the pancreatic duct in pancreatitis)
Liquefaction	Usually anechoic (⇒ as in the center of abscesses, metastases)	Target sign	Concentric circles of alternating echogenicity (⇒ intussusception; differential diagnosis: bowel wall inflammation)
LN	Lymph node	Thickening	Variation in shape (⇒ margins of the liver in hepatic disorders)
Lobe of sound beam	The acoustic wave front has a finite thickness (⇒ section thickness artifact)	Total reflection	A black shadow occurs deep to bone and air
Multifocal	Having several foci in a single organ	Trackball	Control device on the ultrasound unit
Narrowing of renal parenchyma	(⇒ Typical finding in renal degeneration)	Triangular	Typical three-sided configuration (⇒ organ infarcts)
Necrosis	Hypoechoic, usually central area of liquefaction (⇒ abscess or metastasis)	Vena cava collapse test	Examination maneuver using forced inspiration (⇒ in suspected right heart failure)
Nodular	Multifocal distribution pattern of lesions	Wall thickness	Diagnostic criterion (⇒ hollow organs, vascular structures)
Nutcracker	Compression of the left renal vein by the aorta and superior mesenteric artery	Wedge-shaped	Pattern of increased parenchymal echogenicity (⇒ typical pattern in infarct)
Oscillating peristalsis	Back and forth motion of bowel contents		
Pennate	Exhibiting parallel stripes (⇒ pattern typical of muscles such as the psoas major)		
Perifocal	Marginal zone around a lesion		
Plaque	Hyperechoic calcified zone in blood vessels		
Polycyclic	Knobbly or resembling cauliflower (⇒ structure of tumor in the stomach or bladder)		
PP index	Parenchyma to pelvis index (⇒ kidney findings)		

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Checklist for Right Heart Failure	
• Dilated IVC > 20 mm, for young athletes > 25 mm	
• Dilated hepatic veins > 6 mm (in the hepatic periphery)	
• Absent collapse of the cava with forced inspiration	
• Possible pleural effusion, often initially on the right	
Checklist for Aortic Aneurysm	
Suprarenal aorta:	< 25 mm
Ectatic aorta:	25–30 mm
Aneurysm:	> 30 mm
Signs of increased risk of rupture:	
• Progressing dilation	
• Diameter	> 60 mm
• Diverticular dilation	
• Dissection	
• Eccentric true lumen	
Checklist for Portal Hypertension	
• Detection of portocaval collaterals at the porta hepatis	
• Portal vein - diameter at the porta hepatis ≥ 15 mm	
• Dilated splenic vein > 12 mm	
• Splenomegaly	
• Ascites	
• Recanalized umbilical vein (Cruveilhier–Baumgarten syndrome)	
• Esophageal varices (hemorrhage)	

Normal Values of Abdominal Sonography in Adults

Appendix

Transverse diameter	≤ 0.6 cm
Wall thickness	≤ 0.2 cm

Bile ducts

Common hepatic duct	< 0.6 cm
Post-cholecystectomy	< 0.9 cm
Intrahepatic ducts	< 0.4 cm

Gallbladder

Wall thickness	
Preprandial	< 0.4 cm
Postprandial	< 0.7 cm
Maximal size	< 11.0 x 4.0 cm

Gynecology

Uterus (nullipara)	
Length	5.0–8.0 cm
Width	1.5–3.0 cm
Endometrium (both layers)	
(premenopausal)	< 1.5 cm
(postmenopausal)	< 0.6 cm
IUD-fundus distance	< 2.0 cm
(if more: displacement)	
IUD-endometrium distance	< 0.5 cm
(see p. 78)	

Kidney

Longitudinal diameter	10.0–12.0 cm
Transverse diameter	4.0– 6.0 cm
Respiratory mobility	3.0– 7.0 cm
Cortical width	1.3– 2.5 cm

Parenchyma–pelvis (PP) index	
(under age 30 years)	> 1.6 : 1
(31 to 60 years)	1.2–1.6 : 1
(above age 60 years)	1.1 : 1

Liver

Sagittal length	< 13.0–15.0 cm
in right MCL	
Marginal angle	< 30° (left-lateral)
	< 45° (caudal right hepatic lobe)

Lymph nodes

T/L ratio	> 2.0
(spherical, suspicious)	~ 1.0

Ovary

Volume:	
Premenopausal	5.5–10.0 cm³
Postmenopausal	2.5– 3.5 cm³

Pancreas

Maximal diameter	
(head)	< 3.0 cm
(body)	< 2.0 cm
(tail)	< 2.5 cm
(pancreatic duct)	< 0.2 cm

Prostate gland

Maximal size	
(transverse)	< 5.0 cm
(sagittal and craniocaudal)	< 3.0 cm

Spleen

Size	< 11.0 cm
(between upper and lower poles)	
Width	< 4.0 cm
suspicious for lymphoma	> 6.0 cm

Superior Mesenteric Artery

	< 0.5 cm
--	----------

Urinary Bladder



Wall thickness	
(filled)	< 0.4 cm
(empty)	< 0.8 cm
Postvoid residual	< 50 mL
Volume (women)	< 550 mL
(men)	< 750 mL

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Checklist for Right Heart Failure	
• Dilated IVC > 20 mm, for young athletes > 25 mm	
• Dilated hepatic veins > 6 mm (in the hepatic periphery)	
• Absent collapse of the cava with forced inspiration	
• Possible pleural effusion, often initially on the right	
Checklist for Aortic Aneurysm	
Suprarenal aorta:	< 25 mm
Extrahepatic aorta:	25–30 mm
Aneurysm:	> 30 mm
Signs of increased risk of rupture:	
• Progressing dilation	
• Diameter	> 60 mm
• Diverticular dilation	
• Dissection	
• Eccentric true lumen	
Checklist for Portal Hypertension	
• Detection of portocaval collaterals at the porta hepatis	
• Portal vein - diameter at the porta hepatis $\geq$ 15 mm	
• Dilated splenic vein > 12 mm	
• Splenomegaly	
• Ascites	
• Recanalized umbilical vein (Cruveilhier–Baumgarten syndrome)	
• Esophageal varices (hemorrhage)	

Normal Values of Abdominal Sonography in Adults	
Appendix	
Transverse diameter	$\leq$ 0.6 cm
Wall thickness	$\leq$ 0.2 cm
Bile ducts	
Common hepatic duct	< 0.6 cm
Post-cholecystectomy	< 0.9 cm
Intrahepatic ducts	< 0.4 cm
Gallbladder	
Wall thickness	
Preprandial	< 0.4 cm
Postprandial	< 0.7 cm
Maximal size	< 11.0 x 4.0 cm
Gynecology	
Uterus (nullipara)	
Length	5.0–8.0 cm
Width	1.5–3.0 cm
Endometrium (both layers)	
(premenopausal)	< 1.5 cm
(postmenopausal)	< 0.6 cm
IUD-fundus distance	< 2.0 cm
(if more: displacement)	
IUD-endometrium distance	< 0.5 cm (see p. 78)
Kidney	
Longitudinal diameter	10.0–12.0 cm
Transverse diameter	4.0– 6.0 cm
Respiratory mobility	3.0– 7.0 cm
Cortical width	1.3– 2.5 cm
Parenchyma–pelvis (PP) index	
(under age 30 years)	> 1.6 : 1
(31 to 60 years)	1.2–1.6 : 1
(above age 60 years)	1.1 : 1
Liver	
Sagittal length	< 13.0–15.0 cm
in right MCL	
Marginal angle	< 30° (left-lateral)
< 45° (caudal right hepatic lobe)	
Lymph nodes	
T/L ratio	> 2.0
(spherical, suspicious)	~ 1.0
Ovary	
Volume:	
Premenopausal	5.5–10.0 cm ³
Postmenopausal	2.5– 3.5 cm ³
Pancreas	
Maximal diameter	
(head)	< 3.0 cm
(body)	< 2.0 cm
(tail)	< 2.5 cm
(pancreatic duct)	< 0.2 cm
Prostate gland	
Maximal size	
(transverse)	< 5.0 cm
(sagittal and craniocaudal)	< 3.0 cm
Spleen	
Size	< 11.0 cm
(between upper and lower poles)	
Width	< 4.0 cm
suspicious for lymphoma	> 6.0 cm
Superior Mesenteric Artery	
	< 0.5 cm
Urinary Bladder	
Wall thickness	
(filled)	> 0.4 cm
(empty)	> 0.8 cm
Postvoid residual	> 50 mL
Volume (women)	> 550 mL
(men)	> 750 mL



With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Normal Values of Abdominal Sonography in Pediatrics

(See reverse for adult values)

For liver and spleen, the median (m) + 2 SD [cm] is listed in relation to the body size, with the measurements taken in the right or, respectively, left anterior axillary line (thus, for the liver not in the midclavicular line as in adults). The renal length is the length in [cm] in usual percentiles.

Body size [cm]	Spleen			Kidney			Liver		
	m-2SD	m	m+2SD	m-2SD	m	m+2SD	m-2SD	m	m+2SD
Newborns	2.90	4.07	5.24	3.40	4.16	4.92	3.47	5.53	7.59
< 55	2.13	2.91	3.69	3.00	4.35	5.70	3.40	5.50	7.60
55 - 70	2.44	3.46	4.48	3.60	5.00	6.40	4.53	6.59	8.65
71 - 85	2.23	3.71	5.19	4.50	5.90	7.30	5.48	7.20	8.92
86 - 100	2.61	4.69	6.77	5.30	6.60	7.90	5.98	7.68	9.38
101 - 110	3.02	4.88	6.74	5.85	7.10	8.35	6.76	8.74	10.72
111 - 120	3.38	5.26	7.14	6.35	7.65	8.95	6.59	8.71	10.83
121 - 130	3.37	5.31	7.25	6.90	8.20	9.50	7.38	9.40	11.42
131 - 140	4.10	5.96	7.82	7.40	8.70	10.00	8.63	9.99	11.35
141 - 150	4.61	5.81	7.01	7.90	9.25	10.60	8.48	10.42	12.36
> 150	4.36	6.18	8.00	8.60	9.95	11.30	9.48	11.36	13.24

(Ref.: Dinkel E et al: Kidney size in childhood. *Pediatr Radiol* (15): 38-43 and Weitzel D: Sonographische Organometrie im Kindesalter, Mainz)

Normal Thyroid Volume [mL]

Age	Females	Males
Newborns	< 2.3 (1.5)	< 3.5 (2.0)
1 - 4 years	< 4.7 (3.0)	< 3.8 (2.9)
5 - 10 years	< 6.5 (5.0)	< 6.0 (5.4)
11 - 12 years	< 14.6 (14.1)	< 13.9 (13.2)
Adults	< 18.0	< 25.0

Both lobes (without isthmus) measured together with the volume formula $(0.5 \times A \times B \times C)$. The blue numbers in parentheses are the normal values of children in Europe that do not live in an iodine deficiency area; the black numbers apply to iodine deficiency.

Normal Values for CSF Spaces in Newborns


SCW (sinocortical width)	< 3 mm
CCW (craniocortical width)	< 4 mm
IHF (interhemispheric fissure)	< 6 mm
LWW (width of lat. ventricle, ant. horn)	< 13 mm
3rd VW (width of the 3rd ventricle)	< 10 mm

(Ref.: Libicher M, Tröger J: US Measurement of the Subarachnoid Space in Infants: Normal Values. *Radiology* 184 (1992): 749-775)

Excerpt from:
Hofer, Matthias
Ultrasound Teaching Manual
ISBN 9783131110435
eISBN 9783131734433

Thieme

Normal Values of Prenatal Sonography




$$\text{Log FW} = 1.36 + 0.05 \text{ AC} + 0.18 \text{ FL} - 0.0037 (\text{AC} \times \text{FL})$$

FW = Fetal weight
AC = Abdominal circumference
FL = Femur length

Developmental Dysplasia of the Hip in Newborns and Infants

Classification of Infant Hips according to Graf	Alpha	Beta	Femoral head
I (normal)	> 60°	< 55°	centered
II a+	56 - 59°	55 - 70°	centered
II a-	50 - 55°	55 - 70°	centered
II g	44 - 49°	55 - 77°	centered
II d	44 - 49°	> 77°	centered
III (eccentric)	< 44°	> 77°	eccentric
IV (dislocated)	< 44°	undetermined	dislocated

Normal Values of Prenatal Sonography: Second and Third Trimesters



With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Table of Normal Values in Adults

You will find normal prenatal values after flipping this page out and normal pediatric values on pages 53, 74, 95, and 103, as well as on the pocket-sized reference cards included. The normal values listed here are subject to intra-individual and interindividual variation and should only be considered as guideline values for adults in a Caucasian population.

These reference values are mean values taken from the literature and apply only to measurements obtained in the standard planes discussed previously. Vascular diameters are specified as the inner diameter of the vascular lumen excluding the width.

Abdominal aorta Diameter:		< 2.5 cm (suprarenal) < 2.0 cm (infrarenal) 2.5–3.0 cm = ectasia > 3.0 cm = aneurysm
Adrenal gland	Maximal crural thickness	< 1.0 cm
Angle between aorta and SMA		< 30 °
Aortovertebral distance		< 0.5 cm
Appendix	Transverse diameter:	≤ 6 mm
	Wall thickness:	≤ 2 mm
Bile ducts	Common bile duct:	< 0.6 cm
	< 0.9 cm post-cholecystectomy Intrahepatic bile ducts:	< 0.4 cm
Bladder	Wall thickness:	< 0.4 cm (bladder full) < 0.8 cm (bladder empty)
	Post-void residual volume:	< 50 mL
	Volume:	< 550 mL (women) < 750 mL (men)
Gallbladder	Wall thickness:	< 0.4 cm preprandial < 0.7 cm postprandial
	Maximal size of the GB:	< 11.0 x 4.0 cm (longitudinal x transverse)
Gynecology	Uterus (nullipara):	5.0–8.0 cm length 1.5–3.0 cm width
	Endometrium (thickness x 2):	< 1.5 cm (premenopausal) < 0.6 cm (postmenopausal)
	IUD-fundus distance:	< 2.0 cm (if more: displacement)
	IUD-endometrium distance:	< 0.5 cm (see page 78)
Hepatic veins	Diameter:	≤ 0.6 cm (distal, peripheral segments) ≥ 0.7 cm → suspicious for right heart failure
Inferior vena cava	Diameter:	< 2.0 cm (< 2.5 cm in young athletes) < 1/3 of baseline diameter on forced expiration
Kidney	Maximal size, respiratory mobility:	10.0–12.0 cm longitudinal diameter 4.0–6.0 cm transverse diameter
		3.0–7.0 cm respiratory mobility
		1.3–2.5 cm cortical width
		Parenchyma-pelvis index (PPI): > 1.6 : 1 (under 30 years) 1.2–1.6 : 1 (31 to 60 years) 1.1 : 1 (above 60 years)
Liver	Sagittal size in right MCL:	< 13 to 15 cm
	Marginal angle:	< 30 ° (left lobe, lateral) < 45 ° (right lobe, caudal)
Lymph nodes	L/T ratio:	> 2.0 (1.0 = spherical, suspicious)
	Hilar fat sign (Benignity criterion)	
Ovary	Volume:	5.5–10.0 cm ³ each ovary premenstrual 2.5–3.5 cm ³ each ovary postmenstrual
	Yolk sac:	0.3 to 0.5 cm
	Fetal cervical subcutaneous thickness (10th–14th week):	< 0.3 cm (if more: nuchal fold thickening)
Pancreas	Maximal diameter:	< 3.0 cm (head) < 2.0 cm (body) < 2.5 cm (tail) < 0.2 cm (pancreatic duct)
Portal vein	Diameter:	< 1.3 cm normal 1.3–1.5 cm gray area > 1.5 cm → portal hypertension
Prostate gland	Maximal size:	< 5.0 cm (transverse) < 3.0 cm (sagittal and craniocaudal)
Spleen	Size:	< 11.0 cm (from upper to lower pole) < 4.0 cm (thickness > 6 cm → suspicious for lymphoma)
Splenic vein	Diameter:	< 1.0 cm normal (> 1.2 cm → portal hypertension)
Superior mesenteric artery diameter		< 0.5 cm
Thyroid gland	Maximal size:	4.0–7.0 cm (craniocaudal) 1.0–3.0 cm (transverse) 1.0–2.5 cm (sagittal)
	Volumes (both lobes combined):	< 18 mL (women) < 25 mL (men)
Volume formula		0.5 x A x B x C (simplified)

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Legend for the Diagrams

1	Skin	56	Metastases	107	Femur
2	Subcutaneous fat	57	Tumor degeneration (central necrosis)	108	Thigh
3	Abdominal rectus muscle	58	Abscess, partially liquefied	109	Rib
4	Abdominal oblique muscle	59	Catheter, stent	110	Cerebellum
5	Connective tissue, fascia, septa	60	Air in bile ducts	111	Arm, hand
6	Linea alba	61	Hemangioma	112	Pelvic bone
7	Ligamentum teres	62	Focal fatty sparing (liver)	113	Spinal canal
8	Falciform ligament	63	Focal fatty infiltration (liver)	114	Scapula
9	Liver; caudate lobe (a)	64	Fluid-filled hollow space (cyst)	115	Ventricle
10	Hepatic vein	65	Epithelial growth (polyp)	116	Atrium
11	Portal vein and its branches	66	Bile duct, hepatic duct, and common bile duct	117	Brachiocephalic trunk
12	Confluence of the portal vein (superior mesenteric vein and splenic vein)	67	Thickened bile (sludge)	118	Mitral valve
13	Diaphragm	68	Free intra-abdominal fluid (ascites)	119	Aortic valve
14	Gallbladder	69	Free pleural fluid (pleural effusion)	120	Hernia sac
15	Abdominal aorta	70	Distal acoustic enhancement	121	Finger, toe
16	Inferior vena cava	71	Infarcted area	122	Metacarpal, metatarsal bones
17	Superior mesenteric artery	72	Angiomyolipoma (benign renal tumor)	123	Subclavian artery
18	Hepatic artery	73	Collection of lymphatic fluid (lymphocele)	124	3rd ventricle (CNS)
19	Splenic artery	74	Stomach and bowel wall	125	4th ventricle (CNS)
20	Splenic vein		Mucosa (epithelium and tunica propria) (a)	126	Corpus callosum
21	Common iliac artery; external (a), internal (b)		Muscularis mucosa (b)	127	Fornix
22	Common iliac vein; external (a), internal (b)		Submucosa (c)	128	Cavum of the septum pellucidum
23	Superior mesenteric vein		Muscular layer (d)	129	Thalamus
24	Renal artery; right (a), left (b)		Serosa (e)	130	Cingulate gyrus
25	Renal vein; right (a), left (b)	75	Pancreatic duct	131	White matter (CNS)
26	Stomach (often filled with air)	76	Foley catheter balloon	132	Gray matter, cortex (CNS)
27	Upper renal pole	77	Bladder wall	133	Sulci
28	Lower renal pole	78	Endometrium	134	Sylvian fissure
29	Renal parenchyma	79	Fluid in the pericardial sac (pericardial effusion)	135	Anterior fontanelle
30	Medullary pyramids	80	Gallbladder wall	136	Superior sagittal sinus
31	Renal pelvis	81	Thyroid gland	137	Internal capsule
32	Celiac trunk	82	Carotid artery	138	Caudate nucleus
33	Pancreas	83	Jugular vein	139	Putamen and pallidum
34	Esophagus	84	Trachea	140	Cerebrospinal fluid (CSF)
35	Vertebral body	85	Sternocleidomastoid muscle	141	Spinal cord
36	Intervertebral disk	86	Accessory spleen (DD; lymph node)	142	Conus medullaris
37	Spleen	87	Urinary obstruction in the renal pelvis and caliceal system	143	Cauda equina
38	Bladder	88	Scalenus anterior and longus colli muscles	144	Foramen of Monro
39	Uterus	89	Sternohyoid muscle	145	Pons
40	Uterine cervix	90	Sternothyroid muscle	146	Interhemispheric fissure
41	Vagina	91	Ovary	147	Sinocortical width of the SAS
42	Prostate gland	92	Intrauterine device (IUD)	148	Cranio-cortical width of the SAS
43	Colon, rectum (gas-filled)	93	Follicle	149	Calices of the renal pelvis
44	Psoas major muscle	94	Placenta	150	Ureter
45	Acoustic shadowing (behind air, bone, and calcium)	95	Embryo, fetus	151	Ureterocele
46	Small bowel (duodenum, jejunum, ileum)	96	Placental cord with umbilical vessels	152	Urethra
47	Lung (air = acoustic shadow)	97	Amniotic fluid	153	Femoral head
48	Pubic bone	98	Testis	154	Deep muscles of the back
49	Stone, concretion, calcified plaque	99	Epididymis	155	Adrenal gland
50	Hematoma, solid and liquid components	100	Scrotum (fibromuscular layers)	156	Gluteus minimus muscle
51	Artifacts: Reverberation echoes (a) Section-thickness artifact (b) Side-lobe artifact (c)	101	Chorionic cavity	157	Gluteus medius muscle
52	Blood clot, thrombus	102	Yolk sac	158	Acetabular labrum
53	Fibrosis, partially calcified	103	Lateral ventricle (CNS)	159	Cartilaginous acetabular edge (hip)
54	Mass (tumor)	104	Choroid plexus	160	Bony acetabular roof
55	Lymph node, lymphoma	105	Cranium	161	Ischium
		106	Midline echo of the falx	162	Ossification center of the femoral neck
				163	Joint capsule
				164	Y cartilage of the acetabulum
				165	Ligament of the femoral head
				166	Epiphysis of the femoral head
				167	Femoral metaphysis
				168	Joint space
				169	Left gastric artery

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Table of Normal Values for Prenatal Care

The values listed here are based on the percentile curves for the German Caucasian population (values for Asian populations are lower) shown on pages 84 to 88. This workbook also includes charts and tables on laminated pocket-sized cards for

use in the hospital. The normal values for pediatric biometry are shown on pages 53 (kidneys), 74 (spleen), 95 (CNS), and 103 (thyroid gland).

First Trimester

Chorionic cavity diameter (CCD)						Crown-rump length (CRL)					
Week	CCD	Week	CCD	Week	CCD	Week	CRL	Week	CRL	Week	CRL
4+4	0.5	4+5	1.8	4+6	3.2			5+5	1.2	5+6	2.1
5.	4.5	7.	21.7	9.	36.6	6.	3.0	8.	16.7	10.	33.3
5+1	5.8	7+1	22.9	9+1	37.6	6+1	3.8	8+1	17.8	10+1	34.6
5+2	7.1	7+2	24.0	9+2	38.5	6+2	4.7	8+2	18.9	10+2	35.9
5+3	8.4	7+3	25.1	9+3	39.5	6+3	5.7	8+3	20.0	10+3	37.2
5+4	9.7	7+4	2.2	9+4	40.4	6+4	6.6	8+4	21.1	10+4	38.5
5+5	10.9	7+5	27.3	9+5	41.3	6+5	7.5	8+5	22.3	10+5	39.5
5+6	12.2	7+6	28.4	9+6	42.2	6+6	8.5	8+6	23.5	10+6	41.3
6.	13.4	8.	29.5	10.	43.1	7.	9.5	9.	24.6	11.	42.6
6+1	14.6	8+1	30.5	10+1	44.0	7+1	10.5	9+1	25.8	11+1	44.0
6+2	15.9	8+2	31.6	10+2	44.9	7+2	11.5	9+2	27.0	11+2	45.4
6+3	17.1	8+3	32.6	10+3	45.7	7+3	12.5	9+3	28.3	11+3	46.9
6+4	18.3	8+4	33.6	10+4	46.6	7+4	13.5	9+4	29.5	11+4	48.3
6+5	19.4	8+5	34.6	10+5	47.4	7+5	14.6	9+5	30.7	11+5	49.8
6+6	20.6	8+6	35.6	10+6	48.2	7+6	15.6	9+6	32.0	11+6	51.2

(Mean values in mm; ref.: Rempen)

(Mean values in mm; ref.: Rempen)

Second and Third Trimesters

Week	Head circumference			Biparietal diameter (BPD)			Femur length (FL)			Abdominal circumference (AC)		
	5.	50.	95.	5.	50.	95.	5.	50.	95.	5.	50.	95.
12	63	76	90	15	20	24	5	9	13	40	58	76
14	90	104	118	23	28	32	11	15	19	60	79	98
16	117	131	146	30	35	40	17	21	25	79	99	119
18	142	157	172	38	43	48	22	27	31	99	120	141
20	167	182	197	45	50	55	28	32	37	118	140	162
22	190	205	222	51	56	61	34	38	42	138	161	184
24	212	228	245	57	63	68	39	43	48	158	182	205
26	233	249	266	63	69	74	44	49	53	177	202	227
28	253	269	287	69	74	80	49	53	58	197	223	248
30	271	288	306	74	79	85	53	58	63	217	243	270
32	288	305	323	78	84	90	58	63	68	237	264	291
34	303	321	340	82	89	95	62	67	72	256	284	312
36	318	336	355	86	93	99	66	71	76	276	305	334
38	331	349	368	90	96	103	69	75	80	296	325	355
40	343	361	381	93	99	106	73	78	84	316	346	376

(Percentile values in mm; ref.: Merz)

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]


A

General Description of the Sonographic Morphology of a Finding

Imaging plane?	Name the imaging plane (see front cover flap). Is the lesion visualized in the longitudinal or transverse plane?
Where?	Location, side, position within an organ or relative to other organs and vessels, i.e., central, hilar or peripheral, subcapsular, adherent to the wall.
Number?	Lesions may be focal or unifocal, multifocal, multiple, or diffusely distributed.
How large?	Specify in mm or cm. Important for follow-up examinations: Estimate progression or regression, such as can occur under therapy.
Shape?	Round, oval, spherical or stellate, wedge-shaped, geographic, irregular, thickened.
Demarcation?	Sharp (more likely benign) or ill-defined (= evidence of infiltration, as in inflammation or malignancy).
Echogenicity?	Anechoic (= homogeneous fluid), hypoechoic, or hyperechoic (possibly relative to surroundings).
Echo texture?	Homogeneous or inhomogeneous, finely granular or coarse, septated. Recently introduced categories also include elastic deformation (using special scanning technique).
Acoustic phenomena?	Acoustic shadow; edge shadow; total reflection; acoustic enhancement; section thickness, mirror image, side lobe, reverberation artifacts.
Expansion?	Displacement or infiltration of adjacent structures or vessels. Caution: mass effects can also occur with benign cysts and are therefore not necessarily a sign of malignancy.

With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]



With permission :

Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]

Normal Values of Abdominal Sonography in Pediatrics

(See reverse for adult values)

For liver and spleen, the median (m) ± 2 SD (cm) is listed in relation to the body size, with the measurements taken in the right or, respectively, left anterior axillary line (thus, for the liver not in the midclavicular line as in adults). The renal length is the length in (cm) in usual percentiles.

Body size [cm]	Spleen			Kidney			Liver		
	m-2SD	m	m+2SD	m-2SD	m	m+2SD	m-2SD	m	m+2SD
Newborns	2.96	4.07	5.24	3.48	4.16	4.92	3.47	5.53	7.59
< 55	2.73	2.91	3.69	3.00	4.35	5.70	3.40	5.50	7.60
55 - 70	2.44	3.46	4.48	3.60	5.00	6.40	4.53	6.59	8.65
71 - 85	2.23	3.71	5.19	4.50	5.90	7.30	5.48	7.20	8.92
86 - 100	2.61	4.69	6.77	5.30	6.60	7.90	5.98	7.68	9.38
101 - 110	3.02	4.88	6.74	5.85	7.10	8.35	6.76	8.74	10.72
111 - 120	3.38	5.26	7.14	6.35	7.65	8.95	6.59	8.71	10.83
121 - 130	3.37	5.31	7.25	6.90	8.20	9.50	7.38	9.40	11.42
131 - 140	4.10	5.96	7.82	7.40	8.70	10.00	8.63	9.99	11.35
141 - 150	4.61	5.81	7.01	7.90	9.25	10.60	8.48	10.42	12.36
> 150	4.36	6.18	8.00	8.60	9.95	11.30	9.08	11.36	13.24

(Ref.: Dinkel E et al: Kidney size in childhood. Pediatr Radiol (1975) 38-43 and Weitzel D: Sonographische Organometrie im Kindesalter, Mainz)

Normal Thyroid Volume [mL]

Age	Females	Males
Newborns	< 2.3 (1.5)	< 3.5 (2.0)
1 - 4 years	< 4.7 (3.0)	< 3.8 (2.9)
5 - 10 years	< 6.5 (5.0)	< 6.0 (5.4)
11 - 12 years	< 14.6 (14.1)	< 13.9 (13.2)
Adults	< 18.0	< 25.0

Both lobes (without isthmus) measured together with the volume formula (0.5 x A x B x C). The blue numbers in parentheses are the normal values of children in Europe that do not live in an iodine deficiency area; the black numbers apply to iodine deficiency.

Normal Values for CSF Spaces in Newborns

Measurement	Normal Value
SCW (sinocortical width)	< 3 mm
CCW (craniocortical width)	< 4 mm
IHF (interhemispheric fissure)	< 6 mm
LVW (width of lat. ventricle, ant. horn)	< 13 mm
3rd VW (width of the 3rd ventricle)	< 10 mm

(Ref.: Uebicher M, Tilger J: US Measurement of the Subarachnoid Space in Infants. Normal Values. Radiology 184 (1992): 749-775)

Excerpt from:
Hofer, Matthias
Ultrasound Teaching Manual
ISBN 9783131110435
eISBN 9783131734433

Thieme

Checklist of Cyst Criteria

- Spherical shape
- Anechoic content
- Sharp demarcation
- Distal acoustic enhancement
- Edge shadows
- Accentuated entrance and exit echo

Checklist of Cirrhosis Criteria

- Absent thin, hyperechoic capsule
- Peripheral vascular rarefaction
- Widened angle formed by the hepatic veins > 45°
- Abrupt caliber changes of the portal vein
- Possible enhanced "embankment" of the portal vein
- Regenerating nodules with vascular displacement

Additional Late-Stage Findings

- Rounded organ shape (obtuse marginal angles)
- Shrunken liver
- Signs of portal hypertension

Normal Values of Prenatal Sonography

Renal length

Estimated fetal weight (EFW)

$$\text{Log FW} = 1.36 + 0.05 \text{ AC} + 0.18 \text{ FL} - 0.0037 (\text{AC} \times \text{FL})$$

FW = Fetal weight
AC = Abdominal circumference
FL = Femur length

Developmental Dysplasia of the Hip in Newborns and Infants

Classification of Infant Hips according to Graf	Alpha	Beta	Femoral head
I (normal)	> 60°	< 55°	centered
II a+	56 - 59°	55 - 70°	centered
II a-	50 - 55°	55 - 70°	centered
II g	44 - 49°	55 - 77°	centered
II d	44 - 49°	> 77°	centered
III (eccentric)	< 44°	> 77°	eccentric
IV (dislocated)	< 44°	undetermined	dislocated

Normal Values of Prenatal Sonography: Second and Third Trimesters

Abdominal circumference (AC)

Week	5%	50%	95%
12	13	15	17
13	14	16	18
14	15	17	19
15	16	18	20
16	17	19	21
17	18	20	22
18	19	21	23
19	20	22	24
20	21	23	25
21	22	24	26
22	23	25	27
23	24	26	28
24	25	27	29
25	26	28	30
26	27	29	31
27	28	30	32
28	29	31	33
29	30	32	34
30	31	33	35
31	32	34	36
32	33	35	37
33	34	36	38
34	35	37	39
35	36	38	40
36	37	39	41
37	38	40	42
38	39	41	43
39	40	42	44
40	41	43	45

Femur length (FL)

Week	5%	50%	95%
12	5	6	7
13	6	7	8
14	7	8	9
15	8	9	10
16	9	10	11
17	10	11	12
18	11	12	13
19	12	13	14
20	13	14	15
21	14	15	16
22	15	16	17
23	16	17	18
24	17	18	19
25	18	19	20
26	19	20	21
27	20	21	22
28	21	22	23
29	22	23	24
30	23	24	25
31	24	25	26
32	25	26	27
33	26	27	28
34	27	28	29
35	28	29	30
36	29	30	31
37	30	31	32
38	31	32	33
39	32	33	34
40	33	34	35


Biparietal diameter (BPD)

Week	5%	50%	95%
12	7.4	7.6	7.8
13	7.6	7.8	8.0
14	7.8	8.0	8.2
15	8.0	8.2	8.4
16	8.2	8.4	8.6
17	8.4	8.6	8.8
18	8.6	8.8	9.0
19	8.8	9.0	9.2
20	9.0	9.2	9.4
21	9.2	9.4	9.6
22	9.4	9.6	9.8
23	9.6	9.8	10.0
24	9.8	10.0	10.2
25	10.0	10.2	10.4
26	10.2	10.4	10.6
27	10.4	10.6	10.8
28	10.6	10.8	11.0
29	10.8	11.0	11.2
30	11.0	11.2	11.4
31	11.2	11.4	11.6
32	11.4	11.6	11.8
33	11.6	11.8	12.0
34	11.8	12.0	12.2
35	12.0	12.2	12.4
36	12.2	12.4	12.6
37	12.4	12.6	12.8
38	12.6	12.8	13.0
39	12.8	13.0	13.2
40	13.0	13.2	13.4

(Percentile values in mm, ref.: Alertz)

With permission :
Matthias Hofer, M.D. Ultrasound Teaching Manual , 2nd English edition, Thieme publishers, stuttgart,new york 2013]





پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانی خدران

دلیکوال پېژندنه :

پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانی خدران د خدای بښلي الحاج ډگروال الله داد خان سلطانی خدران زوی په هې پښتون افغان په ۱۰ / ۱ / ۱۹۴۴ ز کال د پکتیا ولایت د خدرانو مېزای تېر په یوه دینداره او روڼ انده کورنۍ کې زېږېدلی دی.

زده کړې :

ده په ۱۹۵۰ ز کال کې خپلې لومړنۍ زده کړې د رحمان بابا په لیسه کې پیل او په ۱۹۶۱ ز کال کې په اعلی درجه سرته رسولې دي. هغه په ۱۹۶۲ ز کال کې د لوړو زده کړې په موخه د دولت له خوالو جرمني ته واستول شو.

پر ۱۹۶۵ز کال کې يې د فرانکفورت په پوهنتون کې د عمومي فيزيک په زده کړه پيل وکړاود ۱۹۶۶ ز کال وروسته يې دبرلين په ازاد پوهنتون کې (Free University of Berlin) خپلې زده کړې ته دوام ورکړ.

سلطانی ځدران، په ۱۹۷۰ز کال کې دتجربوي فيزيک په څانگه کې د ديپلوم په اخيستلو بريالی شو. هغه د ۱۹۷۱ زکال څخه تر ۱۹۷۶ ز کال پورې دجرمني بوخوم پوهنتون ،د فيزيک په دپا رتمنت کې د يوه علمي غړي په صفت په څيرنوبوخت وو او په نوموړې موده کې دهستوي فيزيک په څانگه کې د ډاکترۍ په اخيستلو بريالی شو.

دندې :

سلطانی ځدران پر ۱۹۷۷ ز کال کې د طب په څانگه کې په لوړوزده کړو پيل وکړاو په څنگ کې يې د علمي غړي اوښوونکي په توگه د بوخوم پوهنتون د طب پوهنځۍ فيزيولوژي په دپارمنت کې رسمي دنده تر سره کوله.

سلطانی ځدران د ۱۹۸۰ ز کال څخه تر ۱۹۸۶ م کال پورې دکابل پوهنتون د طبيعي علوموپوهنځۍ دفيزيک په دپارتمنت کې داستاد په توگه کارکاوه او وروسته دافغانستان داتوم انرژۍ څانگې مسئول مشر وټاکل شو.

کله چې په ۱۹۸۶ز کال کې دچرنوبيل هستوي بټۍ چاودنې پېښه مينځ ته راغله اوراډيواکټيو توکي دهواله لارې دنړۍ هرگوټ ته خپاره شول ،نوهغه ته داتومي انرژۍ نړيوال سازمان له خوا دنده وسپارل شوه چې په راډيواکټيو ايزوټوپونو Isotopes باندې د افغانستان هواککړتيا اندازه کړي اونتيجه يې د اټومي انرژۍ نړيوال سازمان (IAEA) په عمومي کنفرانس کې وړاندې کړي. هغه د ۱۹۸۶ ز کال داکتوبر په مياشت کې د اټومي انرژۍ نړيوال سازمان (IAEA) په عمومي کنفرانس کې دبرخي اخيستلو په موخه داتریش هيواد ته ولاړ. په ۱۹۸۶ ز کال کې د يوه وتلي افغان ، او ولس پالونکي ساينس پوه په توگه په افغانستان باندې دروسانو ديرغل اودافغان کمونيستي چارواکو سره د ډير کلک مخالفت درلودلوله کبله په اتریش کې سياسي پناه غوښتنې ته اړ شو او خپل هيواد ته بيرته راستون نه شو .

سلطانی ځدران د ۱۹۸۹ز کال څخه تر ۲۰۰۰ ز کال پورې داتریش هيواد د ويانا ښار لايښ په روغتون کې دايکس وړانگومتخصص په توگه دراډيوتيراپي په څانگه کې دنده ترسره کوله .

سلطانی ځدران د ۲۰۰۱ ز کال څخه راپدې خوا دالمان بايرن ايالت په يوه معتبر روغتون کې دطبي فيزيک پوه اودايکس وړانگو متخصص ډاکترپه توگه د راډيوتيراپي (Radiotherapy) په دپارتمنت کې دسرطان ناروغۍ ددرملني په موخه لاوس هم په کار بوخت دی .

که څه هم سلطاني خدراڼي اوسمهال د اته اوياکالونو ۷۸ عمر لري، خوبيا هم دراديو تيراپي متخصص ډاکټرانو دکمېنت له کبله دنوموړي روغتون سره مرسته کوي کله چې کوم ډاکټر ناروغ شي اوياپه رخصتي لاړ شي .

سلطاني خدراڼي د پښتو، دري ، جرمني اوانگليسي ژبو په ويلو، لوستلو اوليکلوکي بشپړ حاکميت لري اوپه نوموړو ژبو باندې روانې خبرې کولای شي

سلطاني دري زامن اودوه لوڼه لري . مشر زوی يې ډاکتر غازي محمد دراديو لوژي خانگي متخصص ډاکتر دی . دويم زوی يې نظير محمد اودرېم زوی يې وحيد نومېږي چې دفيزيوتيراپي په خانگه کې يې زده کړې ترسره کړې دي.

دليکوال چاپ شوي علمي آثار:

1. دسرطاني ناروغيو راديو تيراپي ، ۱۴۰۱ ل کال ، دلوروزده کړو وزارت له خوا چاپ شوی دی
2. دطبيعي علوموانگليسي – پښتوقاموس ، ۲۰۰۰ ل کال ، دلوروزده کړو وزارت له خوا چاپ شوی دی
3. دسينې سرطان پېژندنه ، درملنه اومخنيوی ، ۱۳۹۶ ل کال، دلوروزده کړو وزارت له خوا چاپ شوی دی
4. د وينې سرطان پېژندنه، درملنه ، اومخنيوی ، ۲۰۰۹ ز کال ، دلوروزده کړو وزارت له خوا چاپ شوی دی
5. سرطان او د چاپيريال راديو اکتیويټي، ۲۰۰۸ ز کال ، دلوروزده کړو وزارت له خوا چاپ شوی دی
6. د البرت اېنشتاين نسبي تيوري ۲۰۰۶ ز کال ، جرمني
7. د اټوم فېزيک اساسات ، لکچرنوټ، ۱۹۸۵ ز کال ، ساينس پوهنځی ، کابل پوهنتون
8. د الکترونېک اساسات ، لکچرنوټ، ۱۹۸۴ ز کال ، ساينس پوهنځی ، کابل پوهنتون
9. د لمرانرژي خپرنيز مرکز پروژه (Solar collector) ، ۱۹۸۶-۱۹۸۲ جوړه شوه ، ساينس پوهنځی مجله ، کابل پوهنتون
10. د اکس ريزفلوريسېنس (X-ray fluorescence) کړنلارې په مرسته دهېواد معدني ډبرو پېژندنه او تحليل ، کابل پوهنتون، ۱۹۸۳ ، ساينس پوهنځی مجله ، کابل پوهنتون
11. د کوبالټ شپيته راديو تيراپي دستگاه Cobalt-60 therapy equipment ، لېکچرنوټ ، ۱۹۸۴ ، کابل پوهنتون
12. الکتروفيزيولوژي ۱۹۸۵ ، لېکچرنوټ ، طب پوهنځی ، کابل پوهنتون

خپور شوي علمي اثار او مقالې :

1. په هیواد کې د اټومي پاتې شونو خبرتیا ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
2. اټومي بمونه او مذهبي نومونه ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
3. د چرنوبیل هستوی پېښې شل کل تلین ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۶ زکال
4. د سړکال فزیک نوبل جایزه جاپاني فزیکپوهانوته ورکړه شوه ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
5. د کیهان (Universe) مصنوعي پیدایښت تجربه وځنډیده ، دلراوبر ا ، وینوا وییپانه ۲۰۰۸ زکال
6. د سرطاني ناروغیو د پېژندنې کلینیکي فرمول (TNM) ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
7. هېماتولوژي (د داخله طب لکچرنوټ : دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
8. د اټوم بم د ۶۳ تلین غمیزې په یاد ، دلراوبر اوبینوا وییپانه ۲۰۰۸ زکال
9. د مسلمان پښتون اټوم بم کارپوه عبدالقدیر لنډه پېژندنه ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
10. د گاونډ یو هیوادونو هستوي ازموینې ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
11. د پښتو ژبې یوملي تلویزیون ته اړتیا ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۷ زکال
12. دنړۍ لومړی اټوم بم ، دلراوبر او بینوا وییپانه ۲۰۰۷ زکال
13. د پولونیم زهراودروسي جا سوس مړینه ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۶ زکال
14. د اټوم انرژي بنسټیز فرمول ، دلراوبر اوبینوا وییپانه ۲۰۰۶ زکال
15. پښتانه او د پښتو ژبې غمیزه ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۵ زکال
16. په کابل کې باید د پښتو ژبې پوهنتون جوړشي ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۵ زکال
17. د طبیعي وړانگو سرچینې ، دلراوبر اوبینوا ، وییپانه ۲۰۰۸ زکال
18. طبیعي رادیواکتیو یتي ، د ټول افغان وییپانه ، ۲۰۰۷ زکال
19. د افغانستان د اټوم انرژۍ پېښلیک ، د ټول افغان وییپانه ، ۲۰۰۶ زکال

(پای)

Preface

The Diagnostic Ultrasound book was created in about 3 years due to my many years of special knowledge in the field of medical physics and medical studies.

The lack of suitable specialist books in the field of Diagnostic Ultrasound in Pashto, which is the national and official language of instruction in the country, made the publication of this book necessary. This is the first book of its kind in the Pashto language. With its detailed explanations of diagnostic ultrasound images and is intended to help doctors as students.

I hope to provide my Afghan doctors, students and engineers with a useful tool like this book. I would like to mention that I used with permission from the author the following book as the basis for the diagnostic ultrasound images.

1. Hofer, M „Ultrasound Teaching Manual”; 2. Aufl. 2005; ISBN-10: 3131110422; ISBN-13: 9783131110428; Georg Thieme Verlag Stuttgart

Sincerely

Dr. N. Sultansei
Former Lecturer, Faculty of Science and Faculty of medicine
Kabul University
Germany, 2024

